

コード ナンバリング	sk001-01 入院・外来 1	sk002-01 入院・外来 2	sk003-07 入院 3	sk004-01 入院・外来 4	sk005-01 入院 5	sk006-01 入院 6	sk007-01 入院・外来 7	sk008-08.ge024 入院 8	sk009-05 入院 9	sk011-01 入院・外来 11	sk012-01 入院・外来 12	sk013-04 入院・外来 13
プロトコール 名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)
投与順序	ジェムザール	TS-1・CPT-11	TS-1・CDDP day8 (60mg/m ²)	TS-1・CDDP weekly (20mg/m ²)	FP(700-70)	FP (low dose)	CDDP腹腔・5-FU	FOLFIRI	FOLFOX4・アバステチン	タキソール weekly	タキソテール weekly	MTX・5-FU
1 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	★TS-1 day1から3週間投与	★TS-1 day1の7日前より3週間投与	★TS-1 day1から3週間投与	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 フルオウラシル(500mg/body) Rp.2と同時 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,15	day1	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	ラクテック500mL 1袋	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(700mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(200mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 20mL 2A ランダ(MAX 20mg/body) Rp.1と同時	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/m ²)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル(25mg/m ²) 始め10分は速度半分 調製時ボンピング必要	生食100mL 1瓶 ダイアモックス 0.5V メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	腹腔投与(volus)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	day1~day15の計3回	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/m ²)	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1投与60分後	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	休薬完了day7	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(100mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより	休薬完了day7	休薬完了day7	生食100mL 1瓶 メソトレキセート(100mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(15分)
4 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(20mg/m ²)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	ランダはシリンジ3本に分ける 生食とランダ1:1で調製 生食とランダそれぞれ吸い、3 方活栓使用して1本にまとめる	生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより	3投1休が標準 (day1.8.15 4weekごと)		5%ブドウ糖500mL 1B メイロン注20mL 2A Rp.3と同時 メインルート
手技	day22は休薬	day8,22,29は休薬	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)		静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(180分)
5 薬剤	休薬完了day7	休薬完了day35	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V Rp.3投与開始70分後より	ラクテック500mL 1袋	アロキシ注バッグ 1袋 ランダ(4mg/m ²) デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 500mL 1袋 ランダ(4mg/m ²) Rp.3終了後 上ルートより	①30mL (生食・ランダ 15mLずつ) (50mLシリンジ)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/m ²)	生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で			生食100mL 1瓶 フルオウラシル(600mg/m ²) 上ルートより
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に(15分)			持続点滴末梢(15分)
6 薬剤			生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/m ²) 量を500mLに 上ルートより	全 休薬完了day7	生食 500mL 1袋 ランダ(70mg/m ²) 量を500mLに 上ルートより	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A メインルート 全開で	②30mL (生食・ランダ 15mLずつ) (50mLシリンジ)	休薬完了day14	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(600mg/m ²)			内服 ロイコボリン錠5mg 12T分4 6時間毎 Rp.3投与24時間後より計6回
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)			持続点滴末梢(22hr)			day1の内服
7 薬剤			生食 20mL 1A ランックス注20mg 1A 下ルートより	3投2休が標準 (day1.8.15 5weekごと)	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A メインルート 全開で	ラクテック500mL 1袋 メインルート	③20mL (生食・ランダ 10mLずつ) (30mLシリンジ)					内服 ロイコボリン錠5mg 6T分2 6時間毎
手技			静脈注射		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)			day2			day2の内服
8 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			休薬完了day7
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(30分)			
9 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(100mg/m ²)			
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(120分)			
10 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート			生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で			
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)			静脈注射緩徐に(15分)			
11 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート				ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(600mg/m ²)			
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	day2~5			持続点滴末梢(22hr)			
12 薬剤						生食 500mL 1袋 フルオウラシル(200mg/m ²) 下ルートより			休薬完了day14			
手技			day8, 15, 22は休薬		day2~5	持続点滴末梢(24hr)						
13 薬剤			休薬完了day7		生食 500mL 1袋 フルオウラシル(700mg/m ²) 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(4mg/m ²) 上ルートより						
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)						
14 薬剤					休薬完了day21	休薬完了day7						
手技												
15 薬剤												
手技												

コード ナンバリング	sk016-01	sk017-01	sk019-01	sk020-01	sk021-01	sk022-01	sk024-08	sk025-08	sk026-01	sk027-01	sk028-05
	入院・外来 14	入院 15	入院・外来 16	入院・外来 17	入院・外来 18	入院・外来 19	入院 20	入院 21	入院・外来 22	入院 23	入院・外来 24
	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(LVIは、シール)
プロトコル 名	CDDP・5-FU肝動注	FP(400-40)	アービタックス ・イリノテカンweekly(初回)	アービタックス ・イリノテカンweekly	アービタックス・イリノテカン Biweekly(初回)	アービタックス・イリノテカン Biweekly	FOLFIRI・アービタックス(初回)	FOLFIRI・アービタックス	レミケード	5-FU肝動注(連日)	アバスタチン・mFOLFOX6 (インフューザー用)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 ランダ(10mg~20mg/body) 全量100mLに 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL	ラクテック500mL 1袋 メインルート	アービタックスは2回目以降 250mg/m ² (60分) 全量250mL		アービタックスは2回目以降 250mg/m ² (60分) 全量250mL		アービタックスは2回目以降 250mg/m ² (60分) 全量250mL		生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V		生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可
手技	動脈注射(15分)	持続点滴末梢(90分)	day1,8,15,22	day1,8,15,22	day1,15,29	day1,15,29	day1	day1	持続点滴末梢(30分)	day1-5,8-12	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオウラシル(500~1000mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(400mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	グラセトロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	グラセトロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食250mL 1袋 インプリキマブ(5mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオウラシル(500mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	動注(3hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	休薬完了day14	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(120分)
4 薬剤		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)
5 薬剤		生食 500mL 1袋 ランダ(40mg/m ²) 全量を500mLに Rp.4終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/m ²)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/m ²)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(150mg/m ²)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(150mg/m ²)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより			生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で
手技		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			静脈注射緩徐に
6 薬剤		生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg メインルート 全開で					生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより			生食 100mL フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節
手技		持続点滴末梢(5分)	day29,36	day29,36	day8,22,36,43	day8,22,36,43	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(46hr)
7 薬剤		ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で	生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で			day8は、休薬週
手技		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に			
8 薬剤		ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/m ²)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/m ²)			休薬完了day14
手技		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)			
9 薬剤		ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋					
手技		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day8	day8			
10 薬剤			休薬完了day42	休薬完了day42	休薬完了day49	休薬完了day49	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用			
手技		day2~5	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			
11 薬剤		生食 500mL 1袋 フルオウラシル(400mg/m ²) 下ルートより					生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに			
手技		持続点滴末梢(24hr)					持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)			
12 薬剤		計5コース					生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋			
手技							持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)			
13 薬剤		休薬完了day7					休薬完了day14	休薬完了day14			
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											

コード ナンバリング	sk029-01 入院・外来 25	sk030-01 入院・外来 26	sk031-04 入院・外来 27	sk032-04 入院・外来 28	sk033-04 入院・外来 29	sk034-04 入院・外来 30	sk035-02 入院・外来 31	sk036-02 入院・外来 32	sk037-02 入院 33	sk038-02 入院 34	sk039-01 入院・外来 35	sk040-02 入院 36				
プロトコール 名	ケモセーフ SOX/XELOX・アバステン		ケモセーフ SOX/XELOX		ケモセーフ(LVIは、シール) ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール) ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール) ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール) ケモセーフ(LVIは、シール)					
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可		アービタックスは2回目以降 250mg/m ² (60分) 全量250mL		アービタックスは2回目以降 250mg/m ² (60分) 全量250mL					
手技	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		day1		day1		day1					
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 キサート注6.6mg 1V		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 キサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用			
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)			
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)		day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより		生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに		生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに		生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	
手技	持続点滴末梢(120分)		day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
4 薬剤	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋	
手技	day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週	
5 薬剤	day8、15は、休業週		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより	
手技	day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週		day8、15は、休業週	
6 薬剤	休業完了day21		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより	
手技	day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週	
7 薬剤	休業完了day14		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で	
手技	day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週	
8 薬剤	休業完了day14		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	
手技	day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週		day8は、休業週	
9 薬剤	休業完了day14		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	
手技	day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8	
10 薬剤	生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに		生食 250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
12 薬剤	生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋		生食 250mL 1袋	
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
13 薬剤	休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14	
手技	day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8	
14 薬剤	休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14	
手技	day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8	
15 薬剤	休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14		休業完了day14	
手技	day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8		day8	

コード ナンバリング	sk041-02 入院・外来 37	sk042-02 入院 38	sk043-02 入院・外来 39	sk044-01,sk045-01 入院・外来 40	sk046-01 入院・外来 42	sk047-01 入院 43	sk049-01 入院 44	sk050-01 入院・外来 45	sk051-01 入院・外来 46	sk052-01 入院・外来 47	sk053-01 入院・外来 48												
プロトコル 名	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI・ベクテビックス (インフューザー用)		ケモセーフ(LVは、シール) mFOLFOX6・ベクテビックス (インフューザー用)		ケモセーフ(LVは、シール) mFOLFOX6・ベクテビックス (インフューザー用)		ケモセーフ ハーセプチン・XP		ケモセーフ TS-1・タキソテール		ケモセーフ(下ルート) DCF		ケモセーフ CDDP・CPT-11(Biweekly)		ケモセーフ タキソテール		ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) シスプラチン・ラステット		ケモセーフ(下ルート) GEM+CDDP		ケモセーフ TS-1・CPT-11(術前CRT)		
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	トラスツマブは2回目以降 6mg/kg(30分)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取												★TS-1 day1~day5 day8~day12 day22~day26 day29~day33	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	day2・3	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1, 8	day1, 8, 22, 29											
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (6mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V ファモチジン注20mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/mf)	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/mf) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf)	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.2と同時に	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V											
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)											
3 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.3と同時に 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオウラシル(800mg/mf) Rp.1と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(800mg/mf) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq 下ルートより	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)											
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	day8, 15は、休業週	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	day8, 15は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)											
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) Rp.5と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg Rp.2と同時に 上ルートより	休業完了day21	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (30mg/mf) 全量を500mL	休業完了day21	マンニトールS300mL 200mL	生食 250mL 1袋 ランダ注(25mg/mf) Rp.2終了後 下ルートより												
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day15は休業											
5 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.4と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 Rp.5と同時に 下ルートより		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 ランシックス注20mg 1A		生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mL 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf) Rp.3終了後 下ルートより	休業完了day35											
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)												
6 薬剤	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) Rp.4と同時に 全量を500mLに 上ルートより		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) Rp.4終了後 上ルートより 調製時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A Rp.4終了後 下ルートより												
手技	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(10分)												
7 薬剤	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調節	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/mf)	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調節	ソルデム3A500mL 1袋		生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより			休業完了day14														
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	day4・5				day2,3	day15は休業											
8 薬剤	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	生食 500mL 1袋		ラクテック500mL 1袋 ランダ終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(800mg/mf) 下ルートより			生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	休業完了day21												
手技				持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)			持続点滴末梢(30分)													
9 薬剤				マンニトール300mL 1瓶		ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)													
手技				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(90分)													
10 薬剤				生食 50mL 1瓶 ランシックス20mg 1A		マンニトール300mL 1瓶 メインルートより																	
手技				持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(60分)	day15				day8,15は、休業週												
11 薬剤								カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			休業完了day21												
手技				day2~4		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)															
12 薬剤				生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V				生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要		イメンド内服													
手技				持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(60分)															
13 薬剤				ソルデム1 500mL 1袋				休業完了day28															
手技				持続点滴末梢(90分)																			
14 薬剤				生食 500mL 1袋																			
手技				持続点滴末梢(120分)																			
15 薬剤				休業完了day21																			
手技																							

コード ナンバリング	sk055-01 49	sk056-01 50	sk057-01 51	sk058-01 52	sk059-01 53	sk060-01 54	sk061-01 55	sk062-01,sk063-01 56	sk064-01 57	sk065-01 58
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院	入院	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコル 名	タキソール+サイラムザ	サイラムザ(単剤)	FP(700-70)・RT	術前FP(800-80)	FP(800-80)	CDDP+5-FU肝動注	NDP+5-FU+RT	ハーセプチン・XP(ショートハイドレーション)	パラプラチン・ Monthlyタキソール	5-FU+MMC+RT
投与順序	1 薬剤	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠 内服 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 全開で	ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 ランダ (10mg~20mg/body) 全量100mLに メインはフラッシュ用生食50mL 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用
手技	day1、15	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1
2 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠内服	生食 50mL 1瓶 全開で	アロキシ注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 キサート注6.6mg 1.5V メインルート 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ランダ (10mg~20mg/body) 全量100mLに メインはフラッシュ用生食50mL 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) Rp.1投与60分後 下ルートより	アロキシ注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V ファモチジン注20mg 1V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取	カイトリル注ハック3mg 1袋	ラクテック500mL 1袋 メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	動脈注射(外来:30分、入院:60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	day8は、休業週	ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル (250~500mg/body)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (175mg/m ²)	グラネセロン注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(60分)	day8は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	動注(外来:3hr、入院:5hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了 day14	マンニトール 200mL メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	休業完了 day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶 マイトマイシン(10mg/m ²) 上ルートより
手技	持続点滴末梢		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)
5 薬剤	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/m ²)		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより	アロキシ注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	アロキシ注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート		アロキシ注ハック 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	マンニトール 200mL		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(24hr)
6 薬剤	day8		生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/m ²) 全量を500mLに Rp.4と同時 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/m ²) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/m ²) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより		生食 500mL 1袋 アプブラ (90mg/m ²) Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	休業完了 day21	day2~4
手技	day8		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)		day2~4
7 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠内服		ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 全開で		生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 全開で	生食 250mL 1袋	カルボプラチンはAUC5に減量 されていても問い合わせ不要	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/m ²)		day2~4	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート	休業完了 day21		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)		day2~4	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(24hr)
9 薬剤	休業完了 day28		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート			休業完了 day28
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)			
10 薬剤			生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/m ²) 下ルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート					通常2クールで終了
手技			持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		day2~5			
11 薬剤			休業完了 day28	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート			
手技				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)			
12 薬剤							生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) 下ルートより			
手技				day2~5	day2~5		持続点滴末梢(24hr)			
13 薬剤				生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		休業完了 day28			
手技				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
14 薬剤				生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) 下ルートより					
手技				持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)					
15 薬剤				休業完了 day21	休業完了 day28					
手技										

コード ナンバリング	sk066-01	sk067-01	sk068-01	sk069-01	sk070-01	sk071-01	sk072-01	sk073-01	sk074-01	sk075-01	sk076-01	
	入院 59	入院・外来 60	入院・外来 61	入院・外来 62	入院・外来 63	入院・外来 64	入院 65	入院 66	入院・外来 67	入院・外来 68	入院・外来 69	
プロトコール 名	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ポンプ・シリンジ	ポンプ・シリンジ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	
	術前DCF療法	GCS	ザノサー単剤Daily	ザノサー単剤Weekly	ザノサー+5-FU	パラプラチン・ ラステット	LFP変法(限定3)	LFP動注療法	FL+nal-IRI療法	テセントリク・アバステン	エンハーツ	
投与順序	1 薬剤		デキサメタゾン8mg/日内服 (Day2~4)		生食 500mL 1袋		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	インフューザーポンプ SFS-1005D(P) 種類注意!	インフューザーポンプ SFS-1005D(P) 種類注意!	オニバイドは入院時バッグを 遮光する 外来では遮光不要	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	day1	day2~3	day1	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1~5	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	
2 薬剤	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋	グラニセトン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 500mL 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	生食100mL 1瓶 フルオウラシル(1250mg/body) 全量60mL 生食で調節	生食100mL 1瓶 フルオウラシル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	動注(120時間)	動注(5日間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(750mg/mf) Rp.1と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(750mg/mf) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	グラニセトン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 ザノサー(1000mg/mf)	グラニセトン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	5%ブドウ糖500mL 1袋 オニバイド(70mg/mf) 入院時遮光	生食 50m 1瓶 メインルート 全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶 エンハーツ注(6.4mg/kg) 注射用水100mL 1瓶 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 遮光必要
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/mf)	生食 250mL 1袋	生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/mf)				5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) 下ルートより	休薬完了day21	5%ブドウ糖100mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day2,3	day3	day2~5	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(15分)
5 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	マンニトールS 200mL	生食 250mL 1袋	休薬完了day7	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/mf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調節		休薬完了day21
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(46hr)		
6 薬剤	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/mf) Rp.4終了後 上ルートより 調製時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (25mg/mf)	休薬完了day42		生食 250mL 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	休薬完了day7				エンハーツ調製後は点滴 バッグを遮光する
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)		day8,15,22	day8は、休薬週		
7 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		ソルデム3A500mL 1袋		休薬完了day42				生食100mL 1瓶 フルオウラシル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	休薬完了day14		調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝 えること
手技	持続点滴末梢(120分)	day4,5	持続点滴末梢(60分)				day8,15は、休薬週		動注(5日間)			
8 薬剤	ラクテック500mL 1袋 ランダ終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル(750mg/mf) 下ルートより	休薬完了day14				休薬完了day21		シスプラチン(5mg/body)			全量125mL以上のときは①5% ブドウ糖液抜く②速度再計算 必要
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)							動注(30分)			
9 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	day1から1週間 TS-1(80mg/mf)内服									
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)							day10,17,24			
10 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	休薬完了day21							シスプラチン(5mg/body)			
手技	持続点滴末梢(60分)								動注(30分)			
11 薬剤									休薬完了day28			
手技												
12 薬剤												
手技												
13 薬剤												
手技												
14 薬剤												
手技												
15 薬剤												
手技												

コード ナンバリング	sk077-01、sk078-01 70、71	sk079-01	sk080-01	sk081-01	sk082-01	sk083-01	sk084-02	ge022-05	ge023-05	ge024-08	
	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院	入院	入院	
	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	
プロトコール 名	ハーセプチン 3weeks	シスプラチン・ カンプト	テセントリク・パラプラチン・ラス テット療法	イミフィンジ・パラプラチン・ラス テット療法	キイトルーダ+FP療法	カルセド	タキソール weekly(100mg/m ²)	FOLFOX6	FOLFOX6・ アバスタチン	FOLFIRI	
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、 6mg/kg	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより			カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハズマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	day2~4	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/m ²)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食100mL 1袋 キイトルーダ(200mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(100mg/m ²)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウシ(800mg/m ²) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 カルセド(40mg/m ²) 全開で Rp.1終了後	休薬完了 day7	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(85mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより
手技	day8.15は、休薬週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴側管(約10分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	休薬完了 day21	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²)	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	休薬完了 day21	day1~3	週1回投与を6回施行し、2週間休薬を1コースとし、反復	生食50mL 1瓶 オキサリプラチン注(400mg/m ²) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより	生食50mL 1瓶 フルオロウシ(400mg/m ²) 全開で
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)				静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	静脈注射緩徐に
5 薬剤		生食 500mL 1袋 ランダ (60mg/m ²) 全量を500mL		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	マンニトール 200mL メインルート		休薬完了 day21		ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウシ(2400mg/m ²)	生食50mL 1瓶 フルオロウシ(400mg/m ²) 全開で	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウシ(2400mg/m ²)
手技		持続点滴末梢(120分)	day2.3	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(46hr)
6 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより					ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウシ(2400mg/m ²)	
手技		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day2.3	持続点滴末梢(60分)				day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)	day8は、休薬週
7 薬剤			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより				休薬完了 day14		休薬完了 day14
手技		day8.15	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)				day8は、休薬週		
8 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²)	生食 500mL 1袋 フルオロウシ(800mg/m ²) 下ルートより				休薬完了 day14		
手技		持続点滴末梢(30分)	day8.15は、休薬週	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)						
9 薬剤		生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/m ²)	休薬完了 day21								
手技		持続点滴末梢(90分)		day8.15は、休薬週							
10 薬剤				休薬完了 day21							
手技		day22は、休薬週									
11 薬剤		休薬完了 day28									
手技											
12 薬剤		イメンド内服									
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											

コード ナンバリング	ge025-08 6	ge027-02 8	ge028-01 9	ge035-01 11	ge036-01 12	ge039-01 15	ge040-04 16	ge48-01 17	ge053-01 18	ge054-01 19	ge065-01 21
	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ
プロトコル 名	FOLFIRI・ アバステン	イリノテカン(80mg/m ²)	ジェムザール	アービタックス(初回)	アービタックス	CPT-11(単剤)	mFOLFOX6(インフューザー用)	アバステン(7.5mg/kg)・セロダ	ネダプラチン	5-FU(500mg/m ²)・LV(RPMI)	イリノテカン(150mg/m ²)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 パシマブ(5mg/kg) アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 パシマブ(7.5mg/kg) アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注キット3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/m ²)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²)	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時に 下ルートより	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (100mg/m ²)	ソルデム3A 500mL 1袋 レボホリナートNa注 (250mg/m ²) 下ルート 開始60分後よりRp.3投与	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) Rp.4と同時に 下ルートより		day1~day15の計3回	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/m ²)	5%ブドウ糖250mL 1袋 キサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.2と同時に 上ルートより	休薬完了 day21	ラクテック500mL 1袋	生食 50mL 1袋 フルオウラシル(500mg/m ²) 上ルート Rp.2開始60分後より 全開で	3回投与後、3週間休薬、 day49で1クール (2回投与後、3週間休薬、 day35で1クールの場合もあり)
手技	持続点滴末梢(120分)	day8は休薬		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴側管(120分)		持続点滴末梢(90分)	静脈注射緩徐に	day8は休薬
4 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) Rp.3と同時に 上ルートより	休薬完了 day14		休薬完了 day7	休薬完了 day7		生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で	day1から2週間セロダ内服	ラクテック500mL 1袋	day1~36まで計6コース	休薬完了 day14
手技	持続点滴末梢(120分)		day22は休薬			day22は休薬	側注(5分)		持続点滴末梢(90分)	day43,50は休薬	
5 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/m ²) 全開で		休薬完了 day7			休薬完了 day28	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		休薬完了 day28	休薬完了 day7	
手技	静脈注射緩徐に						持続点滴末梢(46hr)				
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/m ²)										
手技	持続点滴末梢(46hr)						day8は、休薬週				
7 薬剤							休薬完了 day14				
手技	day8は、休薬週										
8 薬剤	休薬完了 day14										
手技											
9 薬剤											
手技											
10 薬剤											
手技											
11 薬剤											
手技											
12 薬剤											
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											

コード ナンバリング	ge066-01 22	ge067-01 23	ge068-01 24	ge099-01 25	ge104-01 26	ge105-01 27	ge106-01 28	ge107-01 29	ge108-01 30	ge109-01, ge110-01 31	ge111-01 32
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	SOX/XELOX・アバスタチン	SOX/XELOX	アバスタチン(5mg/kg)・TS-1/ロ サフ	DOC+GEM (限定)	CPT-11・ベクティビックス	ジェムザール+アブラキサン	FOLFIRINOX	IRIS+ベクティビックス	SOX (100mg/m ²)	XELOX+ハーセプチン(初回) XELOX+ハーセプチン	アバスタチン+IRIS
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg) 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(100mg/m ²)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服	休薬完了day14	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m ²)	生食 250mL 1袋 メインルート	生食100mL (25mL/m ²) アブラキサン注(125mg/m ²) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) レボホリナート開始30分後からイリ ノテカン投与 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg) 上ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²)
手技	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		TS-1 day1~42までで1コース day1から4週間投与		生食 250mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²) 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) レボホリナート開始30分後から投与 上ルートより	生食 250mL 1袋 メインルート		day1から2週間ゼローダ内服	day1から2週間TS-1内服
手技		day8,15は、休薬週		day8	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8,15は、休薬週		
5 薬剤		休薬完了day21	ロンサーフ(35mg/m ²) day1~28までで1コース day1-5 day8-12	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day14		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (100mg/m ²) 上ルートより	休薬完了day21		休薬完了day21
手技	day8,15は、休薬週			持続点滴末梢(30分)		day22は、休薬週	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休薬週	
6 薬剤	休薬完了day21			5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/m ²) 調製時ボンピング必要		休薬完了day28	生食 100mL (入院ではリルテム3A500mLもあり) フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	day1から2週間TS-1内服		休薬完了day21	
手技				持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(46hr)	day8,22は、休薬週			
7 薬剤				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m ²)				休薬完了day28	※ 1段階減量 75mg/m ²		
手技				持続点滴末梢(30分)			day8は、休薬週				
8 薬剤				休薬完了day21			休薬完了day14				
手技											
9 薬剤											
手技											
10 薬剤											
手技											
11 薬剤											
手技											
12 薬剤											
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											

コード ナンバリング	ge112-01 33	ge113-01 34	ge114-01 35	ge115-01 36	ge117-01 37	ge118-01 38	ge120-01 39	ge121-01 40	ge122-01 41	ge123-01 42	ge124-01 43
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVは、シール)
プロトコル 名	SOX+アービタックス(初回)	SOX+アービタックス	ヨンデリス	FOLFIRI・サイラムザ	患者限定5-FU動注(Weekly)	5-FU肝動注(Weekly)	オブジーボ(2週毎)	FOLFIRI+ザルトラップ (インフューザー用)	XELIRI+アバステン療法	アブラキサン+サイラムザ	FOLFOXIRI
投与順序	1 薬剤			アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	5%ブドウ糖250mL 1B 5-FU (500mg/m ²) Rp.2と同時に 上ルートより 左のリザーバーから投薬	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/m ²) シュアフェーザ-A:SFS-0504HR(P)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V
手技		day1	day1	中心静脈(30分)	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(5時間)	動脈注射(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1,15
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食100mL 1瓶	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	5%ブドウ糖250mL 1B 5-FU (500mg/m ²) Rp.1と同時に 上ルートより 右のリザーバーから投薬	休薬完了day7	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (165mg/m ²) 上ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	中心静脈(30分)	持続点滴末梢(60分)	動脈注射(5時間)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	生食500mL 1袋 アービタックス (400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量を250mLに	生食 500mL 1袋 ヨンデリス (1.2mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1B ルートキープ用 左のリザーバー	ベッド予約無い場合は放射線RI 室で穿刺予定	休薬完了day14	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (200mg/m ²)	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 下ルートより 認容性 良 60分→30分へ短縮可	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	中心静脈(24時間)	持続点滴末梢	動脈注射			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	休薬完了day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) Rp.5と同時に 下ルートより	生食 50mL 1B ルートキープ用 右のリザーバー	インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.3と同時に 上ルートより	day1から2週間ゼローダ内服 (800mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/m ²) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	動脈注射			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)		生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) Rp.4と同時に 上ルートより	休薬完了day7			生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開で	休薬完了day21	生食100mL (20mL/m ²) アブラキサン注(100mg/m ²) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	生食 250mL (入院ではリデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/m ²) 全量230mL 生食で調節 インフューザーポンプLV5
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)				静脈注射緩徐に		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(48hr)
6 薬剤				生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開で				生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節			
手技	day8,15	day8,15		静脈注射緩徐に				持続点滴末梢(46hr)		day8	day8は、休薬週
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用		生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節						カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	休薬完了day14
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(46hr)				day8は、休薬週		持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量を250mLに						休薬完了day14		生食100mL (20mL/m ²) アブラキサン注(100mg/m ²) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 day22は、休薬週	使用するインフューザーポンプは「LV5」
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		day8は、休薬週							
9 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋		休薬完了day14						休薬完了day28	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)									
10 薬剤	day1から2週間ゼローダ内服	day1から2週間TS-1内服									
手技											
11 薬剤	休薬完了day21	休薬完了day21									
手技											
12 薬剤											
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											

コード ナンバリング	ge125-01 44	ge127-01 45	ge128-01,ge129-01 46	ge130-01,ge131-01 47	ge135-01 48	ge137-01 49	ge141-01 50	ge142-01 51	ge143-01 52	ge152-01 53	ge157-01 54
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ポンプ	ポンプ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコル 名	FOLFOXIRI+Bev	アバステン+イリノテカン	Her+S-1+CDDP療法	SOX+ハーセプチン	オブジーボ(4週毎)	7アバステン+5-FU肝動注(限定)	ザルトラップ+IRI+5-FU肝動注(限定)	mFOLFOXIRI	mFOLFOXIRI+Bev	オブジーボ+SOX (100mg/m ²)	オブジーボ+mFOLFOX6 (インフューザー用)
投与順序	1 薬剤 アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	トラスツズマブは2回目以降 6mg/kg(30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 投与中に経口補水液1L摂取 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/m ²) Rp.1と同時 シュア-フューザ-A:SFS- 0504HR(P)	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/m ²) Rp.1と同時 シュア-フューザ-A:SFS- 0504HR(P)	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	動脈注射(5時間)	動脈注射(5時間)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (165mg/m ²) 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/m ²)	休薬完了 day28	休薬完了 day7	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg) Rp.1終了後	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²) 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(100mg/m ²)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	休薬完了 day14	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq メインルート	day1から2週間TS-1内服		5-FUのみレジメン(放射2)と交 互に	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.3終了後	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/ m ²) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day1から2週間TS-1内服	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/ m ²) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		マンニトール 200mL メインルート		day8,15は、休薬週	インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		生食 100mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/ m ²) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	day8,15は、休薬週	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/m ²) 全開で
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)		day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	静脈注射緩徐に
6 薬剤	生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/m ²) 全量230mL 生食で調節 インフューザーポンプLV5		生食 500mL 1袋 ランダ (60mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	休薬完了 day21			生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/m ²) Rp.1と同時 シュア-フューザ-A:SFS- 0504HR(P)		生食 100mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	休薬完了 day21	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(48hr)		持続点滴末梢(120分)				動脈注射(5時間)	day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)		持続点滴末梢(46hr)
7 薬剤			生食 500mL 1袋 メインルート				休薬完了 day14	休薬完了 day14			休薬完了 day14
手技			持続点滴末梢(60分)					day8は、休薬週			
8 薬剤	休薬完了 day14		休薬完了 day21				インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		休薬完了 day14		
手技											
9 薬剤	使用するインフューザーポン プは 「LV5」		day1から2週間TS-1内服								
手技											
10 薬剤											
手技											
11 薬剤											
手技											
12 薬剤											
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											