

| コード ナンバリング | sf001-03 | sf002-06 | sf004-06 | sf005-05 | sf006-03 | sf007-02 | sf009-01 | sf010-01 | sf011-03 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 入院・外来 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| ルート | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ (メインフィルターなし) | ケモセーフ (メインフィルターなし) | ケモセーフ |
| プロトコール 名 | TJ weekly | TJ | DJ | CAP | CPT-11・CDDP | weeklyCDDP・RT | ドキシル(BSA1.5ml未満) | ドキシル(BSA1.5ml以上) | AP |
| 投与順序 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 | 1 薬剤 |
| 手技 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダ注75T内 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2. 5V Rp.1と同時にリスダ注75T内 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V | ラクテック 1袋 下ルートより | ラクテック 500mL 1袋 Rp.2と同時に | ラクテック 500mL 1袋 Rp.2と同時に | 5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし | 5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし | ラクテック 500mL 1袋 下ルートより |
| 2 薬剤 | 生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/mf) | 生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/mf) | 生食 500mL 1袋 セタキセル注(70mg/mf) 調製時ポンピング必要 | アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V | アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V | ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時に | 5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注(50mg/mf) | 5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注(50mg/mf) | アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V |
| 3 薬剤 | 生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUG6) MAX750mg | 生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUG6) MAX750mg | 生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUG6) MAX750mg | 生食 100mL 1瓶 エビルピン注(40mg/mf) | 生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/mf) | グラネトロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時に | 5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.2と同じ速度で | 5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.2と同じ速度で | ドキシル注(80mg/mf) 生食 100mL 1瓶 |
| 4 薬剤 | 生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに | 休薬完了day21 | 休薬完了day21 | 生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに | 生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに | ソルデム3A500mL 1袋 | 初回のみday1から ピドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与 | 初回のみday1から ピドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与 | 生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに |
| 5 薬剤 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダ注75T内 | | | 生食 500mL 1袋 エンドキサン注(300mg/mf) | ラクテック 500mL 1袋 ランックス注20mg 0.25A | 生食 500mL 1袋 ランダ注(40mg/mf) 全量500mLに | 各クール プレドニゾン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1 日分 day6から 4T 朝 | 各クール プレドニゾン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1 日分 day6から 4T 朝 | 生食 500mL 1袋 |
| 6 薬剤 | 生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/mf) | | | ソルデム3A500mL 1袋 ランックス注20mg 0.5A | ソルデム3A 500mL 1袋 KCL注 1キット | ソルデム3A 500mL 1袋 ランックス注20mg 1A | 休薬完了day28 | 休薬完了day28 | ソルデム3A500mL 1袋 ランックス注20mg 0.5A |
| 7 薬剤 | 休薬完了day21 | | | ラクテック 1袋 KCL注 1キット | ラクテック 500mL 1袋 10%NaCl注 1筒 | ソルデム3A 500mL 1袋 | 体表面積注意! | 体表面積注意! | ラクテック 500mL 1袋 KCL注 1キット |
| 8 薬剤 | | | | ソルデム3A500mL 1袋 | | ソルデム3A500mL 1袋 | | | ソルデム3A500mL 1袋 |
| 9 薬剤 | | | | ラクテック 1袋 | カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V | | | | ラクテック500mL 1袋 |
| 10 薬剤 | | | | 休薬完了day21 | 生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/mf) | ソルデム3A500mL 1袋 Rp.2と同時に | | | 休薬完了day21 |
| 11 薬剤 | | | | イメンド内服 | 休薬完了day28 | グラネトロン注キット 1袋 Rp.1と同時に | | | イメンド内服 |
| 12 薬剤 | | | | | イメンド内服 | ソルデム3A500mL 1袋 | | | |
| 13 薬剤 | | | | | | 計 5回 休薬完了 day35 | | | |
| 14 薬剤 | | | | | | | | | |
| 15 薬剤 | | | | | | | | | |

| コード ナンバリング | sf012-01 | sf013-02 | sf014-01 | sf015-01 | sf016-01 | sf017-01 | sf018-01 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 入院 | 入院 | 入院 | 入院 | 入院 | 入院・外来 | 入院 | 入院 |
| ルート | ケモセーフ | ケモセーフ(下ルート) | ケモセーフ | カテーテルシリンジチップ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ(下ルート) |
| プロトコール 名 | CPT-11・NDP | IAP | トボテカン | CDDP腹腔内 | タキソテール | EMA/CO | BEP療法 |
| 投与順序 | 1 薬剤 | グラニセトロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | イメド内服 | グラニセトロン注バッグ 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V | ラクテック500mL 1袋 | カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | ロイホリン錠15mg 12時間ごと に4回 マルチキート投与開始後24時間 より服用開始 |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | Day1~4 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(30分) | Day1 | Day8 |
| 2 薬剤 | 生食 500mL 1袋 イリノテカン (50mg/mf) | ラクテック500mL 1袋 下ルートより | 生食 100mL 1瓶 ハイカムチン(1.5mg/mf) | グラニセトロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | 生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/mf) 調製時ポンピング必要 | グラニセトロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時 |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) |
| 3 薬剤 | 生食 500mL 1袋 アクブラ注 (80mg/mf) | グラニセトロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V ラック開始60分 から メインルート | day1~5まで計5コース | 生食250mL 150mL ランダ注 (80mg/mf) | 蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | 生食 250mL 1袋 エンドキサン注(800mg/mf) | グラニセトロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V 下ルートより Rp.1と同時 |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) |
| 4 薬剤 | ラクテック500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.25A | ドキシソルビン注 (40mg/mf) イホマイドへ継ぎ換え時 下ルートより Day4のみ | 休薬完了day21 | ソルデム3A500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.5A | 休薬完了day21 | 生食 500mL 1袋 エトボシド注(100mg/mf) 上ルートより | ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後 |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(15分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(120分) |
| 5 薬剤 | ソルデム3A 500mL 1袋 KCL注 1キット | 生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/mf) ウロキサン1回目と同時に 上ルートより | | ラクテック500mL 1袋 KCL注 1キット | 生食 500mL 1袋 メトレキセート(300mg/mf) 下ルートより | 生食 50m mL 1瓶 全開で | 生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(12時間) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) |
| 6 薬剤 | | 生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/mf) (イホマイドの20%相当) イホマイドと同時に 下ルートより | | ソルデム3A 500mL 1袋 | 生食 50m mL 1瓶 全開で メインルートより | 休薬完了day14 | 生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後 |
| 手技 | day8, day15 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) |
| 7 薬剤 | グラニセトロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | 生食 500mL 1袋 シスプラチン注 (20mg/mf) 上ルートより | | ラクテック 500mL 1袋 | イメド内服 | 生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより | 生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(120分) | Day2 | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(5時間) |
| 8 薬剤 | 生食 500mL 1袋 イリノテカン (50mg/mf) | マンニトールS 300mL 1瓶 ウロキサン2回目と同時に 上ルートより | 休薬完了day7 | | グラニセトロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし | 生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート | ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(5時間) | 持続点滴末梢(15時間) |
| 9 薬剤 | 休薬完了day28 | 生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/mf) (イホマイドの20%相当) マンニトールと同時に 下ルートより | 調製方法 別紙参照 | | 蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | | ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート |
| 手技 | | 持続点滴末梢(30分) | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(5時間) | 持続点滴末梢(4時間45分) |
| 10 薬剤 | | ラクテック 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A グラニセトロンと同時に メインルート | | | 生食 500mL 1袋 エトボシド注 (100mg/mf) 上ルートより | ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート | |
| 手技 | | 持続点滴末梢(3hr) | | | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(4時間45分) | day8, 15 |
| 11 薬剤 | | グラニセトロン注バッグ3mg 1袋 Rp.9と同時に 下ルートより | | | 生食 50m mL 1瓶 全開で メインルートより | エトボシドはフィルターなし! | 生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより |
| 手技 | | 持続点滴末梢(30分) | | | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(60分) |
| 12 薬剤 | | ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A ウロミテキサンと同時に メインルート | | | | イメド内服 | 生食 50m mL 1瓶 ルートキー用 |
| 手技 | | 持続点滴末梢(3hr) | | | | | 持続点滴末梢 |
| 13 薬剤 | | 生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/mf) (イホマイドの20%相当) Rp.11と同時に 下ルートより | | | | | 休薬完了 day21 |
| 手技 | | 持続点滴末梢(30分) | | | | | |
| 14 薬剤 | | ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A メインルート | | | | | |
| 手技 | | 持続点滴末梢(2hr) | | | | | |
| 15 薬剤 | | 休薬完了day21 | | | | | |
| 手技 | | | | | | | |

| コード ナンバリング | sf019-01 | sf020-01 | sf021-01 | sf022-02 | sf023-03 | sf024-04 | sf025-01 | sf026-01 | sf027-01 | |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| ルート | 入院 | 入院・外来 | 入院・外来 | 入院・外来 | 入院・外来 | 入院・外来 | 入院・外来 | 入院・外来 | 入院 | |
| プロトコール 名 | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ(下ルート) | |
| 投与順序 | 1 薬剤 | | | | | | | | | |
| 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | カイトリル注ハッグ 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にスズランコート75T内 | 生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にベナ5T内服 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製 | Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製 |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(15分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | day1,8,15 | day1,2 | day3,4,5 |
| 2 薬剤 | 生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/mf) Rp.1投与60分後 | 生食 100mL 1瓶 ドキシルピジン(80mg/mf) | 生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/mf) | 生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf) | 生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf) | 生食 500mL 1袋 ドセタキセル注(70mg/mf) 調製時ボンピング必要 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより | ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(24hr) | 持続点滴末梢(15分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(180分) | 持続点滴末梢(5分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(180分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(90分) |
| 3 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | 休業完了day21 | day1～15まで計3コース | 生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg | 休業完了day21 | day1～day15の計3回 | 生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg | 生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf) | グラネセド注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより | グラネセド注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | | day22は、休業 | 持続点滴末梢(30分) | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 4 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | | 休業完了day7 | 生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可 | | | 生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可 | | 生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより | 生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | | | 持続点滴末梢(90分) | | day22は休業 | 持続点滴末梢(90分) | day22は休業 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 5 薬剤 | アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V | | イメンド内服 | 休業完了day21 | | 休業完了day7 | 休業完了day21 | 休業完了day28 | 生食 500mL 1袋 イホマイド (2g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより | 生食 500mL 1袋 イホマイド (2g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(240分) | 持続点滴末梢(240分) |
| 6 薬剤 | 生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/mf) 全量を500mLに | | | | | | | | 生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより | 生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(120分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 7 薬剤 | 生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A 全開で | | | | | | | | 生食 500mL 1袋 ドキシルピジン注(30mg/mf) 下ルートより | マンニトール300mL 1瓶 メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(5分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(90分) |
| 8 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | | | | | | | | マンニトール300mL 1瓶 メインルートより | 生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(60分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 9 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | | | | | | | | 生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより | ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(60分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(5時間) |
| 10 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | | | | | | | | ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(60分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(4時間30分) | 持続点滴末梢(5時間) |
| 11 薬剤 | ラクテック 500mL 1袋 | | | | | | | | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(60分) | | | | | | | | 持続点滴末梢(4時間30分) | 持続点滴末梢(5時間30分) |
| 12 薬剤 | | | | | | | | | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | 休業完了day21 |
| 手技 | day2～4 | | | | | | | | 持続点滴末梢(4時間30分) | |
| 13 薬剤 | 生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/mf) | | | | | | | | 9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始 | 9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始 |
| 手技 | 持続点滴末梢(24hr) | | | | | | | | | |
| 14 薬剤 | 休業完了day21 | | | | | | | | day1～3イメンド内服 | |
| 手技 | | | | | | | | | | |
| 15 薬剤 | イメンド内服 | | | | | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | | | |

| コード ナンバリング | sf028-01 | sf030-01 | sf031-01 | sf032-01 | sf033-01 | sf034-01 | sf035-01 | sf036-01 |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | 入院・外来 28 | 入院・外来 29 | 入院 30 | 入院 31 | 入院 32 | 入院 33 | 入院・外来 34 | 入院・外来 35 |
| ルート | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ(下ルート) | ケモセーフ(下ルート) | ケモセーフ | ケモセーフ(下ルート) | シリンジ | シリンジ |
| プロトコール 名 | バラブラテン・ ジェムザール | ゲムシタピン+アバステン | AI療法(限定)(杉本正子) | EP/EMA療法 | FA | MEA療法 | 5-dayメントレキセート | 5-day Act-D療法 |
| 投与順序 | 1 薬剤 | イメンド内服 | Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロテキサンは薬剤師が調製 | Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロテキサンは薬剤師が調製 | ロイホリン錠15mg 12時間ごとに4回 バルネキセト投与開始後24時間より服用開始 | ロイホリン錠15mg 12時間ごとに3回 バルネキセト投与開始後24時間より服用開始 | 蒸留水は溶解用 2mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の2.5mL シリンジに調製 | 蒸留水は溶解用 1.1mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の2.5mL シリンジに調製 |
| 手技 | day1 | day1 | day1,2,3 | day4,5 | Day1 | Day8 | day1~5 | day1~5 |
| 2 薬剤 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより | ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより | ラクテック 500mL 1袋 メインルートより フィルターなし | グラネセロ注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし | グラネセロ注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし | メントレキセート(0.4mg/kg) 蒸留水 20mL 1A 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 ◆シリンジで調製 |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 3 薬剤 | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf) | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf) | グラネセロ注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより | グラネセロ注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより | ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより | 生食 500mL 1袋 エトポシド注(100mg/body) 上ルートより | 蒸留水 6mL メントレキセート(150mg/body) 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 下ルートより ◆シリンジで調製 | 蒸留水20mL 1mA コスメゲン(0.01mg/kg) 下ルートより ◆シリンジで調製 |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴側管(30分) | 持続点滴側管(30分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(8hr) | 静脈注射 |
| 4 薬剤 | ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン(AUC 4) MAX600mg | 生食 100mL 1瓶 アバステン(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 | 生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより | 生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより | アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1.5B メインルートより | 生食 500mL 1袋 メントレキセート(300mg/mf) 下ルートより | 蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | 生食 500mL 1瓶 メントレキセート(300mg/body) 下ルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(12時間) | 静脈注射 | 持続点滴末梢(4時間) |
| 5 薬剤 | | | 生食 500mL 1袋 イホマイド(1.5g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより | 生食 500mL 1袋 イホマイド(1.5g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより | 生食 500mL 1袋 エトポシド注(150mg/mf) 上ルートより | 蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | 蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | 蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 |
| 手技 | day3 | day8,15 | 持続点滴末梢(240分) | 持続点滴末梢(240分) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(12時間) | 静脈注射 | 静脈注射 |
| 6 薬剤 | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V | 生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより | 生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより | 生食 500mL 1袋 ランダ(75mg/mf) 全量を500mLに 下ルートより 点滴バッグは滅光 | 蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | 生食 500mL 1袋 ラステット注(100mg/body) 上ルートより | イメンド内服 |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(12時間) | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(60分) | |
| 7 薬剤 | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf) | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf) | 生食 500mL 1袋 ドキシルピシン注(20mg/mf) 上ルートより | マンニトール300mL 1瓶 メインルートより | ラクテック 500mL 1袋 ラシックス 1A メインルートより | | | |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(120分) | | | |
| 8 薬剤 | | | マンニトール300mL 1瓶 メインルートより | 生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより | ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより | | グラネセロ注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1B メインルートより フィルターなし | |
| 手技 | day15は、休業週 | day22は、休業週 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(120分) | | 持続点滴末梢(30分) | |
| 9 薬剤 | 休業完了day21 | 休業完了day28 | 生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより | ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | | | 蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製 | |
| 手技 | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(5時間) | | | 静脈注射 | |
| 10 薬剤 | | | ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | | | 生食 500mL 1袋 ラステット注(100mg/body) 上ルートより | |
| 手技 | | | 持続点滴末梢(4時間30分) | 持続点滴末梢(5時間) | | | 持続点滴末梢(60分) | |
| 11 薬剤 | | | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | | | 休業完了day14 | |
| 手技 | | | 持続点滴末梢(4時間30分) | 持続点滴末梢(5時間30分) | | | | |
| 12 薬剤 | | | ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより | 休業完了day21 | | | イメンド内服 | |
| 手技 | | | 持続点滴末梢(4時間30分) | | | | | |
| 13 薬剤 | | | 9時開始レジメン ウロテキサン・イホマイドは11時開始 | 9時開始レジメン ウロテキサン・イホマイドは11時開始 | | | | |
| 手技 | | | | | | | | |
| 14 薬剤 | | | day1~3イメンド内服 | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | |
| 15 薬剤 | | | | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | |

| コード ナンバリング | sf037-01 | sf038-02 | sf039-01 | sf040-01 | sf041-01 | sf042-01 | sf043-01 | sf044-01 | sf045-01 |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 入院・外来 36 | 入院・外来 37 | 入院・外来 38 | 入院・外来 39 | 入院・外来 40 | 入院・外来 41 | 入院・外来 42 | 入院・外来 43 | 入院・外来 44 |
| ルート | ケモセーフ (メインフィルターなし) | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) | ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) | ケモセーフ | ケモセーフ | ケモセーフ |
| プロトコール 名 | 5-day ETP療法 | キイトルーダ(3週毎) | キイトルーダ(6週毎) | DG療法 | Bev+ドキシル (BSA1.5ml未満) | Bev+ドキシル (BSA1.5ml以上) | Bev+PTX | キイトルーダ+PTX+CBDDCA | キイトルーダ+PTX+CBDDCA+Bev |
| 投与順序 | 1 薬剤 | 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body) | 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body) | | 生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 下ルートより | 生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 下ルートより | | 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body) | 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body) |
| 手技 | day1~5 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | day1 | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(90分) | day1,15 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 2 薬剤 | グラニセロン注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし | 生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で | 生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で | カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V | 5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし | 5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし | 生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 Rp.2と同時にレスシニコウ5T内 | カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にレスシニコウ5T内 | カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にレスシニコウ5T内 |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(5分) | 持続点滴末梢(5分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 3 薬剤 | 5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド注(80mg/mf) | 休業完了day21 | 休業完了day42 | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/mf) | 5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注 (40mg/mf) | 5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注 (40mg/mf) | カイトリル注3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2 と同時にレスシニコウ5T内服 | 生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf) | 生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf) |
| 手技 | 持続点滴末梢(90分) | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(120分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(180分) | 持続点滴末梢(180分) |
| 4 薬剤 | 休業完了day14 | | | | 5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.3と同じ速度で | 5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.3と同じ速度で | 生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf) | 生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC5) MAX750mg | 生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC5) MAX750mg |
| 手技 | | | | day8 | 持続点滴末梢 | 持続点滴末梢 | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(30分) |
| 5 薬剤 | | | | カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V | | | | 休業完了day21 | 生食 100mL 1瓶 アバスチン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 |
| 手技 | | | | 持続点滴末梢(30分) | day15 | day15 | day8,22 | | 持続点滴末梢(90分) |
| 6 薬剤 | | | | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/mf) | 生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 | 生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 | カイトリル注3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスシニコウ5T内 服 | | 休業完了day21 |
| 手技 | | | | 持続点滴末梢(30分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(90分) | 持続点滴末梢(30分) | | |
| 7 薬剤 | | | | 生食 250mL 1袋 ドセタキセル注(70mg/mf) 開錠時ポンピング必要 | 生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で | 生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で | 生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf) | | |
| 手技 | | | | 持続点滴末梢(60分) | 持続点滴末梢(5分) | 持続点滴末梢(5分) | 持続点滴末梢(60分) | | |
| 8 薬剤 | | | | 休業完了day21 | 初回のみday1から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与 | 初回のみday1から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与 | 休業完了day28 | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 9 薬剤 | | | | | 各クール プレドニソロン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1日分 day6から 4T 朝 1日分 | 各クール プレドニソロン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1日分 day6から 4T 朝 1日分 | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 10 薬剤 | | | | | 休業完了day28 | 休業完了day28 | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 11 薬剤 | | | | | 体表面積注意! | 体表面積注意! | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 12 薬剤 | | | | | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 13 薬剤 | | | | | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 14 薬剤 | | | | | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |
| 15 薬剤 | | | | | | | | | |
| 手技 | | | | | | | | | |