MA療法

休薬完了 day21

day−1

	メイン	側管（下ルート）
0−		
1−		
2−		
3−		
4−		
5−		
6−		
7−		
8−		
9−		
10−		
11−		
12−		
13−		
14−		
15−		
16−		
17−		
18−		
19−		
20−		
21−		
22−	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	10−:30 生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V
23−		

day1

	メイン	側管（下ルート）
0−		
1−	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2−		
3−		
4−	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
5−		
6−		
7−	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8−		
9−		9−:30 アロキシ点滴静注パック
10−	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	:30−10 生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V
11−		生食250mL 1袋 メイロン20mL 1A ﾒﾄﾄﾚｷｾｰﾄ（200mg/㎖） 下ルート、2時間で
12−		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A ﾒﾄﾄﾚｷｾｰﾄ（800mg/㎖） 下ルート、22時間で
13−	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
14−		
15−		
16−	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
17−		
18−		
19−	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20−		
21−		
22−	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
23−		

day2

	メイン	側管（下ルート）
0−		
1−	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2−		
3−		
4−	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
5−		
6−		
7−	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8−		
9−		
10−	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	10−:15 生食100mL 1瓶 ﾂﾙﾍﾟﾄﾞﾛｰﾙ注40mg 1.5V
11−		生食500mL シタラビン（3g/㎡） 全量500mL 下ルート、3時間で
12−		
13−	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
14−		
15−		
16−	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
17−		
18−		
19−	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20−		
21−		;30−22 生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V
22−	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
23−		22:05−:20 生食100mL 1瓶 ﾂﾙﾍﾟﾄﾞﾛｰﾙ注40mg 1.5V 生食500mL シタラビン（3g/㎡） 全量500mL 下ルート、3時間で

10時までに調製して払い出し

10時までに調製して払い出し

day3

	メイン	側管（下ルート）
0−		
1−	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2−		
3−		
4−	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
5−		生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
6−		
7−	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8−		
9−		
10−	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
11−		10:05−:20 生食100mL 1瓶 ﾂﾙﾍﾟﾄﾞﾛｰﾙ注40mg 1.5V
12−		生食500mL シタラビン（3g/㎡） 全量500mL 下ルート、3時間で
13−	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
14−		
15−		
16−	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
17−		生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
18−		
19−	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20−		
21−		
22−	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
23−		22:05−:20 生食100mL 1瓶 ﾂﾙﾍﾟﾄﾞﾛｰﾙ注40mg 1.5V 生食500mL シタラビン（3g/㎡） 全量500mL 下ルート、3時間で

10時までに調製して払い出し

day4

	メイン	側管（下ルート）
0−		
1−	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2−		
3−		
4−	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
5−		生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
6−		
7−	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8−		
9−		
10−	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
11−		
12−		
13−	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
14−		
15−		
16−	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
17−		生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
18−		
19−	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20−		
21−		
22−	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
23−		

day5

	メイン	側管（下ルート）
0−		
1−	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2−		
3−		
4−	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
5−		生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
6−		
7−	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8−		
9−		
10−	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
11−		
12−		
13−	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
14−		
15−		
16−	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
17−		生食100mL 1瓶 ﾀﾞｲﾄﾓｯｸｽ注500mg 0.5V30分
18−		
19−	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20−		
21−		
22−	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ｵｷｻﾀﾞﾘﾝ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
23−		

上記の外枠が［　　］のRpのみケモ室から払い出し
それ以外は注射カートで払い出し