

コード テンパリング	bk016-01	bk017-01	bk018-01	bk019-01	bk020-01	bk021-01	bk022-01	bk023-01	bk024-01	bk025-01	bk026-01	bk027-01	bk028-01, bk029-01, bk030-01		
プロトコル名	入院・外来 ケモセーブ B-R療法(120mg/㎡)	入院 ケモセーブシリシジ CHOP+R療法	入院 ケモセーブ(下ルート) HD-MTX療法	入院・外来 シリシジ DBd療法1~3	入院・外来 シリシジ DBd療法4~8	入院・外来 シリシジ DBd療法9~	入院・外来 シリシジ DLd療法1, 2	入院・外来 シリシジ DLd療法3~6	入院・外来 シリシジ DLd療法7~	入院・外来 シリシジ DMPB療法1	入院・外来 シリシジ DMPB療法2~9	入院・外来 シリシジ DMPB療法10~	入院・外来 ケモセーブ R-GCVP療法 1, 2, 3~		
投与順序	1 薬剤		プレドニ注20mg 1A メトキシセート(10mg/body) シロチン注 (40mg/body) 生食注 4mL	day1のRb.8~13(12時以降投与分は調整室から払い出し、その後は入院専科注射(カート)で払い出し。	デカドロン 内服処方有り	デカドロン 内服処方有り	デカドロン 内服処方有り	デカドロンレブレマド 内服処方有り	デカドロンレブレマド 内服処方有り	デカドロンレブレマド 内服処方有り	アルケラン・ブレドニン 内服処方有り	アルケラン・ブレドニン 内服処方有り	アルケラン・ブレドニン 内服処方有り	GCVP療法	R療法(血液15使用)
手続	day1	day2	継続内注(濃縮)	day1, 8	day1	day1	day1, 8, 15, 22	day1, 18	day1	day1, 8, 22, 29	day1, 22	day1	day1	GCVP療法の前またはday2~7のいずれか	
2 薬剤	カイトリル注h73mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注h73mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	73mg h7注h73mg 1袋	別紙	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	73mg h7注h73mg 1袋	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1V
3 薬剤	生食 50mL 1瓶 トリアキシン注(120mg/㎡) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 50mL 1瓶 トリアキシン注(120mg/㎡) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 50mL 1瓶 オシロニド (1.4mg/㎡) MAX 2mg/body 5~6分で投与	生食500mL 1袋 フルキモト (800mg/㎡) メドロン20mL 1A 全量500mL	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤	休薬完了day28	休薬完了day28	休薬完了day28	休薬完了day28	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤	休薬完了day28	生食 50mL 1瓶 MAX 2mg/body 5~6分で投与	生食 50mL 1瓶 ボラミン 5mg 1V
4 薬剤	生食 50mL 1瓶 ボラミン 5mg 1V	休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 ドキシロピシン (80mg/㎡)	休薬完了day7			ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く	ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く	ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く	ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く		ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1ヶカル目 760mg/㎡) 開始時間→25mL/hr (2ヶカル目 416mg/㎡) (3ヶカル目以降 1000mg/㎡)	生食 50mL 1袋 リソキサン (376mg/㎡) 開始時間→25mL/hr 2日目を以降、忍容性---	
5 薬剤	生食 500mL 17袋 リソキサン (376mg/㎡) 開始時間→25mL/hr 2日目を以降、忍容性---		生食 500mL 1袋 エンドキサン (760mg/㎡)		ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤				ダラキューロ(16mL/body) シリシジ製剤 1mLあたり12~15秒(全量3~5分かけて 置伏針使用	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤		生食 500mL 1袋 エンドキサン (760mg/㎡)	休薬完了day1	
6 薬剤		休薬完了day1				休薬完了day21					休薬完了day42		休薬完了day1		
7 薬剤	トリアキシン 凍結時、室温で溶解後に調製	CHOPは3週間休薬する		ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤	ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く					ボルテゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリシジ製剤	ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く		day1~5 フレドニド 100mg/body 前投薬、支持療法 処方有り		
8 薬剤	<リソキサンの投与速度> 【初回】 開始1時間→25mL/hr その後1時間→100mL/hr その後→200mL/hr		8mLシリシジで調製 ①M750mg 1Vあたり生食4mLで溶解 ②溶解液1.2mLと40μL 2mLを混合 ③混合液でフレドニドを溶解 ※ケモセーブ経験者が調製	休薬完了day21							休薬完了day42		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1ヶカル目 760mg/㎡) (2ヶカル目 416mg/㎡) (3ヶカル目以降 1000mg/㎡)	R療法、GCVP療法(day1)を2つのレジメンに分拆、組み合わせR-GCVPレジメンとして使用。休薬完了day2であることを確認すること。	
9 薬剤	【2日目以降、忍容性あり】 ①か②のどちらかで投与可能 ①開始1時間→100mL/hr その後→200mL/hr			ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く						ダラキューロ製剤前、常温で30分以上置く			生食 50mL 1瓶 メソフルート 全開で		
10 薬剤	②主治医の指示があれば、以下の速度可 開始30分→200mL/hr その後→400mL/hr 参照 重篤な心疾患なし、採血リンパV数値3000/μL未満												休薬完了day1		
11 薬剤															
12 薬剤															
13 薬剤															
14 薬剤															

コード ランバリング	bk031-01	bk032-01	bk033-01	bk034-01	bk035-01	bk036-01	bk037-01	bk038-01	bk039-01	bk040-01	bk041-01	bk042-01	
	入院 ケモセーフ	入院・外来 シリシジ	入院・外来 シリシジ	入院・外来 シリシジ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	
プロトコル名	ロイスタチン	DOyBoD療法1, 2	DOyBoD療法3~6	DOyBoD療法7~	EPD療法(50kg未満)1, 2	EPD療法(50kg未満)3~	EPD療法(50~90kg)1, 2	EPD療法(50~90kg)3~	EPD療法(90kg超)1, 2	EPD療法(90kg超)3~	weeklyKd療法1	weeklyKd療法2~	
投与順序	1 薬剤 生食 500mL 1袋 ロイスタチン(0.09mg/kg)	予カドロンシクロホスファミド内服処方あり	予カドロンシクロホスファミド内服処方あり	予カドロンシクロホスファミド内服処方あり	day1~21:ネマシタ4mg内服処方あり day1,8,15,22:レナデックス28mg内服処方あり(76歳以上は8mg)	day1~21:ネマシタ4mg内服処方あり day1:レナデックス28mg内服処方あり(76歳以上は8mg) day8,15,22:レナデックス40mg内服処方あり(76歳以上は20mg)	day1~21:ネマシタ4mg内服処方あり day1:レナデックス28mg内服処方あり(76歳以上は8mg)	day1~21:ネマシタ4mg内服処方あり day1:レナデックス28mg内服処方あり(76歳以上は8mg) day8,15,22:レナデックス40mg内服処方あり(76歳以上は20mg)	day1~21:ネマシタ4mg内服処方あり day1,8,15,22:レナデックス28mg内服処方あり(76歳以上は8mg)	day1~21:ネマシタ4mg内服処方あり day1:レナデックス28mg内服処方あり(76歳以上は8mg) day8,15,22:レナデックス40mg内服処方あり(76歳以上は20mg)	day22 レナデックス40mg内服	day22 レナデックス40mg内服	
手技	特続点滴実施(24時間)	day1, 8, 15, 22	day1, 15	day1	day1, 8, 15, 22	day1	day1, 8, 15, 22	day1	day1, 8, 15, 22	day1	day1	day1, 8, 15	
2 薬剤 生食 50mL 1瓶		ダラキユーロ(16mL/body)シリシジ調製 生食20mL 1A 1mLあたり12~15秒(全量3~5分)かけて 薬液注射使用	ダラキユーロ(16mL/body)シリシジ調製 生食20mL 1A 1mLあたり12~15秒(全量3~5分)かけて 薬液注射使用	ダラキユーロ(16mL/body)シリシジ調製 生食20mL 1A 1mLあたり12~15秒(全量3~5分)かけて 薬液注射使用	生食 100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 1V ファミモジシ注20mg 1A Ro.1と同時にはシタジコウS錠加7~9服用	生食 100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 1V ファミモジシ注20mg 1A Ro.1と同時にはシタジコウS錠加7~9服用	生食 100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 1V ファミモジシ注20mg 1A Ro.1と同時にはシタジコウS錠加7~9服用	生食 100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 1V ファミモジシ注20mg 1A Ro.1と同時にはシタジコウS錠加7~9服用	生食 100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 1V ファミモジシ注20mg 1A Ro.1と同時にはシタジコウS錠加7~9服用	生食 100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 1V ファミモジシ注20mg 1A Ro.1と同時にはシタジコウS錠加7~9服用	5%ブドウ糖100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 5V ファミモジシ注20mg 1A ファミモジシ注20mg 1A	5%ブドウ糖100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 5V ファミモジシ注20mg 1A ファミモジシ注20mg 1A	
手技	特続点滴実施	皮下投与	皮下投与	皮下投与	特続点滴実施(15分)	特続点滴実施(15分)	特続点滴実施(15分)	特続点滴実施(15分)	特続点滴実施(15分)	特続点滴実施(15分)	特続点滴実施(30分)	特続点滴実施(30分)	
3 薬剤 休薬完了 day28		ホルテゾミブ(1.3mg/1ml)シリシジ調製	ホルテゾミブ(1.3mg/1ml)シリシジ調製	休薬完了 day28	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水20mL 1A カイロリス注(20mg/1ml)注射用水は清濁用	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(70mg/1ml)注射用水は清濁用 全量を100mLに	
手技		皮下投与	皮下投与		特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(30分)	特続点滴実施(30分)	
4 薬剤		休薬完了 day28		ダラキユーロ調製前、常量で30分以上置く	生食250mL 150mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食250mL 150mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食250mL 150mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食250mL 150mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食250mL 150mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食250mL 150mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食500mL 350mL IL7リソ注(10mg/kg) 注射用水100mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶
手技			day28 22		下投薬前	下投薬前	下投薬前	下投薬前	下投薬前	下投薬前	特続点滴実施(45分)	特続点滴実施(45分)	
5 薬剤		ダラキユーロ調製前、常量で30分以上置く	ホルテゾミブ(1.3mg/1ml)生食20mL 1Aシリシジ調製		【初回】 開始~30分:20mL/hr 認容性良~30~60分:80mL/hr 認容性良~60分~終了:120mL/hr	【コース目】 開始~30分:180mL/hr 認容性良~30~60分:60mL/hr 終了:240mL/hr	【初回】 開始~30分:30mL/hr 認容性良~30~60分:60mL/hr 認容性良~60分~終了:120mL/hr	【コース目】 開始~30分:180mL/hr 認容性良~30~60分:60mL/hr 終了:240mL/hr	【初回】 開始~30分:30mL/hr 認容性良~30~60分:60mL/hr 認容性良~60分~終了:120mL/hr	【コース目】 開始~30分:180mL/hr 認容性良~30~60分:60mL/hr 終了:240mL/hr		休薬完了 day28	
手技			皮下投与								day8, 15		
6 薬剤		休薬完了 day28			【4回目】 認容性良~開始~30分:180mL/hr 認容性良~30~終了:240mL/hr	【コース目以降】 認容性良~300mL/hr	【2回目】 認容性良~開始~30分:180mL/hr 認容性良~30~終了:240mL/hr	【4コース目以降】 認容性良~300mL/hr	【2回目】 認容性良~開始~30分:180mL/hr 認容性良~30~終了:240mL/hr	【4コース目以降】 認容性良~300mL/hr	5%ブドウ糖100mL 1瓶 フィキサート注6.6mg 5V カイロリス注(70mg/1ml)注射用水は清濁用 全量を100mLに		
手技											特続点滴実施(30分)		
7 薬剤		ダラキユーロ調製前、常量で30分以上置く			【3回目以降】 認容性良~300mL/hr	休薬完了 day28	【3回目以降】 認容性良~300mL/hr	休薬完了 day28	【3回目以降】 認容性良~300mL/hr	休薬完了 day28			
手技											特続点滴実施(30分)		
8 薬剤					休薬完了 day28		休薬完了 day28		休薬完了 day28		生食 50mL 1瓶		
手技											特続点滴実施(45分)		
9 薬剤											休薬完了 day28		
手技													
10 薬剤													
手技													
11 薬剤													
手技													
12 薬剤													
手技													
13 薬剤													
手技													
14 薬剤													
手技													

コード シリンジ	ba094-01	ba095-01	ba096-01	ba097-01	ba098-01	ba099-01	ba100-01	ba101-01	ba102-01	ba103-01	ba104-01	ba105-01	ba106-01	ba107-01	ba108-01	ba109-01	
入院・外来	入院	入院	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
プロトコル名	ケモセーフ(ドロー)	ケモセーフ(ドロー)	シリンジ	シリンジ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤	8 薬剤	9 薬剤	10 薬剤	11 薬剤	12 薬剤	13 薬剤	14 薬剤			
手技	day1	day4	day1~14	day1~14	day1	day1	持続点滴実施(15分)	持続点滴実施(15分)	腹腔内注(標準)	腹腔内注(標準)	持続点滴実施(15分)	持続点滴実施(15分)	day2~4 予キナゾリン内服40mg	day1	day1	day1	
生食	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 6V メインルート	生食 50mL 1瓶 オンピン(2mg/body) MAX 2mg/body 上ルートより5~6分で投与	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 6V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 6V	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(300mg/100mL) Rp.2と同時	
注液	中心静脈(24時間)	中心静脈(30分)	中心静脈(5分)	中心静脈(24時間)	中心静脈(200mL)	中心静脈(200mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)	中心静脈(100mL)
備考		別紙	休薬完了 day21	休薬完了 day14													
投与内容	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/body) シリンジ製剤 Rp.1投与12時間後に原則投与 主治医指示あれば投与時間変更可	キロサイド注(20mg/body) シリンジ製剤 Rp.1投与12時間後に原則投与 主治医指示あれば投与時間変更可	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤	キロサイド注(20mg/100mL) シリンジ製剤