

コード ナンバリング	hk006-01	hk007-01	hk008-01	hk009-01	hk010-01
入院	入院	入院	入外兼用	入院・外来	外来
ルート	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ
プロトコル名	M-VAC	VIP bolus	GC	TG	タキソテール・プレドニゾン
投与順序	1 薬剤	別紙	別紙	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	化学療法中 プレドニゾン錠1mg 10T分2
手技				持続点滴末梢(2h)	day1
2 薬剤	メソトレキセート(30mg/m ²) シスプラチン (70mg/m ²) ドキシソルピジン(30mg/m ²) エクザール(3mg/m ²)	イホマイド (1.2g/m ²) MAX 1.5g/m ² シスプラチン (120mg/m ²) MAX 120mg/m ² エトポシド (100mg/m ²) MAX 120mg/m ²	ゲムシタピン (1000mg/m ²) シスプラチン (70mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/m ²) MAX 1000mg/m ² Rp.1開始60分後より 下ルートより	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/m ²) 上ルートより 調製時ポンピング必要
手技				持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	全て下ルート	全て下ルート (エトポシド(ラストレット))はフィル ターなし！)	day1、2は全て下ルート day8、15は上ルート	生食 50mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2.5V Rp.2終了後全開で Rp.3と同時にレスタミンユー75錠服 用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用
手技				持続点滴側管(全開)	持続点滴末梢
4 薬剤			イメンド内服	ブドウ糖 5%500mL 1袋 パクリタキセル(175mg/m ²) MAX 210mg/m ² Rp.1終了後 下ルートより	休薬完了 day21
手技				持続点滴末梢(4h)	
5 薬剤					
手技					day8
6 薬剤				ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	
手技				持続点滴末梢(2h)	
7 薬剤				生食 50mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/m ²) MAX 1000mg/m ² Rp.1開始60分後より 下ルートより	
手技				持続点滴側管(30分)	
8 薬剤				休薬完了 day21	
手技					
9 薬剤					
手技					
10 薬剤					
手技					
11 薬剤					
手技					
12 薬剤					
手技					
13 薬剤					
手技					

コード ナンバリング	hk011-02	hk012-01	hk013-01	hk014-01	hk016-01	hk017-01	hk018-01		
	入院	入院・外来	2 外来	外来	外来	入院・外来	入院・外来		
ルート	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ	シリンジ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール 名	BEP療法		EP		タキソテール・デキサメサゾン	CDDP動注連日	トリーセル	アドリアシン単剤	ハラヴェン
投与順序	1 薬剤				化学療法中 デカドロン錠0.5mg 2T分 2		化学療法前投与 レスタミンコ-7錠 5錠 服用		
手技	day1	day2~5	day1	day2~5	day1	day1~5	day1	day1~3	
2 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(75mg/mf) 上ルートより 調製時ボンピング必要	ラクテック 500mL 1袋	生食 250mL 1袋 トリーセル (25mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(1.5h)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	グラニセロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 下ルートより Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	ラクテック 500mL 1袋	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ドキシソルピシン(30mg/body)	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン 静注(1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(1.5h)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢
4 薬剤	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後	ブドウ糖5%500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より	休業完了 day21	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2投与60分後から	休業完了 day7	休業完了 day21	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)			day15は休業
5 薬剤	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/mf)	生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/mf)		ランダ注(20mg/mf)			休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		動注			
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ(20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後	生食 500mL 1袋 ランダ(20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A		ラクテック 500mL 1袋			
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(90分)			
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 プレオ(30mg/body) 下ルートより	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルート		休業完了 day21			
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					
8 薬剤	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート					
手技	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					
9 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート		休業完了 day21					
手技	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(4時間45分)							
10 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート								
手技	持続点滴末梢(4時間45分)	day8、15							
11 薬剤	エトポシドはフィルターなし!	生食 100mL 1瓶 プレオ(30mg/body) 下ルートより							
手技		持続点滴末梢(60分)							
12 薬剤	イメンド内服	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用							
手技		持続点滴末梢							
13 薬剤		休業完了 day21							
手技									

コード ナンバリング	hk019-01
ルート	入院 ・ 外来 ケモセーフ
プロトコール 名	オブジーボ(2週毎)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	休薬完了day14
手技	
4 薬剤	
手技	
5 薬剤	
手技	
6 薬剤	
手技	
7 薬剤	
手技	
8 薬剤	
手技	
9 薬剤	
手技	
10 薬剤	
手技	
11 薬剤	
手技	
12 薬剤	
手技	
13 薬剤	
手技	

コード ナンバリング	hk020-01	hk021-01	hk022-01	hk023-01	hk024-01	hk025-01	hk026-01	hk027-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコル 名	ジェブタナ	パラプラチン・ゲムシタピン	パラプラチン・ Monthlyタキソール	GC(ショートハイドレーション)	キイトルーダ(3週毎)	オブジーボ+ヤーボイ	エビルピシン勝注	バベンチオ療法
1 薬剤	プレドニゾン錠 10mg/日併用	イメンド内服	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Ro.1と同時にシリンジ-7.5錠	イメンド内服	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	エビルピシン注(30mg/body) 生食50mL 1瓶 生食は溶解用	生食 50mL 1瓶 ボララミン注 1A
手技	day1	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V ボララミン注5mg 1A	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋	アロキソ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に経口補水液(OSI)1L 摂取	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶	休薬完了day7	アセリオ静注用 650mg
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(15分)
3 薬剤	生食100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	休薬完了day21	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	生食でvolume upする	生食 250mL 1瓶 バベンチオ注(10mg/kg)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 ジェブタナ(25mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		生食 50mL 1瓶	生食4mL/Vで溶解して、 全量36mLとし、50mLシリ ンジに調製する	休薬完了day14
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(5分)		
5 薬剤				マンニトール 200mL		休薬完了day21	先に生食24mL抜き取り、エビルピ シン12mL吸い切って全量36mLと する。	適応によってはインライタ処方 あり インライタ1回5mg 1日2回
手技	day3	day8	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(30分)				
6 薬剤	ジーラスタ皮下注3.6mg 1筒	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 全量を500mLに		4回投与後、オブジーボ単剤へ		
手技	皮下投与	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)				
7 薬剤	休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	カルボプラチンはAUC5に減 量されているも問い合わせ不 要	ソルデム3A 500mL 1袋				
手技		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)				
8 薬剤								
手技		day15は、休薬週		day8、15				
9 薬剤		休薬完了day21		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V				
手技				持続点滴末梢(30分)				
10 薬剤				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)				
手技				持続点滴末梢(30分)				
11 薬剤								
手技				day22は、休薬週				
12 薬剤				休薬完了day28				
手技								
13 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	hk028-01	hk029-01	hk030-01	hk031-01	hk032-01	hk033-01	hk034-01	hk035-01
入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコル 名	ジェムザール+RT	ジェムザール	オブジーボ(4週毎)	キイトルーダ(6週毎)	Weekly CDDP(40mg/m ²)	Weekly CDDP(40mg/m ²)SH	パドセブ療法	シスプラチン・ラステット
投与順序	1 薬剤 生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	デカドロン8mg/日内服 (Day2~4)	デカドロン8mg/日内服 (Day2~4)		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投点中に水分1L摂取
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(27mg/m ²)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	day1,4,8,11,15,18,22,25の計8回	day1~day15の計3回	休薬完了day28	休薬完了day42	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 50mL 1瓶 パドセブ注(1.25mg/kg) 注射用水20mL 1A 注射用水は溶解用	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq
手技					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	休薬完了day28				グラニセトロン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	マンニトールS 200mL	休薬完了day28	マンニトールS300mL 200mL
手技		day22は休薬			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
5 薬剤		休薬完了day7			生食500mL 1袋 ランダ(40mg/m ²) 全量を500mLに よルルートより	生食500mL 1袋 ランダ(40mg/m ²) 全量を500mLに よルルートより		生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/m ²) 全量を500mL 下ルートより
手技					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)
6 薬剤					マンニトール300mL 1瓶 メインルート	ラクテック500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋
手技					持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)
7 薬剤					ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	休薬完了day7		
手技					持続点滴末梢(120分)			day2,3
8 薬剤					ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	イメンド内服		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技					持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)
9 薬剤					ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²)
手技					持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(90分)
10 薬剤					休薬完了day7			
手技								day8,15は、休薬週
11 薬剤					イメンド内服			休薬完了day21
手技								
12 薬剤								イメンド内服
手技								
13 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	hk036-01	hk037-01
ルート	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート)
プロトコール 名	ddM-VAC	ddM-VAC(ショートハイドレーション)
投与順序	1 薬剤 別紙	
手技		day1
2 薬剤	メントレキセート(30mg/㎡) エクザール(3mg/㎡) ドキシソルピシン(30mg/㎡) シスプラチン (70mg/㎡)	ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 2A メインルート
手技		持続点滴末梢(2hr)
3 薬剤	全て下ルート	生食100mL 1瓶 メントレキセート(30mg/㎡) 下ルートより
手技		持続点滴末梢(30分)
4 薬剤		
手技		day2
5 薬剤		アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V
手技		持続点滴末梢(30分)
6 薬剤		生食 50mL 1瓶 エクザール(3mg/㎡)
手技		持続点滴末梢(15分)
7 薬剤		生食 50mL 1瓶 ドキシソルピシン(30mg/㎡)
手技		持続点滴末梢(15分)
8 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 1A
手技		持続点滴末梢(60分)
9 薬剤		マンニトールS 200mL
手技		持続点滴末梢(30分)
10 薬剤		生食500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 余量500mL
手技		持続点滴末梢(120分)
11 薬剤		生食250mL 1袋
手技		持続点滴末梢(30分)
12 薬剤		休薬完了day14
手技		
13 薬剤		
手技		