

MA療法(レボホリナート代替)

休業完了 day2!

day-1		day1		day2	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-					
1-		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2-					
3-					
4-		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
5-					
6-					
7-		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8-					
9-			9:-30 アロキシ点滴静注バック		
10-		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	:30-10 生食100mL 1瓶 ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ500mg 0.5V	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	10:-15 生食100mL 1瓶 ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ500mg 0.5V
11-		生食250mL 1袋 メイロン20mL 1A ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ(200mg/ml) 下ルート、2時間		生食500mL シタラシン(3g/ml) 生食500mL 下ルート、3時間	
12-		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ(800mg/ml) 下ルート、22時間			
13-		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食100mL 1瓶 ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ500mg 0.5V30分
14-					
15-					
16-		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
17-					
18-					
19-		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20-					
21-					13:30-22 生食100mL 1瓶 ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ500mg 0.5V
22-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day2に調製
23-					22:05-20 生食100mL 1瓶 ﾌﾞｲﾌﾞｲﾌﾞ500mg 0.5V 生食500mL シタラシン(3g/ml) 生食500mL 下ルート、3時間

day3		day4		day5	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-					
1-		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2-					
3-					
4-		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day2に調製	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day4に調製
5-					
6-		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
7-					
8-					
9-					
10-		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day2に調製	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day3に調製
11-					
12-					
13-		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
14-					
15-					
16-		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day3に調製	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート 7.5mg 生食50m 1瓶 5分投与 day4に調製
17-					
18-					
19-		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20-					
21-					
22-					
23-					

10時までに調製して払い出し

10時までに調製して払い出し

12時投与のシタラシンは10時までに調製して払い出し

レボホリナートと夜のシタラシンは16時までに調製して払い出し

<レボホリナート変更レジメン>  
ロイコポリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり  
ロイコポリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg

上記の外枠が [ ] のRpのみケモ室から払い出し  
それ以外は注射カートで払い出し

<レボホリナート代替レジメン ルール>  
・レボホリナートは全て薬剤室で調製する(土日含む)  
平日はケモ調製室、土日はTPN調製時に調製する  
・当日午後～翌日午前分のレボホリナートを調製する  
(レボホリナートは調製後24時間安定データあり)  
・土日のレボホリナートは、医師の確定入力なしで調製してOKです  
・9:00までに削除されたら調製しないよう注意する  
・払い出しはケモ調製室 または薬剤室のバリエーション

<レボホリナート代替レジメン ルール(化学療法担当者用)>  
・レボホリナート代替レジメンは最終日まで処方箋発行する  
・調製日別にレボホリナートを振り分ける **翌日午前分まで前日に調製必要!**  
・土日分は、わかりやすいようピンクのヒック用注射トレーに準備する  
・レボホリナート25mg 1瓶でRp.3つ分まで抜き取り可能  
・患者掲示板で医師宛てに「レボホリナート削除時は、前日9:00までに削除してください」と記載する