

bn130-01 MPV(レボホリナート代替) 投与スケジュール		1クール day7		day3		day4		day5			
day1		day2		day3		day4		day5			
メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)		
0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-30 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day3に調製	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
1-			1-			1-			1-		
2-			2-			2-			2-		
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
4-			4-			4-			4-		
5-			5-			5-			5-		
6-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day3に調製	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
7-			7-		:30-9 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	7-			7-		
8-			8-			8-			8-		
9-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
10-		11-30 グラニトロン 1袋	10-			10-			10-		
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	11-			11-			11-		
12-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/㎡) MAX 2mg/body 下ルート 5~6分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day3に調製	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
13-			13-			13-			13-		
14-			14-			14-			14-		
15-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A マトレキセト (3500mg/㎡) 全量500mLに 下ルート	15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
16-			16-			16-			16-		
17-			17-			17-			17-		
18-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day3に調製	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
19-			19-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	19-			19-		
20-			20-			20-			20-		
21-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
22-			22-			22-			22-		
23-			23-			23-			23-		

day1の12時以降投与分のみケモ調製室から払い出し  
その他は入院予約注射(カート)で払い出し

<レボホリナート変更レジメン>  
ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり  
ロイコボリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg

奇数コースのみプロカルバジン(100mg/㎡ 7日間)内服

<レボホリナート代替レジメン ルール>  
 ・レボホリナートは全て薬剤室で調製する(土日含む)  
 ・平日はケモ調製室、土日はTPN調製時に調製する  
 ・当日午後~翌日午前分のレボホリナートを調製する  
 (レボホリナートは調製後24時間安定データあり)  
 ・土日のレボホリナートは、医師の確定入力なして調製してOKです  
 ・9:00までに削除されたら調製しないよう注意する  
 ・払い出しはケモ調製室 または薬剤室のペパボックスから

<レボホリナート代替レジメン ルール(化学療法担当者用)>  
 ・レボホリナート代替レジメンは最終日まで処方箋発行する  
 ・調製日別にレボホリナートを振り分ける 翌日午前分まで前日に調製必要!  
 ・土日は、わかりやすいようピンクのピッカー用注射トレーに準備する  
 ・レボホリナート25mg 1瓶でRp.3つ分まで抜き取り可能  
 ・患者掲示板で医師宛てに「レボホリナート削除時は、前日9:00までに削除してください」と記載する