

# SMILE療法 day1~5 (レボホリナート代替)

# 1クール day28

day1		day2		day3		day4		day5		
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	
0-		0-		0-		0-		0-		
1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2-										
3-										
4-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
5-										
6-										
7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8-										
9-										
10-		11-:30 グラセパド 1袋		9-9:30 グラセパド 1袋 デキサート注6.6mg 5V :30-10 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V		9-9:30 グラセパド 1袋 デキサート注6.6mg 5V :30-10 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V		9-9:30 グラセパド 1袋 デキサート注6.6mg 5V :30-10 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V		9-9:30 グラセパド 1袋 デキサート注6.6mg 5V :30-10 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V
11-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
12-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V		5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)		5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)		5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)		5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)
13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
14-		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A 外挿赤ト (2000mg/ml) 全量500mLに 下ルート		③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day2に調製 加注射投与後 5分投与		③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day3に調製 加注射投与後 5分投与		③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day4に調製 加注射投与後 5分投与		③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day5に調製 加注射投与後 5分投与
15-				13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg
16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
17-				14-16 生食500mL 1袋 イボマド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)		14-16 生食500mL 1袋 イボマド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)		14-16 生食500mL 1袋 イボマド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)		14-16 生食500mL 1袋 イボマド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)
18-				18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg
19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V		④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day2に調製 加注射投与後 5分投与		④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day3に調製 加注射投与後 5分投与		④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day4に調製 加注射投与後 5分投与		④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全量で day5に調製 加注射投与後 5分投与
21-				:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V :30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V :30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V :30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg		:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イワツ注500mg 0.5V :30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg
22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
23-										

11:00までに払い出し

エトボシドは9:30までに払い出し  
③レボホリナート以下は間に合わなければ12:00までに払い出し

エトボシドは9:30までに払い出し  
③レボホリナート以下は間に合わなければ12:00までに払い出し

エトボシドは9:30までに払い出し  
③レボホリナート以下は間に合わなければ12:00までに払い出し

12:00までに払い出し

外挿赤のみケモ調製室から払い出し  
その他は入院予約注射(カート)で払い出し

<レボホリナート変更レジメン>

ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり  
ロイコボリン3mg 3A → レボホリナート 7.5mg