

コード	kk001-06	kk002-05	kk003-05	kk004-06	kk005-06	kk006-06	kk007-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ シスプラチン・ ジェムザール	ケモセーフ シスプラチン・ ナベルピン	ケモセーフ シスプラチン・ TS-1	ケモセーフ シスプラチン・ カンプト	ケモセーフ シスプラチン・ タキソテール	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) シスプラチン・ ラストット	ケモセーフ パラプラチン・ Monthlyタキソール
投与順序 1 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	★TS-1開始時がday1	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスチンコー75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食50mL 1瓶 ロゼウス(20mg/㎡) 全開で	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 イリノテカン(60mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタセル(80mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボンド(100mg/㎡)	カイトリル注バッグ3mg 1袋
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX800mg
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mL 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休薬週
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	休薬完了day21
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
7 薬剤							カルボプラチンはAUC5に減量 されていても問い合わせ不要
手技	day8	day8	day15,22,29は、休薬週	day8,15	day8,15は、休薬週	day2,3	
8 薬剤	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス(20mg/㎡) 全開で	休薬完了day35	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 ルートキーブ用	イメンド内服	生食 500mL 1袋 イリノテカン(60mg/㎡)	イメンド内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボンド(100mg/㎡)	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)	
10 薬剤							
手技	day15は、休薬週	day15は、休薬週		day22は、休薬週		day8,15は、休薬週	
11 薬剤	休薬完了day21	休薬完了day21		休薬完了day28		休薬完了day21	
手技							
12 薬剤	イメンド内服	イメンド内服		イメンド内服		イメンド内服	
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk008-03	kk009-04	kk010-03	kk011-03	kk012-03	kk013-03	kk014-03	kk016-03	kk017-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ パラブラチン・ weeklyタキソール	ケモセーフ weeklyパラブラチン・ タキソール・RT	ケモセーフ パラブラチン・ タキソール	ケモセーフ パラブラチン・ ジェムザール	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) パラブラチン・ ラステット	ケモセーフ パラブラチン・ カンプト	ケモセーフ パラブラチン・ TS-1	ケモセーフ タキソール	ケモセーフ Triweeklyタキソール
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にレスタシコー75錠服用	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ボンピング必要	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ボンピング必要
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(40mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 4) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン(40mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg		5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	day8	day2,3	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(120分)	
5 薬剤		休業完了 day7	休業完了 day21	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	day1~15まで計3コース	休業完了 day21	day1~15まで計3コース	
手技	day8,15			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day22は、休業週		day22は、休業週	
6 薬剤	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にレスタシコー75錠服用	day1~36まで計6コース		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)	休業完了 day28		休業完了 day28	
手技	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)				
7 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋								
手技	持続点滴末梢(30分)			day15は、休業週	day8,15は、休業週				
8 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)			休業完了 day21	休業完了 day21				
手技	持続点滴末梢(120分)								
9 薬剤									
手技	day22は、休業週								
10 薬剤	休業完了 day28								
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									
16 薬剤									
手技									
17 薬剤									
手技									

コード	kk018-03	kk019-03	kk020-05	kk022-04	kk023-03	kk024-03	kk025-04	kk026-03	kk027-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	Biweeklyタキソテール	ジェムザール	ナベルピン	カンプト	カルセド	ハイカムチン	シスプラチン・アリムタ	Biweekly ジェムザール	Biweekly パラプラチン・カンプト
1 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注1mg筋注	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	day1,8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/mf) 調製時ポンピング必要	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/mf)	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 ハイカムチン(1.0mg/mf)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (40mg/mf)
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 50mL 1瓶 ルートキーブ用	day1~15まで計3コース	生食 100mL 1瓶 カルセド (40mg/mf) 全開で Rp.1終了後	day1~5まで計5コース	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	休業完了day14	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg
手技	day8は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管	day22は、休業週	持続点滴側管(約10分)		持続点滴末梢(10分)		持続点滴末梢(120分)
4 薬剤		day1~15まで計3コース	day1~8まで計2コース	休業完了day7	day1~3	休業完了day21	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		
手技	day15	day22は、休業週	day15は、休業週				持続点滴末梢(60分)		day8は、休業週
5 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了day28	休業完了day21		休業完了day21		マンニトールS 200mL		休業完了day14
手技	持続点滴末梢(30分)						持続点滴末梢(30分)		
6 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル(35mg/mf)						生食 500mL 1袋 ランダ (75mg/mf) 全量を500mL		
手技	持続点滴末梢(90分)						持続点滴末梢(120分)		
7 薬剤							ソルデム3A500mL 1袋		
手技	day22は、休業週						持続点滴末梢(60分)		
8 薬剤	休業完了day28								
手技							day8,15は、休業週		
9 薬剤							休業完了day21		
手技									
10 薬剤							イメンド内服		
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									
16 薬剤									
手技									
17 薬剤									
手技									

コード	kk028-02	kk029-03	kk030-02	kk031-02	kk032-01	kk033-01	kk034-01	kk035-06
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
1	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 ファミテジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
2	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ボンピング必要	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V 投与中に水分1L摂取
3	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(200mg/mf)	休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	生食 500mL 1袋 アクブラ (100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/mf) 調製時ボンピング必要
4	休薬完了day21	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ラクテック500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1B 硫酸Mg 8mEq
5		生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可			休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ラクテック500mL 1袋	マンニトールS 200mL
6		休薬完了day21		休薬完了day21			休薬完了day21	生食 500mL 1袋 ランダ (40mg/mf) 全量を500mL
7						休薬完了day21		ソルデム3A500mL 1袋
8								day15.22.43は、休薬週
9								休薬完了day49
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

コード	kk036-01	kk037-01	kk038-01	kk039-01	kk040-01	kk041-01	kk042-01	kk043-01	kk044-01
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	ドセタキセル+サイラムザ	オブジーボ(2週毎)	カルボプラチン+アブラキサン	キイトルーダ(3週毎)	テセントリク	イミフィンジ	キイトルーダ・パラプラチン・アリムタ	キイトルーダ・パラプラチン・Monthlyタキソール	キイトルーダ・シスプラチン・アリムタ
1 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75T内服	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 イミフィンジ注(10mg/kg)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1
2 薬剤	生食250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了day14	生食100mL (20mL/rl) アブラキサン注(100mg/rl) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day14	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注ハッグ3mg 1袋	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分L摂取
手技	持続点滴末梢		持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生理食塩液250mL 1袋 ドセタキセル (60mg/rl) 調製時ポンピング必要		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより			12か月(1年間)で終了	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/rl)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/rl)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/rl)
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)				持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(10分)
5 薬剤	休業完了day21		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq
手技			day8,15				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
6 薬剤			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし				day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	マンニトールS 200mL
手技			持続点滴末梢(30分)				day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤			生食100mL (20mL/rl) アブラキサン注(100mg/rl) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄				休業完了day21	休業完了day21	生食 500mL 1袋 ランタ (75mg/rl) 全量を500mL
手技			持続点滴末梢(30分)						持続点滴末梢(120分)
8 薬剤			休業完了day21					カルボプラチンはAUC5に減量 されているも問い合わせ不要	ソルデム3A500mL 1袋
手技									持続点滴末梢(60分)
9 薬剤									day8,15は、休業週
手技									
10 薬剤									休業完了day21
手技									
11 薬剤									イメンド内服
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									
16 薬剤									
手技									
17 薬剤									
手技									

コード	kk045-01	kk046-01	kk047-01	kk048-01	kk049-01	kk050-01	kk051-01
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
投与順序	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋 注	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 ケイトルーダ・カルボプラチン+ アブラキサン	イメンド内服	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)
手技	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	day1	day3	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ケイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1袋 ヘパンスマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ヘパンスマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ケイトルーダ注(200mg/body) 下ルートより	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V 5p.1と同様にスリムコー75錠服	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピシン注(40mg/ mf)	生食 50mL 1瓶 オンコピン(0.6mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	アロキシ注バッグ3mg 1袋	休薬完了day21	生食100mL(20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day4	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	休薬完了day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(200mg/mf)		生食500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX800mg 下ルートより	マンニトール 200mL		
手技		持続点滴末梢(180分)		day8.15	持続点滴末梢(30分)	day2.3	day2.3
6 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg			生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/mf) 全量を500mLに	ラクテック500mL 1袋 メイロン 20mL 1A	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技		持続点滴末梢(120分)		day8.15	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤		休薬完了day21		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	ソルデム3A 500mL 1袋	生食 100mL 1瓶 エンドキサン注(700mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)
手技				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
8 薬剤				生食100mL(20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄		休薬完了day21	
手技				day2	day2	day8.15は、休薬週	
9 薬剤				休薬完了day21	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		休薬完了day21
手技					持続点滴末梢(30分)		
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk052-01	kk053-01	kk054-01	kk055-01	kk056-01	kk057-01	kk057-01	kk058-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	イミフィンジ・パラプラチン・ラステット療法	イミフィンジ・シスプラチン・ラステット療法	オブジーボ(4週毎)	キイトルーダ(6週毎)	オブジーボ+ヤーボイ(メノマ)	オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX day1	オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX day22	オブジーボ+ヤーボイ(非小細胞肺がん)
投与順序 1 薬剤	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(80mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(380mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(380mg/body)	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.2と同時にレスチンシユ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(380mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし	休業完了 day28	休業完了 day42	生食 100mL 1瓶 ヤーボイ注(3mg/kg)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	アロキシ注バッグ3mg 1袋	生食 100mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)			生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq			休業完了 day21	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.5と同時にレスチンシユ-75錠服用	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)
6 薬剤		マンニトールS 200mL			4回投与後、オブジーボ単剤へ	アロキシ注バッグ3mg 1袋	休業完了 day21	
手技	day2,3	持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(30分)		day22
7 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mL 下ルートより				5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)		生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(380mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)				持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg		生食 50mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(5分)
9 薬剤						休業完了 day21		休業完了 day42
手技	day8,15は、休業週	day2,3						
10 薬剤	休業完了 day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし						
手技		持続点滴末梢(30分)						
11 薬剤		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)						
手技		持続点滴末梢(90分)						
12 薬剤								
手技		day8,15は、休業週						
13 薬剤		休業完了 day21						
手技								
14 薬剤		イメンド内服						
手技								
15 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
17 薬剤								
手技								

コード	kk059-01	kk060-01	kk061-01	kk062-01	kk063-01	kk064-01	kk065-01	kk066-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	テセントリク・カルボプラチン+ アブラキサシ	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん)+nab-PTX+CBDCA(非扁平上皮・扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん)+PEM+CBDCA(非扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん)+PEM+CDDP(非扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん)+GEM+CBDCA(扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん)+GEM+CDDP(扁平上皮)	イミフィンジ(非小細胞肺がん)+PEM維持(非扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん)+PEM+CBDCA(非扁平上皮)
投与順序	1 薬剤		生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)		アプレピタント内服	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)
手技			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルート	生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサシ注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(5分)
5 薬剤	生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V 全開で	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了 day21	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)
6 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(10分)
7 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサシ注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)		休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
8 薬剤	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサシ注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	休業完了 day21	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 4) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		
9 薬剤	休業完了 day21		1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/㎡) 全量500mL		マンニトールS 200mL		
手技				持続点滴末梢(120分)				
10 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/㎡) 全量500mL		
手技		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		
11 薬剤		生食100mL (20mL/㎡) アブラキサシ注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄		休業完了 day21	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋		
手技		持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		
12 薬剤		休業完了 day21		1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	休業完了 day21			
手技								
13 薬剤					アプレピタント内服			
手技						カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)		
14 薬剤						生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)		
手技						持続点滴末梢(30分)		
15 薬剤						休業完了 day21		
手技								
16 薬剤								
手技								
17 薬剤								
手技								

コード	kk067-01	kk068-01
	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺癌)	サイラムザ(+erlotinib)
投与順序 1 薬剤	生食 100mL 1瓶 イジユド注(75mg/body)	生食250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg) 認容性 良 60分-30分へ短縮可
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢
3 薬剤	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	休業完了day14
手技	持続点滴末梢(60分)	
4 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	
手技	持続点滴末梢(5分)	
5 薬剤	休業完了day28	
手技		
6 薬剤		
手技		
7 薬剤		
手技		
8 薬剤		
手技		
9 薬剤		
手技		
10 薬剤		
手技		
11 薬剤		
手技		
12 薬剤		
手技		
13 薬剤		
手技		
14 薬剤		
手技		
15 薬剤		
手技		
16 薬剤		
手技		
16 薬剤		
手技		
17 薬剤		
手技		