

コード ナンバリング	sf001-03	sf002-06	sf004-06	sf005-05	sf006-03	sf007-02	sf009-01	sf010-01	sf011-03
	入院・外来 1	入院・外来 2	入院・外来 4	入院 5	入院 6	入院 7	入院・外来 9	入院・外来 10	入院 11
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ
プロトコール 名	TJ weekly	TJ	DJ	CAP	CPT-11・CDDP	weeklyCDDP・RT	ドキシル(BSA1.5ml未満)	ドキシル(BSA1.5ml以上)	AP
投与順序 1 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダ注75T内	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2. 5V Rp.1と同時にリスダ注75T内	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V	ラクテック 1袋 下ルートより	ラクテック 500mL 1袋 Rp.2と同時に		5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	ラクテック 500mL 1袋 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	day1,8,15,22,29	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
2 薬剤	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/mf)	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/mf)	生食 500mL 1袋 セタキセル注(70mg/mf) 調製時ポンピング必要	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時に	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注(50mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注(50mg/mf)	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUG6) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUG6) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUG6) MAX750mg	生食 100mL 1瓶 エビルピン注(40mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/mf)	グラネトロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時に	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.2と同じ速度で	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.2と同じ速度で	ドキシル注(80mg/mf) 生食 100mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(15分)
4 薬剤		休薬完了day21	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに	生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに	ソルデム3A500mL 1袋	初回のみday1から ピドキサル錠10mg 6T分3 5,6日間投与	初回のみday1から ピドキサル錠10mg 6T分3 5,6日間投与	生食 500mL 1袋 ランダ注(50mg/mf) 全量500mLに
手技	day8,15			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダ注75T内			生食 500mL 1袋 エンドキサン注(300mg/mf)	ラクテック 500mL 1袋 ランックス注20mg 0.25A	生食 500mL 1袋 ランダ注(40mg/mf) 全量500mLに	各クール プレドニゾン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1 日分 day6から 4T 朝	各クール プレドニゾン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1 日分 day6から 4T 朝	生食 500mL 1袋
手技	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/mf)			ソルデム3A500mL 1袋 ランックス注20mg 0.5A	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL注 1キット	ソルデム3A 500mL 1袋 ランックス注20mg 1A	休薬完了day28	休薬完了day28	ソルデム3A500mL 1袋 ランックス注20mg 0.5A
手技	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)
7 薬剤	休薬完了day21			ラクテック 1袋 KCL注 1キット	ラクテック 500mL 1袋 10%NaCl注 1筒	ソルデム3A 500mL 1袋	体表面積注意!	体表面積注意!	ラクテック 500mL 1袋 KCL注 1キット
手技				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)
8 薬剤				ソルデム3A500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋			ソルデム3A500mL 1袋
手技				持続点滴末梢(120分)	day8, day15	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)
9 薬剤				ラクテック 1袋	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V				ラクテック500mL 1袋
手技				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	day2,9,16,23,30			持続点滴末梢(120分)
10 薬剤				休薬完了day21	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋 Rp.2と同時に			休薬完了day21
手技					持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			
11 薬剤				イメンド内服	休薬完了day28	グラネトロン注キット 1袋 Rp.1と同時に			イメンド内服
手技						持続点滴末梢(30分)			
12 薬剤					イメンド内服	ソルデム3A500mL 1袋			
手技						持続点滴末梢(120分)			
13 薬剤						計 5回 休薬完了 day35			
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sf012-01	sf013-02	sf014-01	sf015-01	sf016-01	sf017-01	sf018-01		
	入院 12	入院 13	入院 14	入院 15	入院・外来 16	入院 17	入院 18		
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	カテーテルシリンジチップ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)		
プロトコール 名	CPT-11・NDP	IAP	トボテカン	CDDP腹腔内	タキソテール	EMA/CO	BEP療法		
投与順序	1 薬剤	グラネトロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	イメド内服	グラネトロン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	ラクテック500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ロイホリン錠15mg 12時間ごと に4回 マルチキート投与開始後24時間 より服用開始		
手技	持続点滴末梢(30分)	Day1~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	Day1	Day8	day1	day2~5
2 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (50mg/mf)	ラクテック500mL 1袋 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ハイカムチン(1.5mg/mf)	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/mf) 調製時ポンピング必要	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (80mg/mf)	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V ラック開始60分から メインルート	day1~5まで計5コース	生食250mL 150mL ランダ注 (80mg/mf)	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 250mL 1袋 エンドキサン注(800mg/mf)	グラネトロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 下ルートより Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)		膀胱内投与	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	
4 薬剤	ラクテック500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.25A	ドキシソルビン注 (40mg/mf) イホマイドへ継ぎ換え時 下ルートより Day4のみ	休薬完了day21	ソルデム3A500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.5A	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 エトボシド注(100mg/mf) 上ルートより	生食 20mL 1A オンコピン注 (0.8mg/mf) 下ルートより ◆シリンジで調製 MAX.2mg/kg/week 主治医が 判断	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後	ブドウ糖5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
5 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL注 1キット	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/mf) ウロキサン1回目と同時に 上ルートより		ラクテック500mL 1袋 KCL注 1キット		生食 500mL 1袋 メトレキセート(300mg/mf) 下ルートより	生食 50m mL 1瓶 全開で	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(12時間)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/mf) (イホマイドの20%相当) イホマイドと同時に 下ルートより		ソルデム3A 500mL 1袋		生食 50m mL 1瓶 全開で メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後	
手技	day8, day15	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
7 薬剤	グラネトロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 シスプラチン注 (20mg/mf) 上ルートより		ラクテック 500mL 1袋		イメド内服	生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		Day2	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5時間)	
8 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (50mg/mf)	マンニトールS 300mL 1瓶 ウロキサン2回目と同時に 上ルートより	休薬完了day7			グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(15時間)	
9 薬剤	休薬完了day28	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/mf) (イホマイドの20%相当) マンニトールと同時に 下ルートより	調製方法 別紙参照			蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	
手技		持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(4時間45分)	
10 薬剤		ラクテック 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A グラネトロンと同時に メインルート				生食 500mL 1袋 エトボシド注 (100mg/mf) 上ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート		
手技		持続点滴末梢(3hr)				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(4時間45分)	day8,15	
11 薬剤		グラネトロン注バッグ3mg 1袋 Rp.9と同時に 下ルートより				生食 50m mL 1瓶 全開で メインルートより	エトボシドはフィルターなし!	生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより	
手技		持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
12 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A ウロミテキサンと同時に メインルート					イメド内服	生食 50m mL 1瓶 ルートキー用	
手技		持続点滴末梢(3hr)						持続点滴末梢	
13 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/mf) (イホマイドの20%相当) Rp.11と同時に 下ルートより						休薬完了 day21	
手技		持続点滴末梢(30分)							
14 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A メインルート							
手技		持続点滴末梢(2hr)							
15 薬剤		休薬完了day21							
手技									

コード ナンバリング	sf019-01	sf020-01	sf021-01	sf022-02	sf023-03	sf024-04	sf025-01	sf026-01	sf027-01	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ルート	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	
プロトコール 名	ケモセーフ FP療法	ケモセーフ アドリアシン療法	ケモセーフ カンプト	ケモセーフ OP+アバステン	ケモセーフ アバステン(15mg/kg)	ケモセーフ ジェムザール	ケモセーフ DC+アバステン	ケモセーフ CPT-11(単剤)	ケモセーフ(下ルート)	
投与順序	1 薬剤 ラクテック 500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にベンナ5T内服	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にベンナ5T内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	day1,2	day3,4,5
2 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/mf) Rp.1投与60分後	生食 100mL 1瓶 ドキシルピジン(80mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 500mL 1袋 ドセタキセル注(70mg/mf) 調製時ボンピング必要	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	ラクテック 500mL 1袋	休業完了day21	day1～15まで計3コース	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg	休業完了day21	day1～day15の計3回	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	グラネセド注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	グラネセド注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより
手技	持続点滴末梢(90分)		day22は、休業	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ラクテック 500mL 1袋		休業完了day7	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可			生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可		生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(90分)		day22は休業	持続点滴末梢(90分)	day22は休業	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		イメンド内服	休業完了day21		休業完了day7	休業完了day21	休業完了day28	生食 500mL 1袋 イホマイド (2g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド (2g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)								持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/mf) 全量を500mLに								生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)								持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A 全開で								生食 500mL 1袋 ドキシルピジン注(30mg/mf) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより
手技	持続点滴末梢(5分)								持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
8 薬剤	ラクテック 500mL 1袋								マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)								持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤	ラクテック 500mL 1袋								生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/mf) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)								持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)
10 薬剤	ラクテック 500mL 1袋								ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)								持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)
11 薬剤	ラクテック 500mL 1袋								ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)								持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)
12 薬剤									ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休業完了day21
手技	day2～4								持続点滴末梢(4時間30分)	
13 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/mf)								9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始	9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始
手技	持続点滴末梢(24hr)									
14 薬剤	休業完了day21								day1～3イメンド内服	
手技										
15 薬剤	イメンド内服									
手技										

コード ナンバリング	sf028-01	sf030-01	sf031-01	sf032-01	sf033-01	sf034-01	sf035-01	sf036-01
	入院・外来 28	入院・外来 29	入院 30	入院 31	入院 32	入院 33	入院・外来 34	入院・外来 35
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	シリンジ	シリンジ
プロトコール 名	バラブラテン・ ジェムザール	ゲムシタピン+アバステン	AI療法(限定)(杉本正子)	EP/EMA療法	FA	MEA療法	5-dayメントレキセート	5-day Act-D療法
投与順序	1 薬剤	イメンド内服	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロテキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロテキサンは薬剤師が調製	ロイホリン錠15mg 12時間ごとに4回 バルネキセト投与開始後24時間より服用開始	ロイホリン錠15mg 12時間ごとに3回 バルネキセト投与開始後24時間より服用開始	蒸留水は溶解用2mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の2.5mLシリンジに調製	蒸留水は溶解用1.1mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の2.5mLシリンジに調製
手技	day1	day1	day1,2,3	day4,5	Day1	Day8	day1~5	day1~5
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 メインルートより フィルターなし	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	メントレキセート(0.4mg/kg) 蒸留水 20mL 1A 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 ◆シリンジで調製
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	グラニセロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより	グラニセロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 エトポシド注(100mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1V フルオロウラシル(1500mg/body) 上ルートより	メントレキセート(0.4mg/kg) 蒸留水 20mL 1A 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 ◆シリンジで調製
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(8hr)	静脈注射
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン(AUC 4) MAX600mg	生食 100mL 1瓶 アバステン(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1.5B メインルートより	生食 500mL 1袋 メントレキセート(300mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 メントレキセート(300mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	蒸留水 6mL メントレキセート(150mg/body) 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 下ルートより ◆シリンジで調製
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)	静脈注射	持続点滴末梢(4時間)
5 薬剤			生食 500mL 1袋 イホマイド(1.5g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド(1.5g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 エトポシド注(150mg/mf) 上ルートより	蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 500mL 1袋 メントレキセート(300mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製
手技	day3	day8,15	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(12時間)	静脈注射	静脈注射
6 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(75mg/mf) 全量を500mLに 下ルートより 点滴バッグは滅光	蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 500mL 1袋 ラステット注(100mg/body) 上ルートより	イメンド内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 500mL 1袋 ドキシルピシン注(20mg/mf) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 ラシックス 1A メインルートより			
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			
8 薬剤			マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより		グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1B メインルートより フィルターなし	
手技	day15は、休業週	day22は、休業週	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤	休業完了day21	休業完了day28	生食 100mL 1瓶 ウロテキサン注(300mg/mf) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)			静脈注射	
10 薬剤			ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			生食 500mL 1袋 ラステット注(100mg/body) 上ルートより	
手技			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)			持続点滴末梢(60分)	
11 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			休業完了day14	
手技			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)				
12 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休業完了day21			イメンド内服	
手技			持続点滴末梢(4時間30分)					
13 薬剤			9時開始レジメン ウロテキサン・イホマイドは11時開始	9時開始レジメン ウロテキサン・イホマイドは11時開始				
手技								
14 薬剤			day1~3イメンド内服					
手技								
15 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	sf037-01	sf038-02	sf039-01	sf040-01	sf041-01	sf042-01	sf043-01	sf044-01	sf045-01	sf046-01
	入院・外来 36	入院・外来 37	入院・外来 38	入院・外来 39	入院・外来 40	入院・外来 41	入院・外来 42	入院・外来 43	入院・外来 44	入院・外来 45
ルート	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	5-day ETP療法	キイトルーダ(3週毎)	キイトルーダ(6週毎)	DG療法	Bev+ドキシル (BSA1.5ml未満)	Bev+ドキシル (BSA1.5ml以上)	Bev+PTX	キイトルーダ+PTX+CBDCA	キイトルーダ+PTX+CBDCA+Bev	weekly TC
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body)		生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 下ルートより	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 下ルートより		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	
手技	day1~5	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15
2 薬剤	グラニセロン注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にレスチンコウ5T内 服	カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にレスチンコウ5T内 服	カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1 と同時にレスチンコウ5T内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトピンド注(80mg/100mL)	休業完了day21	休業完了day42	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (900mg/100mL)	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注 (40mg/100mL)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注 (40mg/100mL)	カイトリル注3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2 と同時にレスチンコウ5T内服	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (175mg/100mL)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (175mg/100mL)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/100mL)
手技	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	休業完了day14				5%ブドウ糖 100mL 1瓶 Rp.3と同じ速度で	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 Rp.3と同じ速度で	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/100mL)	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC5) MAX750mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC5) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC2) MAX300mg
手技				day8	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤				カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V				休業完了day21		生食 100mL 1瓶 アバスチン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可
手技				持続点滴末梢(30分)	day15	day15	day8,22			持続点滴末梢(90分)
6 薬剤				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (900mg/100mL)	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ5T内 服		休業完了day21	
手技				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)			
7 薬剤				生食 250mL 1袋 ドセタキセル注 (70mg/100mL) 開錠時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/100mL)			
手技				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)			
8 薬剤				休業完了day21	初回のみday1から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与	初回のみday1から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与	休業完了day28			
手技										
9 薬剤					各クール プレドニソロン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1日分 day6から 4T 朝 1日分	各クール プレドニソロン錠投 与 day1から 16T朝昼 4日 分 day5から 8T 朝昼 1日分 day6から 4T 朝 1日分				
手技										
10 薬剤					休業完了day28	休業完了day28				
手技										
11 薬剤					体表面積注意！	体表面積注意！				
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sf047-01 入院 ・ 外来 46
ルート プロトコール 名	ケモセーフ リブタヨ(3週毎)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 リブタヨ注(350mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインレート 全開で
手技	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	休薬完了day21
手技	
4 薬剤	
手技	
5 薬剤	
手技	
6 薬剤	
手技	
7 薬剤	
手技	
8 薬剤	
手技	
9 薬剤	
手技	
10 薬剤	
手技	
11 薬剤	
手技	
12 薬剤	
手技	
13 薬剤	
手技	
14 薬剤	
手技	
15 薬剤	
手技	