

コード ナンパリング	gm001-01	1
入院 ・ 外来		
ケモセーフ		
プロトコール名	リツキサン (25mg/h)	
投与順序	1 薬剤	生食 50mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V
手技		持続点滴末梢(15分)
投与順序	2 薬剤	生食 50mL 1瓶 ポ ラミン 5mg 1V
手技		持続点滴末梢(15分)
投与順序	3 薬剤	生食 500mL 1袋 リツキサン (375mg/m ²) 開始1時間→25mL/hr 2回目以降、忍容性...
手技		持続点滴末梢
投与順序	4 薬剤	休薬完了day1
手技		
投与順序	5 薬剤	内服、解熱剤予防的に内服することあり。
手技		
投与順序	6 薬剤	《リツキサンの投与速度》 【初回】 開始1時間→25mL/hr その後1時間→100mL/hr その後→200mL/hr
手技		
投与順序	7 薬剤	【2回目以降、忍容性あり】 ①か②のどちらかで投与可能 ①開始1時間→100mL/hr その後→200mL/hr
手技		
投与順序	8 薬剤	②主治医の指示があれば、以下の速度可 開始1時間→200mL/hr その後→400mL/hr 参照：重篤な心疾患なし、採血リンパ球数5000/μL未満
手技		
投与順序	9 薬剤	
手技		
投与順序	10 薬剤	
手技		
投与順序	11 薬剤	
手技		
投与順序	12 薬剤	
手技		
投与順序	13 薬剤	
手技		
投与順序	14 薬剤	
手技		
投与順序	15 薬剤	血液15、膠原6と共通
手技		
施行日数		1