

コード ナンバリング	sk001-01	sk002-01	sk003-07	sk004-01	sk005-01	sk006-01	sk007-01	sk008-08.ge024	sk009-05	sk011-01
	1 入院・外来	2 入院・外来	3 入院	4 入院・外来	5 入院	6 入院	7 入院・外来	8 入院	9 入院	11 入院・外来
プロトコール 名	ケモセーフ ジェムザール	ケモセーフ TS-1・CPT-11	ケモセーフ TS-1・CDDP day8 (60mg/ ml)	ケモセーフ TS-1・CDDP weekly (20mg/ ml)	ケモセーフ(下ルート) FP(700-70)	ケモセーフ(下ルート) FP (low dose)	ケモセーフ CDDP腹腔・5-FU	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFOX4・ アバスタン	ケモセーフ タキソール weekly
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	★TS-1 day1から3週間投与	★TS-1 day1の7日前より3 週間投与	★TS-1 day1から3週間投与	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 フルオロウラシル (500mg/body) Rp.2と同時 上ルートより メインはフラジッシュ用生食50mL	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハシマスマ (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 Rp.1と同時にレスチンコ75錠 内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスチンコ75錠 内服
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,15	day1	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/ml)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	ラクテック500mL 1袋	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/ml) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (200mg/ml) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 20mL 2A ランダ (MAX 20mg/body) Rp.1と同時	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/ml) Rp.3と同時 下ルートより	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/ ml)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	腹腔投与(volus)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	day1～day15の計3回	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/ml)	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1投与60分後	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	休業完了 day7	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/ml) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (100mg/ml) Rp.4と同時 下ルートより	休業完了 day7
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
4 薬剤	day22は休業	day8,22,29は休業	ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/ml)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	ランダはシリンジ3本に分ける 生食とランダ1:1で調製 生食とランダそれぞれ吸い、3 方活栓使用して1本にまとめる	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/ml) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/ml) Rp.3と同時 上ルートより	3投1休が標準 (day1.8.15 4weekごと)
手技	day22は休業	day8,22,29は休業	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)		静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	
5 薬剤	休業完了 day7	休業完了 day35	アロキン注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V Rp.3投与開始70分後より	ラクテック500mL 1袋	アロキン注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 500mL 1袋 ランダ (4mg/ml) Rp.3終了後 上ルートより	①30mL (生食・ランダ 15mLずつ) (50mLシリンジ)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/ml)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/ml) 全開で	
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に(15分)	
6 薬剤			生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/ml) 全量 量を500mLに 上ルートより	全 休業完了 day7	生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/ml) 全量 量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1瓶 ランダ ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で	②30mL (生食・ランダ 15mLずつ) (50mLシリンジ)	休業完了 day14	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/ml)	
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(6分)			持続点滴末梢(2hr)	
7 薬剤			生食 20mL 1A ラシックス注20mg 1A 下ルートより	3投2休が標準 (day1.8.15 5weekごと)	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で	ラクテック500mL 1袋 メインルート	③20mL (生食・ランダ 10mLずつ) (30mLシリンジ)			day2
手技			静脈注射		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)				
8 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (100mg/ml)	
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(120分)	
10 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート			生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/ml) 全開で	
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)			静脈注射緩徐に(15分)	
11 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート				ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/ml)	
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	day2～5			持続点滴末梢(2hr)	
12 薬剤						生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (200mg/ml) 下ルートより			休業完了 day14	
手技			day8, 15, 22は休業		day2～5	持続点滴末梢(24hr)				
13 薬剤			休業完了 day7		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/ml) 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (4mg/ml) 上ルートより				
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)				
14 薬剤					休業完了 day21	休業完了 day7				
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sk012-01	sk013-04	sk016-01	sk017-01	sk019-01	sk020-01	sk021-01	sk022-01	sk024-08	sk025-08	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院	
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	
プロトコール名	タキソテール weekly	MTX・5-FU	CDDP・5-FU肝動注	FP(400-40)	アービタックス・イリノテカン(初回)	アービタックス・イリノテカン weekly	アービタックス・イリノテカン Biweekly(初回)	アービタックス・イリノテカン Biweekly	FOLFIRI・アービタックス(初回)	FOLFIRI・アービタックス	
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤	8 薬剤	9 薬剤	10 薬剤	
投与内容	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 100mL 1瓶 ランダ (10mg~20mg/body) 全量100mLに 上ルートより メインはフラスコ用生食50mL	ラクテック500mL 1袋 メインルート	アービタックスは2回目以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	グラネトロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(15分)	持続点滴末梢(90分)	day1.8.15.22	day1.8.15.22	day1.15.29	day1.15.29	day1	day1	
投与内容	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (25mg/㎡) 始め10分は速度半分 観察時ポンピング必要	生食100mL 1瓶 ダイアモックス 0.5V メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル (500~1000mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	グラネトロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	動注(3hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
投与内容	休薬完了 day7	生食100mL 1瓶 メントレキセート(100mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより	休薬完了 day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/㎡) を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	
投与内容	5%ブドウ糖500mL 1B メイロン注20mL 2A Rp.3と同時 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1B メイロン注20mL 2A Rp.3と同時 メインルート	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	
手技	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
投与内容	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(800mg/㎡) 上ルートより	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(800mg/㎡) 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (40mg/㎡) 全量500mLに Rp.4終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
投与内容	内服 ロイコポリン錠5mg 12T分4 6時間毎 Rp.3投与24時間後より計6回	内服 ロイコポリン錠5mg 12T分4 6時間毎 Rp.3投与24時間後より計6回	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより
手技	day1の内服	day1の内服	持続点滴末梢(5分)	day29.36	day29.36	day8.22.36.43	day8.22.36.43	day8.22.36.43	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
投与内容	内服 ロイコポリン錠5mg 6T分2 6時間毎	内服 ロイコポリン錠5mg 6T分2 6時間毎	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	
手技	day2の内服	day2の内服	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	
投与内容	休薬完了 day7	休薬完了 day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	
投与内容	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day8	day8	
投与内容	休薬完了 day42	休薬完了 day42	休薬完了 day42	休薬完了 day42	休薬完了 day42	休薬完了 day49	休薬完了 day49	休薬完了 day49	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用	
手技	day2→5	day2→5	day2→5	day2→5	day2→5	day2→5	day2→5	day2→5	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
投与内容	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(400mg/㎡) 下ルートより	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
投与内容	計5コース	計5コース	計5コース	計5コース	計5コース	計5コース	計5コース	計5コース	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
投与内容	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day14	休薬完了 day14	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
投与内容											
手技											
投与内容											
手技											
投与内容											
手技											

コード ナンバリング	sk026-01	sk027-01	sk028-05	sk029-01	sk030-01	sk031-04	sk032-04	sk033-04	sk034-04	sk035-02
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)
	レミケード	5-FU肝動注(連日)	アバستن・mFOLFOX6 (インフューザー用)	SOX/XELOX・アバستن	SOX/XELOX	FOLFIRI(インフューザー用)	FOLFIRI・アバستن(インフューザー用)	FOLFIRI・アビタックス(初回) (インフューザー用)	FOLFIRI・アビタックス (インフューザー用)	mFOLFOX6・アビタックス(初回) (インフューザー用)
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 ソル・コーテア100mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハバンスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 ハバンスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハバンスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	アビタックスは2回目で以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL	アビタックスは2回目で以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL	アビタックスは2回目で以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL
手技	持続点滴末梢(30分)	day1-5,8-12	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1	day1	day1
2 薬剤	生食250mL 1袋 インプリキマブ(5mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル(500mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠服用
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目で以降 1hr	休薬完了day14	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	day1から2週間TS-1またはゼローダ内服	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより	生食500mL 1袋 アビタックス(400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アビタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アビタックス (400mg/㎡) 全量を500mLに
手技	持続点滴末梢		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤			5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.3と同時 上ルートより	day1から2週間TS-1またはゼローダ内服		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.3と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
手技			持続点滴末梢(120分)		day8, 15は、休薬週	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤			生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で		休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより
手技			静脈注射緩徐に	day8, 15は、休薬週		持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤			生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	休薬完了day21		生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより
手技			持続点滴末梢(46hr)			day8は、休薬週	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤						休薬完了day14	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で
手技			day8は、休薬週				day8は、休薬週	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に
8 薬剤			休薬完了day14				生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節
手技							持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)
9 薬剤										
手技							day8	day8	day8	day8
10 薬剤							生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ75錠
手技							持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
11 薬剤							生食250mL 1袋 アビタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アビタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アビタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アビタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに
手技							持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
12 薬剤							生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
手技							持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
13 薬剤							休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sk036-02	sk037-02	sk038-02	sk039-01	sk040-02	sk041-02	sk042-02	sk043-02	sk044-01,sk045-01	sk046-01
	入院・外来 32	入院 33	入院 34	入院・外来 35	入院 36	入院・外来 37	入院 38	入院・外来 39	入院・外来 40	入院・外来 42
プロトコール名	ケモセーフ(LVIは、シール) mFOLFOX6+アビタックス(インフューザー用)	ケモセーフ(LVIは、シール) mFOLFOX6+アビタックス(初回)	ケモセーフ(LVIは、シール) mFOLFOX6+アビタックス	ケモセーフ ベクティビックス	ケモセーフ(LVIは、シール) FOLFIRI+ベクティビックス	ケモセーフ(LVIは、シール) FOLFIRI+ベクティビックス(インフューザー用)	ケモセーフ(LVIは、シール) mFOLFOX6+ベクティビックス	ケモセーフ(LVIは、シール) mFOLFOX6+ベクティビックス(インフューザー用)	ケモセーフ ハーセプチン+XP	ケモセーフ TS-1+タキソテール
投与順序	1 薬剤	アビタックスは2回目を以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL		生食100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg)	グラネトロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	グラネトロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	トラスクス+マブは2回目を以降 6mg/kg(30分)	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	day1	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノール75錠服用	グラネトロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノール75錠服用	グラネトロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノール75錠服用	生食 250mL 1袋	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V フアモチン注20mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/㎡) 調製時ボンピング必要
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	生食250mL 1袋 アビタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アビタックス (400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アビタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	休業完了day14	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.3と同時に 下ルートより	day8、15は、休業過
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	
4 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスクス+マブ 初回は、 2回目を以降は、 Rp.2と同時に、 下ルートより	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより		生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 Rp.5と同時に 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1袋 ランダ (80mg/㎡) Rp.4と同時に 全量を500mLに 上ルートより	持続点滴末梢(120分)
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で		ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)	生食 100mL フルオロウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)	生食 100mL フルオロウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	ソルデム3A500mL 1袋	持続点滴末梢(90分)
手技	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に		持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(90分)	
8 薬剤	生食 100mL フルオロウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)		休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	生食 500mL 1袋	持続点滴末梢(90分)
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)						持続点滴末梢(90分)	
9 薬剤									マンニトール300mL 1瓶	
手技	day8	day8	day8						持続点滴末梢(60分)	
10 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノール75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノール75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノール75錠服用						生食 50mL 1瓶 ランシックス20mg 1A	持続点滴末梢(5分)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)						day2~4	
11 薬剤	生食250mL 1袋 アビタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アビタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アビタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに							day2~4
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)							
12 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋						生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	持続点滴末梢(30分)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)						持続点滴末梢(30分)	
13 薬剤	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14						ソルデム1 500mL 1袋	持続点滴末梢(90分)
手技									持続点滴末梢(90分)	
14 薬剤									生食 500mL 1袋	
手技									持続点滴末梢(120分)	
15 薬剤									休業完了day21	
手技										

コード ナンバリング	sk047-01	sk049-01	sk050-01	sk051-01	sk052-01	sk053-01	sk055-01	sk056-01	sk057-01
	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタなし)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)
プロトコール 名	DCF	CDDP・CPT-11(Biweekly)	タキソテール	シスプラチン・ラステット	GEM+CDDP	TS-1・CPT-11(術前CRT)	タキソール+サイラムザ	サイラムザ(単剤)	FP(700・70)・RT
投与順序	1 薬剤		グラニセト注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルタなし 投与中に水分1L摂取		★TS-1 day1~day5 day8~day12 day22~day28 day28~day33	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) Rp.1と同時にレスシコウ5錠 内服 認容性 良 60分→30分へ短 持続点滴末梢(60分)	
手技	day1	day2・3	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1, 8	day1, 8, 22, 29	day1, 15	day1
2 薬剤	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/mf) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/mf)	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.2と同時に	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50m mL 1瓶 全開で	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デ キサート注6.6mg 1.5V メインルート 投与中に水分1L摂取
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) Rp.1と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短 縮可	ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq メインルート
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	day8, 15は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8は、休業週
4 薬剤	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (30mg/mf) 全量を500mL	休業完了 day21	マンニトールS300mL 200mL	生食 250mL 1袋 ランダ注 (25mg/mf) Rp2終了後 下ルートより	生食 50m mL 1瓶 全開で	休業完了 day14	マンニトール 200mL メインルート
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day15は休業	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 ランシックス注20mg 1A		生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mL 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/mf) Rp3終了後 下ルートより	休業完了 day35	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/mf)	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)
6 薬剤	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) Rp.4終了後 上ルートより 調製時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋	生食 50m mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A Rp4終了後 下ルートより			生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/mf) 全量を500mLに Rp.4と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(10分)		day8	持続点滴末梢(60分)
7 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		休業完了 day14					カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファミチン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスシコウ5錠内 服	ラクテック500mL 1袋 メインルート
手技	持続点滴末梢(120分)	day4・5		day2, 3	day15は休業			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
8 薬剤	ラクテック500mL 1袋 ランダ終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルタなし	休業完了 day21			生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/mf)	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(60分)	day2~4
9 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/mf)			休業完了 day28		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(90分)					持続点滴末梢(30分)
10 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより								生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/mf) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	day15		day8, 15は、休業週					持続点滴末梢(24hr)
11 薬剤		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		休業完了 day21					休業完了 day28
手技		持続点滴末梢(30分)							
12 薬剤		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要		イメンド内服					
手技		持続点滴末梢(60分)							
13 薬剤		休業完了 day28							
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sk058-01	sk059-01	sk060-01	sk061-01	sk062-01,sk063-01	sk064-01	sk065-01
	52	53	54	55	56	57	58
	入院	入院	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	術前FP(800-80)	FP(800-80)	CDDP+5-FU肝動注	NDP+5-FU+RT	ハーセプチン・XP(ジョートハイドレ ジョン)	パブラプラチン・ Monthlyタキソール	5-FU+MMC+RT
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	<b>投与速度注意！ 入院と外来で速度が違う</b>	1 薬剤	<b>トラスズマブは2回目を以降 6mg/kg(30分)</b>	1 薬剤	
投与内容	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食 100mL 1瓶 ファミモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスミンコート5袋服用	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1
2 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ランダ(10mg~20mg/body) 全量100mLに メインはフラッシュ用生食50mL 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V ファミモチジン注20mg 1V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取	カイトリル注バッグ3mg 1袋	ラクテック500mL 1袋 メインルート
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	動脈注射(外来:30分、入院:60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル(250~500mg/body)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋 トラスズマブ 初回は、8mg/kg 2回目を以降は、6mg/kg 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/㎡)	グラセロ注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	動注(外来:3hr、入院:5hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	<b>休薬完了 day7</b>	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶 マイトマイシン(10mg/㎡) 上ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)
5 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート		アロキシ注バッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	マンニトール 200mL		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬済	持続点滴末梢(24hr)
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより		生食 500mL 1袋 アクブラ(90mg/㎡) Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより	<b>休薬完了 day21</b>	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)		day2~4
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 余間で	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 余間で		生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A メインルート 余間で	生食 250mL 1袋	<b>カルボプラチンはAUC5に減量 されていても問い合わせ不要</b>	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート	<b>休薬完了 day21</b>		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(24hr)
9 薬剤	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート			<b>休薬完了 day28</b>
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)			
10 薬剤	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート					<b>通常2クールで終了</b>
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		day2~5			
11 薬剤	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート			
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)			
12 薬剤				生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより			
手技	day2~5	day2~5		持続点滴末梢(24hr)			
13 薬剤	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート		<b>休薬完了 day28</b>			
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
14 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより					
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)					
15 薬剤	<b>休薬完了 day21</b>	<b>休薬完了 day28</b>					
手技							

コード ナンバリング	sk066-01	sk067-01	sk068-01	sk069-01	sk070-01	sk071-01	sk072-01	sk073-01	sk074-01	
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院	入院・外来	
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタなし)	ポンプ・シリンジ	ポンプ・シリンジ	ケモセーフ(LVは、シール)	
プロトコール 名	術前DCF療法	GCS	ザノサー単剤Daily	ザノサー単剤Weekly	ザノサー+5-FU	パラプラチン・ ラステット	LFP変法(限定3)	LFP動注療法	FL+nal-IRI療法	
投与順序	1 薬剤		デカドロン8mg/日内服 (Day2~4)		生食 500mL 1袋		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルタなし	<b>インフューザーポンプ SFS-1005D(P) 種類注意!</b>	<b>インフューザーポンプ SFS-1005D(P) 種類注意!</b>	<b>オニバイドは入院時バッグを 遮光する 外来では遮光不要</b>
手技	day1	day2・3	day1	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1~5	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	
2 薬剤	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 500mL 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/㎡)	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(1250mg/body) 全量60mL 生食で調節	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V フィルタなし
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	動注(120時間)	動注(5日間)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/㎡) Rp.1と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/㎡) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 ザノサー(1000mg/㎡)	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	5%ブドウ糖500mL 1袋 オニバイド(70mg/㎡) 入院時遮光
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/㎡)	生食 250mL 1袋	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡)				5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリサート(200mg/㎡) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day2,3	day3	day2~3	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 キキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	マンニトールS 200mL	生食 250mL 1袋	休薬完了 day7	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/㎡)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルタなし	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(46hr)
6 薬剤	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/㎡) Rp.4終了後 上ルートより 順調時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(25mg/㎡)	休薬完了 day42		生食 250mL 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/㎡)	休薬完了 day7		
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)		day8,15,22	day8は、休薬週
7 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより		ソルデム3A500mL 1袋		休薬完了 day42				生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	休薬完了 day14
手技	持続点滴末梢(120分)	day4・5	持続点滴末梢(60分)				day8,15は、休薬週		動注(5日間)	
8 薬剤	ラクテック500mL 1袋 ランダ終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/㎡) 下ルートより	休薬完了 day14				休薬完了 day21		シスプラチン(5mg/body)	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)							動注(30分)	
9 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	day1から1週間 TS-1(80mg/㎡)内服							day10,17,24
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)								
10 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	休薬完了 day21							シスプラチン(5mg/body)	
手技	持続点滴末梢(60分)								動注(30分)	
11 薬剤									休薬完了 day28	
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sk075-01	sk076-01	sk077-01、sk078-01 70、71	sk079-01	sk080-01	sk081-01	sk082-01	sk083-01	sk084-02	
	68	69							11	
	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	
プロトコール 名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	
	テセントリク・アバステン	エンハーツ	ハーセプチン 3weeks	シスプラチン・ カンボト	テセントリク・パラプラチン・ラス テット療法	イミフィンジ・パラプラチン・ラス テット療法	キイトルーダ+FP療法	カルセド	タキソール weekly(100mg/m <sup>2</sup> )	
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤		1 薬剤	1 薬剤	
投与内容	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b>	アロキシ注バッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 <b>下ルートより</b>	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) <b>下ルートより</b>		カイトリル注ハック 1袋 デキササート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注ハック3mg 1袋 フマチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2V Rp.1と同時に <b>レスタミンコー75錠服 用</b>	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	day2~4	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 エンハーツ注 ( <b>6.4mg/kg</b> ) メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン ( <b>80mg/m<sup>2</sup></b> )	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食100mL 1袋 キイトルーダ ( <b>200mg/body</b> ) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 500mL 1袋 パクリタセル注 ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> )
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶 エンハーツ注 ( <b>6.4mg/kg</b> ) 注射用水100mL 1瓶 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 <b>減量必要</b>		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> )	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし	アロキシ注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート <b>経口補水液(OS1)1L/Day摂取</b>	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル ( <b>800mg/m<sup>2</sup></b> ) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 カルセド ( <b>40mg/m<sup>2</sup></b> ) 全開で Rp.1終了後	休業完了 day7
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	day8.15は、休業適	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴側管(約10分)	
4 薬剤	休業完了 day21	5%ブドウ糖100mL 1瓶	休業完了 day21	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) <b>MAX750mg</b> 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> )	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	休業完了 day21	day1~3	週1回投与を6回施行し、2週 間休業を1コースとし、反復
手技		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)			
5 薬剤		休業完了 day21		生食 500mL 1袋 ランダ ( <b>80mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量を500mL		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) <b>MAX800mg</b> 下ルートより	マンニトール メインルート		休業完了 day21	
手技				持続点滴末梢(120分)	day2.3	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)			
6 薬剤		エンハーツ調製後は点滴 バッグを遮光する		ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし		生食 500mL 1袋 ランダ ( <b>80mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量を500mLに 上ルートより			
手技				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day2.3	持続点滴末梢(60分)			
7 薬剤		調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝 えること			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> )	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより			
手技			day8.15		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)			
8 薬剤		全量125mL以上のときは15% ブドウ糖液抜く2速度再計算 必要		カイトリル注ハック3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> )	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル ( <b>800mg/m<sup>2</sup></b> ) 下ルートより			
手技				持続点滴末梢(30分)	day8.15は、休業適	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)			
9 薬剤				生食 500mL 1袋 イリノテカン ( <b>80mg/m<sup>2</sup></b> )	休業完了 day21					
手技				持続点滴末梢(90分)		day8.15は、休業適				
10 薬剤						休業完了 day21				
手技				day22は、休業適						
11 薬剤				休業完了 day28						
手技										
12 薬剤				イメンド内服						
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										



コード ナンバリング	sk085-01	sk086-01	sk087-01	sk088-01	sk089-01	sk090-01	sk091-01			
	78	79	80	81	82	83	84			
	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院	入院			
プロトコール 名	ケモセーフ オブジーボ+ヤーボイ (肺小細胞・食道)	ケモセーフ イミフィンジ肺維持小細胞・肝	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)			
			イミフィンジ+GC	イミフィンジ+イジユド (肝細胞がん)	FOLFOX6(CRT) (シユアーフューザー用)	キイトルーダ+FP療法(食道がん)	オブジーボ(2週毎)+FP療法			
投与順序	1 薬剤	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)		生食 100mL 1瓶 イジユド注(300mg/body)	カイトルル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V					
手技	day1	持続点滴末梢(60分)	day1	day8	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day1			
		day2~5			day1	day2~5	day1			
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(380mg/body)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 1000mL 1袋 メインルート Rp.2と同時に	生食 100mL 1瓶	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより	生食100mL 1袋 キイトルーダ (200mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1袋 オブジーボ (240mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶	休薬完了day28	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.3と同時に	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 250mL 1袋 イミフィンジ注(1500mg/body)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリフラチン注(85mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/㎡) 下ルートより	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/㎡) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)
4 薬剤	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製		アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.2と同時に	生食 250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) Rp2終了後 下ルートより	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	休薬完了day21	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	静脈注射観察に	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(5分)	day15
5 薬剤	生食 50mL 1瓶		生食 250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) Rp3終了後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムスタビン(1000mg/㎡) Rp3終了後 下ルートより	休薬完了day28	生食 100mL 1袋 フルオロウラシル(1800mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	
手技	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤			生食 100mL 1瓶 ゲムスタビン(1000mg/㎡) Rp4終了後 下ルートより	生食 50mL 1瓶 ランソックス注20mg 1A Rp4終了後 下ルートより	休薬完了day14		マンニトール 200mL メインルート		マンニトール 200mL メインルート	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	day22		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(110分)			持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(380mg/body)		生食 50mL 1瓶 ランソックス注20mg 1A Rp5終了後 下ルートより				生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより	休薬完了day28	
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(10分)	day15は休薬			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
8 薬剤	生食 50mL 1瓶		休薬完了day21				生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより	生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		
手技	持続点滴末梢(5分)		day15は休薬				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
9 薬剤	休薬完了day42						生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		
手技							持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)		
10 薬剤										
手技										
11 薬剤										
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sk092-01	ge022-05	ge023-05	ge024-08	ge025-08	ge027-02	ge028-01	ge035-01	ge036-01	
	入院 85	入院 3	入院 4	入院 5	入院 6	入院・外来 8	入院・外来 9	入院・外来 11	入院・外来 12	
	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール 名	オブジーボ(4週毎)FP療法		FOLFOX6	FOLFOX6・ アバスタン	FOLFIRI	FOLFIRI・ アバスタン	イリノテカン(80mg/m <sup>2</sup> )	ジェムザール	アービタックス(初回)	アービタックス
投与順序	1 薬剤		グラニセロン注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハシマブ(5mg/kg) 認容 性 良→60分→30分へ短縮 可	グラニセロン注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハシマブ(5mg/kg) 認 容性 良→60分→30分へ短 縮可	カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にニレスミコウ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にニレスミコウ5錠服用
手技	day1	day2~5	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1袋 オブジーボ(480mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/ml) Rp.3と同時に 下ルートより	グラニセロン注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/ml) Rp.3と同時に 下ルートより	グラニセロン注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/ml) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/ml) 全量を250mLに
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	アロキシ注3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/ml) 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリアチン注(85mg/ml) Rp.2と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/ml) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/ml) Rp.2と 同時に 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/ml) Rp.4と同時に 下ルートより	day1~day15の計3回	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8は休業	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
4 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	休業完了 day28	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/ml) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリアチン注(85mg/ml) Rp.3と同時に 上ルートより	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/ml) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/ml) Rp.3と 同時に 上ルートより	休業完了 day14	休業完了 day7	休業完了 day7	
手技	持続点滴末梢(5分)		静脈注射線路に	持続点滴末梢(120分)	静脈注射線路に	持続点滴末梢(120分)	day22は休業			
5 薬剤	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより		ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/ml)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/ml) 全開で	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/ml)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/ml) 全開で	休業完了 day7			
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(46hr)	静脈注射線路に	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射線路に				
6 薬剤	マンニトール 200mL メインルート		ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/ml)		ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/ml)					
手技	持続点滴末梢(30分)		day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)	day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)				
7 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/ml) 全量を500mLに 上ルートより		休業完了 day14		休業完了 day14					
手技	持続点滴末梢(60分)		day8は、休業週	day8は、休業週	day8は、休業週					
8 薬剤	生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより			休業完了 day14		休業完了 day14				
手技	持続点滴末梢(60分)									
9 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/ml) 下ルートより									
手技	持続点滴末梢(24hr)									
10 薬剤										
手技										
11 薬剤										
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	ge039-01	ge040-04	ge48-01	ge053-01	ge054-01	ge065-01	ge066-01	ge067-01	ge068-01	ge099-01
	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	CPT-11(単剤)	mFOLFOX6(インフューザー用)	アバスチン(7.5mg/kg)・ゼローダ	ネダプラチン	5-FU(500mg/m <sup>2</sup> )・LV(RPM)	イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )	SOX/XELOX・アバスチン	SOX/XELOX	アバスチン(5mg/kg)・TS-1/ロサーフ	DOC+GEM (限定)
投与順序	1 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 キシサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注キット3mg 1袋 キシサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 キシサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 キシサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 キシサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ハシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	
手技	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 キシサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> ) Rp.2と同時 下ルートより	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (100mg/m <sup>2</sup> )	ソルデム3A 500mL 1袋 レボホリナートNa注 (250mg/m <sup>2</sup> ) 下ルート 開始60分後よりRp.3投与	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m <sup>2</sup> )	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 キシサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m <sup>2</sup> )	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 キシサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/m <sup>2</sup> )	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m <sup>2</sup> ) Rp.2と同時 上ルートより	休業完了 day21	ラクテック500mL 1袋	生食 50mL 1袋 フルオロウラシル(500mg/m <sup>2</sup> ) 上ルート Rp.2開始60分後より 全開で	3回投与後、3週間休薬、 day49で1クール (2回投与後、3週間休薬、 day35で1クールの場合もあり)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m <sup>2</sup> )	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服	休業完了 day14	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m <sup>2</sup> )
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(90分)	静脈注射遅徐に	day8は休業	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)
4 薬剤		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m <sup>2</sup> ) 全開で	day1から2週間ゼローダ内服	ラクテック500mL 1袋	day1~36まで計6コース	休業完了 day14	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		TS-1 day1~42まで計1コース day1から4週間投与	
手技	day22は休業	副注(5分)		持続点滴末梢(90分)	day43,50は休業			day8,15は、休業週		day8
5 薬剤	休業完了 day28	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> ) 全量100mL 生食で調節		休業完了 day28	休業完了 day7			休業完了 day21	ロサーフ(35mg/m <sup>2</sup> ) day1~28まで計1コース day1-5 day8-12	カイトリル注バッグ3mg 1袋 キシサート注6.6mg 1V
手技		持続点滴末梢(46hr)					day8,15は、休業週			持続点滴末梢(30分)
6 薬剤							休業完了 day21			5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/m <sup>2</sup> ) 調製時ボンピング必要
手技		day8は、休業週								持続点滴末梢(60分)
7 薬剤		休業完了 day14								生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m <sup>2</sup> )
手技										持続点滴末梢(30分)
8 薬剤										休業完了 day21
手技										
9 薬剤										
手技										
10 薬剤										
手技										
11 薬剤										
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	ge104-01	ge105-01	ge106-01	ge107-01	ge108-01	ge109-01, ge110-01	ge111-01	ge112-01	ge113-01	ge114-01
	入院・外来 26	入院・外来 27	入院・外来 28	入院・外来 29	入院・外来 30	入院・外来 31	入院・外来 32	入院・外来 33	入院・外来 34	入院・外来 35
プロトコール 名	ケモセーフ CPT-11+ペクティビックス	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) ジェムザール+アブラキサン	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRINOX	ケモセーフ IRIS+ペクティビックス	ケモセーフ SOX (100mg/m <sup>2</sup> )	ケモセーフ XELOX+ハーセプチン(初回) XELOX+ハーセプチン	ケモセーフ アバスタチン+IRIS	ケモセーフ SOX+アービタックス(初回)	ケモセーフ SOX+アービタックス	ケモセーフ ヨシダリス
投与順序	1 薬剤 カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>8mg/kg</b>	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ ( <b>7.5mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可			アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1	day1	中心静脈(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ペクティビックス ( <b>6mg/kg</b> ) 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 ( <b>85mg/m<sup>2</sup></b> ) 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> )	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Ro.1と同時にスチンコ-75錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Ro.1と同時にスチンコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 メインルート	生食100mL ( <b>25mL/m<sup>2</sup></b> ) アブラキサン注 ( <b>125mg/m<sup>2</sup></b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート ( <b>200mg/m<sup>2</sup></b> ) レボホリナート開始30分後からイリノテカン投与 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ペクティビックス ( <b>6mg/kg</b> ) 上ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 ( <b>130mg/m<sup>2</sup></b> )	生食 500mL 1袋 イリノテカン ( <b>150mg/m<sup>2</sup></b> )	生食500mL 1袋 アービタックス ( <b>400mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス ( <b>250mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量を250mLに	生食 500mL 1袋 ヨシダリス ( <b>1.2mg/m<sup>2</sup></b> )
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	中心静脈(24時間)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン ( <b>150mg/m<sup>2</sup></b> ) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン ( <b>1000mg/m<sup>2</sup></b> ) 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン ( <b>180mg/m<sup>2</sup></b> ) レボホリナート開始30分後から投与 上ルートより	生食 250mL 1袋 メインルート		day1から2週間ゼロ-ダ内服	day1から2週間TS-1内服	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	休薬完了 day21
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8,15は、休薬週				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤	休薬完了 day14		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル ( <b>400mg/m<sup>2</sup></b> ) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン ( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> ) 上ルートより	休薬完了 day21		休薬完了 day21	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 ( <b>130mg/m<sup>2</sup></b> )	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 ( <b>130mg/m<sup>2</sup></b> )	
手技		day22は、休薬週	静脈注射終了に 持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤		休薬完了 day28	生食 100mL (入院ではサルテム3A500mLもあり) フルオロウラシル ( <b>2400mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量1.00mL、生食で調製	day1から2週間TS-1内服		休薬完了 day21				
手技			持続点滴末梢(46hr)	day8,22は、休薬週				day8,15	day8,15	
7 薬剤				休薬完了 day28	※ 1段階減量 75mg/m <sup>2</sup>			生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Ro.1と同時にスチンコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Ro.1と同時にスチンコ-75錠服用	
手技			day8は、休薬週					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤			休薬完了 day14					生食250mL 1袋 アービタックス ( <b>250mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス ( <b>250mg/m<sup>2</sup></b> ) 全量を250mLに	
手技								持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
9 薬剤								生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	
手技								持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
10 薬剤								day1から2週間ゼロ-ダ内服	day1から2週間TS-1内服	
手技										
11 薬剤								休薬完了 day21	休薬完了 day21	
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	ge115-01	ge117-01	ge118-01	ge120-01	ge121-01	ge122-01	ge123-01	ge124-01	ge125-01	ge127-01
	外来 36	入院・外来 37	入院・外来 38	入院・外来 39	入院・外来 40	入院・外来 41	入院・外来 42	入院・外来 43	入院・外来 44	入院・外来 45
プロトコール 名	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ
投与順序	FOLFIRI+サイラムザ	患者限定5-FU動注(Weekly)	5-FU肝動注(Weekly)	オブジーボ(2週毎)	FOLFIRI+ザルトラップ (インフューザー用)	XELIRI+アバスタチン療法	アブラキサン+サイラムザ	FOLFOXIRI	FOLFOXIRI+Bev	アバスタチン+イリノテカン
1 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシニコ-75錠服用	5%ブドウ糖250mL 1B 5-FU (500mg/m <sup>2</sup> ) Rp.2と同時 上ルートより 右のリザーバーから投薬	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/m <sup>2</sup> ) シュアフェューザー-A:SFS-0504HR(P)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.6mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(10mg/kg) アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 認容性 良→60分→30分へ短縮可
手技	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(5時間)	動脈注射(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	5%ブドウ糖250mL 1B 5-FU (500mg/m <sup>2</sup> ) Rp.1と同時 上ルートより 右のリザーバーから投薬	休薬完了day7	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 サイラムザ (8mg/kg) フィルターなし Rp.1と同時にレスタシニコ-75錠服用	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (165mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(60分)	動脈注射(5時間)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1B ルートキープ用 左のリザーバー	ベッド予約無い場合は放射線Ri 室で穿刺予定	休薬完了day14	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (200mg/m <sup>2</sup> )	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 下ルートより 認容性 良 60分→30分へ短縮可	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m <sup>2</sup> ) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (165mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (160mg/m <sup>2</sup> )
手技	持続点滴末梢	動脈注射		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/m <sup>2</sup> ) Rp.5と同時 下ルートより	生食 50mL 1B ルートキープ用 右のリザーバー	インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m <sup>2</sup> ) Rp.3と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時 上ルートより	day1から2週間ゼローダ内服 (800mg/m <sup>2</sup> )	生食 50mL 1瓶 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/m <sup>2</sup> ) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m <sup>2</sup> ) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	休薬完了day14
手技	持続点滴末梢(120分)	動脈注射		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時 上ルートより	休薬完了day7		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m <sup>2</sup> ) 全開で	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> ) 全量100mL 生食で調剤	休薬完了day21	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	生食 250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/m <sup>2</sup> ) (入院ではリテム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/m <sup>2</sup> ) 全量230mL 生食で調剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/m <sup>2</sup> ) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	生食 250mL (入院ではリテム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/m <sup>2</sup> ) 全量230mL 生食で調剤
手技	持続点滴末梢(120分)			静脈注射後後に	持続点滴末梢(46hr)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(4.9hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(48hr)
6 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m <sup>2</sup> ) 全開で				生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> ) 全量100mL 生食で調剤			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	休薬完了day14	生食 250mL (入院ではリテム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/m <sup>2</sup> ) 全量230mL 生食で調剤
手技	静脈注射後後に				持続点滴末梢(46hr)	day8は、休薬週	day8	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週
7 薬剤	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> ) 全量100mL 生食で調剤						カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	休薬完了day14		day8は、休薬週
手技	持続点滴末梢(46hr)					day8は、休薬週	持続点滴末梢(30分)			day8は、休薬週
8 薬剤					休薬完了day14		生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 day22は、休薬週	使用するインフューザーポンプは「LV5」	休薬完了day14	
手技							day22は、休薬週			
9 薬剤	休薬完了day14							休薬完了day28		使用するインフューザーポンプは「LV5」
手技										
10 薬剤										
手技										
11 薬剤										
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	ge128-01,ge129-01	ge130-01,ge131-01	ge135-01	ge137-01	ge141-01	ge142-01	ge143-01	ge152-01	ge157-01	ge161-01
	入院・外来 46	入院・外来 47	入院・外来 48	入院・外来 49	入院・外来 50	入院・外来 51	入院・外来 52	入院・外来 53	入院・外来 54	入院・外来 55
	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ポンプ	ポンプ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	HertS-1+CDDP療法	SOX+ハーセプチン	オブジーボ(4週毎)	アバスタチン+5-FU肝動注(限定)	ザルトラップ+IRI+5-FU肝動注(限定)	mFOLFOXIRI	mFOLFOXIRI+Bev	オブジーボ+SOX (100mg/㎡)	オブジーボ+mFOLFOX6 (インフルエンザ用)	XELOX+Pmab療法
投与順序	1 薬剤 トラスツズマブは2回目以降 6mg/kg(30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 アバスタチン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 投与中に経口補水液1L摂取 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/㎡) シュアフェューザー-A:SFS- 0504HR(P)	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/㎡) Rp.1と同時 シュアフェューザー-A:SFS- 0504HR(P)	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	動脈注射(5時間)	動脈注射(5時間)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/㎡)	休薬完了 day28	休薬完了 day7	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg) Rp.1終了後	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(100mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq メインルート	day1から2週間TS-1内服		5-FUのみレジメン(放射2)と交互に	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/㎡) Rp.3終了後	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	マンニトール 200mL メインルート			インフルエンザポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		生食 100mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL、生食で調節	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	day1から2週間ゼローダ内服
手技	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週			持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休薬週	静脈注射終了後	
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより	休薬完了 day21			生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/㎡) Rp.1と同時 シュアフェューザー-A:SFS- 0504HR(P)		生食 100mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL、生食で調節	休薬完了 day21	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL、生食で調節	day8,15は、休薬週
手技	持続点滴末梢(120分)				動脈注射(5時間)	day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)		持続点滴末梢(46hr)	day8,15は、休薬週
7 薬剤	生食 500mL 1袋 メインルート				休薬完了 day14	休薬完了 day14			休薬完了 day14	休薬完了 day21
手技	持続点滴末梢(60分)						day8は、休薬週			
8 薬剤	休薬完了 day21				インフルエンザポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		休薬完了 day14			
手技										
9 薬剤	day1から2週間TS-1内服									
手技										
10 薬剤										
手技										
11 薬剤										
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										