

コード	g002-01	g003-01	g004-01	g005-01	g007-01	g008-01	g009-01	g010-01
ナンバリング	2	3	4	5	7	8	9	10
入院・外来	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	weekly タキソテール(放射線併用)	Weekly CDDP(40mg/m ²)	Triweekly タキソテール	オブジーボ(2週毎)	アービタックス	FP+アービタックス療法(初回)	FP+アービタックス療法	Biweekly タキソテール
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
薬剤	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	テカドロン8mg/日内服 (Day2~4)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にシタキシマール錠服用	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にシタキシマール錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1は10時に投与開始予定 day1 day2~4	day1は10時に投与開始予定 day1 day2~4	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (10mg/m ²) 調製時ポンピング必要	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/m ²) 調製時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食500mL 1袋 アービタックス(500mg/m ²) 全量を500mLに	アロキシ注ハッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	アロキシ注ハッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了day7	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	休薬完了day14	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量500mL Rp.3と同時 下ルートより	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量250mL Rp.3と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	day8は、休薬週
4 薬剤	グラニセトロン注ハッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1V	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day14	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 メインルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day15
5 薬剤	生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルート	マンニトール300mL 1瓶 メインルート	マンニトール300mL 1瓶 メインルート	マンニトール300mL 1瓶 メインルート	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/m ²) 調製時ポンピング必要
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15 持続点滴末梢(120分)	day8,15 持続点滴末梢(120分)	day8,15 持続点滴末梢(90分)
7 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	生食 20mL 1A ラジックス注20mg 1A 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にシタキシマール錠服用	生食 20mL 1A ラジックス注20mg 1A 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にシタキシマール錠服用
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15 持続点滴末梢(30分)	day8,15 持続点滴末梢(30分)	day8,15 持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/m ²) Rp.8と同時 下ルートより	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/m ²) Rp.8と同時 下ルートより	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)
9 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより	生食 250mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)
10 薬剤	休薬完了day7	休薬完了day7	休薬完了day7	休薬完了day7	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	休薬完了day21	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	休薬完了day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
11 薬剤	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
12 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
13 薬剤	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
14 薬剤	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)

11	12	13	15	16	17	18
gi011-01	gi012-01	gi013-01	gi015-01	gi016-01	gi017-01	gi018-01
入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(ドルート)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(ドルート)
タキソール weekly(100mg/㎡)	Weekly CDDP(40mg/㎡)SH	術前DCF療法	アービタックス+パクリタキセル	キイトルーダ(3週毎)	キイトルーダ+カルボプラチン+5-FU	キイトルーダ+FP療法
カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時投与(25錠) 持続点滴末相(30分)	テカトロン8mg/日内服 (Day2~4)			生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	アプレビタント内服	
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(100mg/㎡) 持続点滴末相(120分)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取 持続点滴末相(30分)	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食 50m mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食100mL 1袋 キイトルーダ注(200mg/body) 上ルートより
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
生食 500mL 1袋 フルオロウラル(750mg/㎡) Rp.1と同時 下ルートより 持続点滴末相(120分)	生食 500mL 1袋 フルオロウラル(750mg/㎡) Rp.1と同時 下ルートより 持続点滴末相(30分)	生食 500mL 1袋 フルオロウラル(750mg/㎡) 下ルートより 持続点滴末相(24hr)	生食 500mL 1袋 アービタックス(500mg/㎡) 全量を500mLに 持続点滴末相(30分)	生食 500mL 1袋 アービタックス(500mg/㎡) 全開で 持続点滴末相(120分)	生食 500mL 1袋 アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末相(30分)	生食100mL 1袋 キイトルーダ注(200mg/body) 上ルートより 生食 500mL 1袋 フルオロウラル (800mg/㎡) 下ルートより 持続点滴末相(24hr)
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
週1回投与を6回施行し、2週間休薬を1コースとし、反復	マンニトールS 200mL 持続点滴末相(30分)	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより 持続点滴末相(120分)	ラクテック500mL 1袋 メインルートより 持続点滴末相(120分)	生食 50m mL 1瓶 メインルート 全開で 持続点滴末相(5分)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 4) MAX900mg 持続点滴末相(120分)	生食 50m mL 1瓶 メインルート 全開で 持続点滴末相(30分)
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/㎡) 全量を500mLに 持続点滴末相(60分)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより 持続点滴末相(30分)	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより 持続点滴末相(120分)	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡) 持続点滴末相(60分)	生食 500mL 1袋 フルオロウラル(800mg/㎡) 持続点滴末相(24hr)	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより 持続点滴末相(60分)	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより 持続点滴末相(60分)
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
ラクテック500mL 1袋 持続点滴末相(60分)	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(70mg/㎡) Rp.4終了後 上ルートより 副作用軽減に注意 持続点滴末相(60分)	ラクテック500mL 1袋 メインルートより 持続点滴末相(120分)				マンニトール 200mL メインルート 持続点滴末相(30分)
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
休業完了day7	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより 持続点滴末相(120分)		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時投与(25錠) 持続点滴末相(30分)		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末相(30分)	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより 持続点滴末相(60分)
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
アプレビタント内服	ラクテック500mL 1袋 シスプラチン終了後 メインルートより 持続点滴末相(120分)	生食 500mL 1袋 フルオロウラル(750mg/㎡) 下ルートより 持続点滴末相(24hr)	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡) 持続点滴末相(60分)		生食 500mL 1袋 フルオロウラル(800mg/㎡) 持続点滴末相(24hr)	生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより 持続点滴末相(60分)
day1	day1	day1	day2-3 day1	day1	day1	day2~4
	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより 持続点滴末相(120分)	ラクテック500mL 1袋 メインルートより 持続点滴末相(120分)	休業完了day14		休業完了day21	生食 500mL 1袋 フルオロウラル(800mg/㎡) 下ルートより 持続点滴末相(24hr)
	マンニトール 300mL 1瓶 メインルートより 持続点滴末相(60分)	休業完了day21				

