

コード ナンバリング	hk006-01 1	hk007-01 2	hk008-01 3	hk009-01 4	hk010-01 5	hk011-02 6	
	入院	入院	入外兼用	入院・外来	外来	入院	
ルート	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール 名	M-VAC	VIP bolus	GC	TG	タキソテール・ブレドニソロン	BEP療法	
投与順序	1 薬剤	別紙	別紙	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	化学療法中 ブレドニソロン錠1mg 10T分2		
手技				持続点滴末梢(2h)	day1	day2~3	
2 薬剤	メトトレキサート(30mg/m ²) シスプラチン(70mg/m ²) ドキシルビシン(30mg/m ²) エクザール(3mg/m ²)	イホマイド(1.2g/m ²) MAX 1.5g/m ² シスプラチン(120mg/m ²) MAX 120mg/m ² エトポシド(100mg/m ²) MAX 120mg/m ²	ゲムシタピン(1000mg/m ²) シスプラチン(70mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²) MAX 1000mg/m ² Rp.1開始60分後より 下ルートより	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(75mg/m ²) 上ルートより 調製時ボンピング必要	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート
手技				持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	全て下ルート	全て下ルート (エトポシド(ラステット)はフィル ターなし!)	day1、2は全て下ルート day8、15は上ルート	生食 50mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2.5V Rp.2終了後全開で Rp.3と同時にレスタシノーワ錠服 用 下ルートより	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	アロキシ注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート
手技				持続点滴側管(全開)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤			アプレピタント内服	ブドウ糖 5%500mL 1袋 パクリタキセル(175mg/m ²) MAX 210mg/m ² Rp.1終了後 下ルートより	休業完了 day21	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²) 下ルート(フィルターなし)より	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトポシド(100mg/m ²) 下ルート(フィルターなし)より
手技				持続点滴末梢(4h)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤						生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/m ²) 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/m ²) 上ルートより
手技				day8		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤				ソルデム1 500mL 1袋 メインルート		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート
手技				持続点滴末梢(2h)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
7 薬剤				生食 50mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²) MAX 1000mg/m ² Rp.1開始60分後より 下ルートより		生食 100mL 1瓶 プレオ(30mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1袋 メインルート
手技				持続点滴側管(30分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
8 薬剤				休業完了 day21		生食 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート
手技						持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
9 薬剤						ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	
手技						持続点滴末梢(120分)	day8、15
10 薬剤						エトポシドはフィルターな し!	生食 100mL 1瓶 プレオ(30mg/body) 上ルートより
手技							持続点滴末梢(60分)
11 薬剤						アプレピタント内服	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用
手技							持続点滴末梢
12 薬剤							休業完了 day21
手技							
13 薬剤							
手技							

hk012-01		hk013-01	hk014-01	hk016-01	hk017-01	hk018-01	hk019-01	hk020-01
入院・外来		外来	外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	シリンジ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
EP		タキソテール・デキサメサゾン	CDDP動注連日	トーリセル	アドリアシン単剤	ハラヴェン	オブジーボ(2週毎)	ジェブタナ
		化学療法中 デカドロン錠0.5mg 2T分2		化学療法前投与 レスタシユール錠 5錠 服用			生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	プレドニゾン錠 10mg/日併用
day1	day2~3	day1	day 1~5	day1	day1~3	day1,8	持続点滴末梢(30分)	day1
ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(75mg/mf) 上ルートより 調製時ポンピング必要	ラクテック 500mL 1袋	生食 250mL 1袋 トーリセル (25mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V ボラミン注5mg 1A
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(1.5h)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	ラクテック 500mL 1袋	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ドキシルピシ (30mg/body)	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	休業完了 day14	生食100mL 1瓶
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(1.5h)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(30分)
5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より	休業完了 day21	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2投与60分後から	休業完了 day7	休業完了 day21		day15は休業	生食 250mL 1袋 ジェブタナ(25mg/mf)
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)					持続点滴末梢(60分)
生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf)	生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf)		シスプラチン(20mg/mf)			休業完了 day21		day3
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		動注					
生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A		ラクテック 500mL 1袋					ジールスタ皮下注3.6mg 1筒 皮下投与
持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(90分)					
生食 500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルート		休業完了 day21					休業完了 day21
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)							
ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート							
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)							
	休業完了 day21							

hk021-01	hk022-01	hk023-01	hk024-01	hk025-01	hk026-01	hk027-01	hk028-01	hk029-01	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
パラブラチン・ゲムシタピン	パラブラチン・Monthlyタキソール	GC(ショートハイドレーション)	キイトルーダ(3週毎)	オブジーボ+ヤーボイ	シリンジ	エビルピシン勝注	バベンチオ療法	ジェムザール+RT	ジェムザール
アプレビタント内服	生食 100mL 1瓶 ファミモチン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	アプレビタント内服	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	エビルピシン注(30mg/body) 生食50mL 1瓶 生食は溶解用	生食 50mL 1瓶 ボララミン注 1A	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
day1	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	膀胱内注入	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	
カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋	アロキシン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に経口補水液(OS1)1L摂取	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 100mL 1瓶	休業完了 day7	アセリオ静注用 650mg	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(27mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)	
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)	休業完了 day21	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	生食でvolume upする	生食 250mL 1瓶 バベンチオ注(10mg/kg)	day1.4.8.11.15.18.22.25の計8回	day1~day15の計3回	
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)			
ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		生食 50mL 1瓶	生食4mL/Vで溶解して、全量36mLとし、50mLシリンジに調製する	休業完了 day14	休業完了 day28		
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(5分)				day22は休業	
		マンニトール 200mL		休業完了 day21	先に生食24mL抜き取り、エビルピシン12mL吸い切って全量36mLとする。	適応によってはインライタ処方あり インライタ1回5mg 1日2回		休業完了 day7	
day8	day8.15は、休業週	持続点滴末梢(30分)							
カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了 day21	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/ml) 全量を500mLに		4回投与後、オブジーボ単剤へ	16時までに実施連絡がなければ主治医に確認、またはケモ担当者に相談。				
持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)							
生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)	カルボプラチンはAUC5に減量されている間問い合わせ不要	ソルデム3A 500mL 1袋			当日実施できず、翌日へ延期の場合はケモ担当者に連絡。主治医が処方変更難しければ、ケモ担当者が翌日へ処方変更する。				
持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)			翌日へ変更となった場合は、午前中に払い出す必要があるため翌日の調製者に申し送る。				
day15は、休業週		day8、15							
休業完了 day21		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V			翌日の午前中に実施指示がなければ主治医に要確認。手術後、24時間以内に投与する必要があるため。				
		持続点滴末梢(30分)							
		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)							
		持続点滴末梢(30分)							
		day22は、休業週							
		休業完了 day28							

hk030-01	hk031-01	hk032-01	hk033-01	hk034-01	hk035-01	hk036-01	hk037-01	hk038-01
24	25	26	27	28	29	30	31	32
入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
オブジーボ(4週毎)	キイトルーダ(6週毎)	Weekly CDDP(40mg/㎡)	Weekly CDDP(40mg/㎡)SH	パドセブ療法	シスプラチン・ラステット	ddM-VAC	ddM-VAC(ショートハイドレーション)	パラプラチン・ラステット
生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	デカドロン8mg/日内服 (Day2~4)	デカドロン8mg/日内服 (Day2~4)		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	別紙		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/㎡)	メソレキセート(30mg/㎡) エクザール(3mg/㎡) ドキソルビシン(30mg/㎡) シスプラチン (70mg/㎡)	ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 2A メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/㎡)
持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(2hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
休薬完了day28	休薬完了day42	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 50mL 1瓶 パドセブ注(1.25mg/kg) 注射用水20mL 1A 注射用水は溶解用 MAX 125mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	全て下ルート	生食100mL 1瓶 メソレキセート(30mg/㎡) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより
		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
		グラニセトロン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	マンニトールS 200mL	休薬完了day28	マンニトールS300mL 200mL			
		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		day2	day2,3
		生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/㎡) 全量を500mLに よルートより	生食500mL 1袋 シスプラチン(40mg/㎡) 全量を500mLに		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎡) 全量を500mLに 下ルートより		アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし
		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
		マンニトール300mL 1瓶 メインルート	ラクテック500mL 1袋		ソルデム3A500mL 1袋		生食 50mL 1瓶 エクザール(3mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/㎡)
		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)
		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	休薬完了day7				生食 50mL 1瓶 ドキソルビシン(30mg/㎡)	
		持続点滴末梢(120分)			day2,3		持続点滴末梢(15分)	day8,15は、休薬週
		ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	アプレビタント内服		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 1A	休薬完了day21
		持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	
		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/㎡)		マンニトールS 200mL	※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服
		持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)	
		休薬完了day7			day8,15は、休薬週		生食500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 全量を500mLに	
		アプレビタント内服			day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(120分)	
					休薬完了day21		生食250mL 1袋	
					アプレビタント内服		持続点滴末梢(30分)	
							休薬完了day14	

hk039-01	hk040-01	hk041-01
入院・外来 33	入院 34	入院・外来 35
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
アドリアシン療法	【限定】dd-MVACarbo	パドセブ+キイトルーダ療法
カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 デキサート注6.6mg 1.5V		
持続点滴末梢(30分)	day1	day1
生食 100mL 1瓶 ドキシルピシン(60mg/mf)	生食 100mL 1瓶 メントレキセート注(15mg/mf)	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)
休薬完了day21	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で 持続点滴末梢(5分)	生食 50mL 1瓶 パドセブ注(1.25mg/kg) 注射用水20mL 1A 注射用水は溶解用 MAX 125mg 持続点滴末梢(30分)
		生食 50mL 1瓶 ※パドセブ耐容性OK→2回目以降、15分で投与可 持続点滴末梢(30分)
	day2	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body) 持続点滴末梢(30分)
	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V 持続点滴末梢(30分)	
	生食 50mL 1瓶 エクザール(3mg/mf) 持続点滴末梢(15分)	
	生食 50mL 1瓶 ドキシルピシン(30mg/mf) 持続点滴末梢(15分)	day8
	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC=5) MAX750mg 持続点滴末梢(60分)	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(15分)
		生食 50mL 1瓶 パドセブ注(1.25mg/kg) 注射用水20mL 1A 注射用水は溶解用 MAX 125mg 持続点滴末梢(30分)
	休薬完了day14	
	臨床試験用レジメン	休薬完了day21