MA療法

休薬完了 day21

	day-1			d	ay I		d	ay2
	メイン	側管(下ルート)		メイン	側管 (下ルート)	1	メイン	側管 (下ルート)
0-			0-			0-		
I <i>-</i>			1-	①生食500mL I袋 メイロン20mL IA		1-	①生食500mL I袋 メイロン20mL IA	
2-			2-	MUZZUML IA		2-	MID ZOME IA	
3-	1		3-	•		3-		
4-			4-	①ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA		4-	①ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA	
5-			5-	•		5-	-	
6-			6-			6-		
7-			7-	②生食500mL I袋 メイロン20mL IA		7-	②生食500mL I袋 メイロン20mL IA	
8-			8-			8-		
9-			9-		9-:30 アロキシ点滴静注バック	9-		
10-			10-	②ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA	:30-10 生食100mL I瓶 ダイアモックス注500mg 0.5V	10-	②ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA	IO-:I5 生食IOOmL I瓶 ソル・メドロール注40mg I.5V
11-			11-		生食250mL 1袋 メイロン20mL IA がトはセート(200mg/㎡) 下ルート、2時間で	11-		生食500mL シタラビン(3g/m) 全量500mL 下ルート、3時間で
12-			12-		生食500mL I袋 メイロン20mL IA メソトレキセート (800mg/m) 下ルート、22時間で	12-		
13-			13-	③生食500mL I袋 メイロン20mL IA	1	13-	③生食500mL I袋 メイロン20mL IA	生食100mL 1瓶 9 17₹+93注500mg 0.5V30分
14-			14-			14-		
15-			15-			15-		
16-			16-	③ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA		16-	③ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA	
17-			17-			17-		
18-			18-			18-		
19-	†		19-	④生食500mL I袋メイロン20mL IA		19-	④生食500mL I袋メイロン20mL IA	
20-	†		20-	7.1-720IIL IA		20-	7.1-720IIIC 1A	
21-			21-			21-		:30-22 生食100mL I瓶 9 17t+97x注500mg 0.5V
22-	①ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA	10-:30 生食100mL I瓶 9 17モッタス注500mg 0.5V	22-	④ソルデム500mL I袋メイロン20mL IA		22-	④ソルデム3A500mL I袋メイロン20mL IA	① 0 (3 x 7) 7) 2 x 3 mg 5 A 生食50 mL 1 瓶 全間で 5分で投与
23-			23-	-		23-	-	22:05-:20 生食100mL I瓶 ソル・メドロール注40mg I.5V
	•							生食500mL シタラビン(3g/m) 全量500mL

I O時までに調製して払い出し

上記の外枠がのRpのみケモ室から払い出し それ以外は注射カートで払い出し

IO時までに調製して払い出し 10時までに調製して払い出し

メイン

側管(下ルート) ①生食500mL I袋 メイロン20mL IA ①生食500mL I袋 メイロン20mL IA ①生食500mL I袋 メイロン20mL IA ①ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ①ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA Dソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ① 0f2は 17注3mg 5A 生食50mL I概 全側で 5分で投与 生食100mL I瓶 ダ 17キャ7以注500mg 0.5V30分 ① 124 * リン注 3mg 5A 生食50mL I粗 全間で 5分で投与 生食100mL I瓶 9* 175+9以注500mg 0.5V30分 全間で 5分で投与 生食100mL I親 9'17モック以上500mg 0.5V30分 6一 5-6-②生食500mL I袋 メイロン20mL IA ②生食500mL I袋 メイロン20mL IA ②生食500mL I袋 メイロン20mL IA ②ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ②ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ②ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ②0イコボリン注3mg 5A 生食50mL I瓶 全間で 5分で投与 20c/コボリン注3mg 5A 生食50mL I瓶 全間で 5分で投与 10-10-10-10:05-:20 生食100mL I瓶 ソル・メドロール注40mg I.5V 11-11-12-12-12-③生食500mL I袋 メイロン20mL IA | I3- ③生食500mL I袋 メイロン20mL IA | 13- ③生食500mL | I袋 メイロン20mL | IA 13-14-14-14-15-15-15-16- ③ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ③ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA 16- ③ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA 17-17-17-生食100mL I縣 9 17モックス注500mg 0.5V30分 生食100mL I瓶 ダイアモックス注500mg 0.5V30分 生食100mL I瓶 ダイアモックス注500mg 0.5V30分 18-18-18-19- <u>@生食500mL 1袋</u> メイロン20mL 1A 20-19- <u>④生食500mL 1袋</u> 20- メイロン20mL 1A 20-21-21-シソルデム3A500mL 1袋メイロン20mL IA ④ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ④ソルデム3A500mL I袋 メイロン20mL IA ④□1コギリン注3mg 5A 生食50mL I瓶 全間で 5分で投与 ®pイコボリン注3mg 5』 生食50mL I瓶 全間で 5分で投与 9013ボラン注3mg 5A 生食50mL I瓶 企間で 5分で投与 22-22-22-22:05-:20 生食100mL 1瓶 ソ8・タドロー8注40mg 1.5V 23-23-23-

メイン

(レポホリナート変更レジメン>

ロイコポリン供給不良時、レポホリナートへ代替レジメンあり ロイコポリン3mg 5A → レポホリナート 7.5mg

側管(下ルート)

メイン

側管(下ルート)