

[illegible]

ba043-01	ba044-01	ba045-01	ba046-01	ba047-01	ba048-01	ba049-01	ba050-01	ba051-01	ba052-01				
入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院・外来	入院・外来				
ケモセーフ・シリンジ	ケモセーフ・シリンジ	ケモセーフ・シリンジ	ケモセーフ・シリンジ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ				
DKd療法1	DKd療法2	DKd療法3～6	DKd療法7～	DA-EPOCH療法(level1)	DA-EPOCH療法(level2)	DA-EPOCH療法(level3)	DA-EPOCH療法(level4)	ba+d療法 1クール目	ba+d療法 2クール目以降				
ダラキユーロ投与1時間前 内服前投薬あり	ダラキユーロ投与1時間前 内服前投薬あり	ダラキユーロ投与1時間前 内服前投薬あり	ダラキユーロ投与1時間前 内服前投薬あり	ダラキユーロ投与1時間前 内服前投薬あり	day1から5日間ブレドニン内服	day1から5日間ブレドニン内服	day1から5日間ブレドニン内服	day1から5日間ブレドニン内服	サークリサ速度表、払い出すとき添付 day1は「800mg/日」を使用 day8、15、22は「200mg/日」を使用				
day1	day8、15	day1、8、15	day1、15	day1	day1	day1	day1	day1	day1、8、15、22				
5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A 内服前投薬あり	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A 内服前投薬あり	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A 内服前投薬あり	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A 内服前投薬あり	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A 内服前投薬あり	アロキシ注ハッパ 1袋 フィルタナシ	アロキシ注ハッパ 1袋 フィルタナシ	アロキシ注ハッパ 1袋 フィルタナシ	アロキシ注ハッパ 1袋 フィルタナシ	生食100mL 1瓶 ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A				
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)				
5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水20mL 1A カイロリス注(20mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(10mg/㎡) エトホシド (80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(12mg/㎡) エトホシド (80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(14.4mg/㎡) エトホシド (124.4mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(14.4mg/㎡) エトホシド (124.4mg/㎡)	生食100mL 1瓶				
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)				
生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶				
持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	day2～4	day2～4	day2～4	day2～4	下記参照				
ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	生食 50mL 1瓶 フィルタナシ 全間で	生食 50mL 1瓶 フィルタナシ 全間で	生食 50mL 1瓶 フィルタナシ 全間で	生食 50mL 1瓶 フィルタナシ 全間で	休薬完了 day28				
皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	下記参照				
ダラキユーロ調製前、常温 で90分以上置く	ダラキユーロ調製前、常温 で90分以上置く	ダラキユーロ調製前、常温 で90分以上置く	ダラキユーロ調製前、常温 で90分以上置く	ダラキユーロ調製前、常温 で90分以上置く	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(10mg/㎡) エトホシド (80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(12mg/㎡) エトホシド (80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(14.4mg/㎡) エトホシド (124.4mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(14.4mg/㎡) エトホシド (124.4mg/㎡)	点滴速度換算表を用いて投与速度を 確認(体重により異なる) 【数値】 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:225mg/hr 認容性良～90～120分:275mg/hr 認容性良～120～400mg/hr				
day2	day2、16	day2、16	day2、8、9、16	day2、8、9、15、16	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	点滴速度換算表を用いて投与速度を 確認(体重により異なる) 【数値】 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:275mg/hr 認容性良～90～120分:375mg/hr 認容性良～120～400mg/hr				
5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 2.5V ボララミン注5mg 1A ファモチジン注20mg 1A	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(10mg/㎡) エトホシド (80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(12mg/㎡) エトホシド (80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(14.4mg/㎡) エトホシド (124.4mg/㎡)	生食 500mL 1袋 オゾンピン (0.4mg/㎡) MAX 2mg/body ドキシルピシ(14.4mg/㎡) エトホシド (124.4mg/㎡)	認容性良～90～120分:275mg/hr 認容性良～120～150分:325mg/hr 認容性良～150～180分:375mg/hr 認容性良～180～240分:400mg/hr				
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day5	day5	day5	day5					
5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水20mL 1A カイロリス注(20mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(80mg/㎡) 注射用水は海解用 全量を100mLに	ダラキユーロ注ハッパ3mg 1袋	ダラキユーロ注ハッパ3mg 1袋	ダラキユーロ注ハッパ3mg 1袋	ダラキユーロ注ハッパ3mg 1袋	【2回目】 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:275mg/hr 認容性良～90～120分:375mg/hr 認容性良～120～400mg/hr				
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 500mL 1袋 エンドキサン(750mg/㎡)	生食 500mL 1袋 エンドキサン(900mg/㎡)	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1080mg/㎡)	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1080mg/㎡)	サークリサ投与開始15分前に前投薬投与				
持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					
day22 レナデックス40mg内服	day22 レナデックス40mg内服	day22 レナデックス40mg内服	day22 レナデックス40mg内服	day22 レナデックス40mg内服	休薬完了 day5	休薬完了 day5	休薬完了 day5	休薬完了 day5					
day22	day22	day22	day22	day22									
ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	ダラキユーロ(15mL/body) シリンジ調製 1mLあたり12～15秒(全量3～5分)かけて 置伏針使用	DA-EPOCH療法は効果・副作用を確認しながら増減して投与するレジメンです				体表面積が、iv.5で1.92㎡以上、iv.6で1.80㎡以上、iv.7で1.68㎡以上の年齢が不十分の可能性あり→生食1000mLへ変更考慮				
皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	levels	levels	levels	levels					
休薬完了 day28	休薬完了 day28	休薬完了 day28	休薬完了 day28	休薬完了 day28	(mg/㎡)	-2	-1	1	2	3	4	5	6
76歳以上 デキサメタゾン減量 day8:16:8.6mg, day22:20mg内服)	76歳以上 デキサメタゾン減量 day22:20mg内服)	76歳以上 デキサメタゾン減量 day22:20mg内服)	76歳以上 デキサメタゾン減量 day22:20mg内服)	76歳以上 デキサメタゾン減量 day8:16:8.6mg, day22:20mg内服)	オゾンピン(VCR) (mg/㎡)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
					アドリアシン(DOX) (mg/㎡)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
					エトホシド(ETP) (mg/㎡)	50	50	50	60	72	86.4	104	124.4
					エンドキサン(CPA) (mg/㎡)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

m053-01	m054-01	m055-01	m056-01	m057-01	m058-01	m059-01	m060-01	m061-01	m062-01	m063-01
入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ
GB療法1	GB療法2～6	GB療法7～	DNR-AreC療法	R-CHOP	IsoK療法 1クール目	IsoK療法 2クール目以降	APL寛解導入B	APL寛解導入C	APL寛解導入D (A追加)	APL寛解導入D (B追加)
ガザイバ投与開始30分前 前投薬投与	ガザイバ投与開始30分前 前投薬投与	ガザイバ投与開始30分前 前投薬投与	キロサイドはケモセーフ経験者 が調製	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1V	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1V デキササート注8.6mg 3V	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	生食 50mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V
day1	day1	day1	day1	持続点滴末梢(15分)	day1	day8、15	day22	day1、15	day1	day1
生食100mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A カロナール同時投与	生食100mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A カロナール同時投与	生食100mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A デキササート注8.6mg 1V カロナール同時投与	アロキン注ハヴ [®] 1袋 メインルート	生食 50mL 1瓶 ポララミン 5mg 1V	生食100mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	生食100mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	生食100mL 1瓶 ポララミン注5mg 1A アモキシシリン注20mg 1A デキササート注8.6mg 3V	アロキン注ハヴ [®] 1袋 メインルート	アロキン注ハヴ [®] 1袋 メインルート	アロキン注ハヴ [®] 1袋 メインルート
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
カイトリル注ハヴ [®] 3mg 1袋 デキササート注8.6mg 1.5V	カイトリル注ハヴ [®] 3mg 1袋 デキササート注8.6mg 1.5V	生食100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ダクマシタ注 (90mg/ml) Rp 3と同時 上ルート	生食 500mL 1袋 メソナジン (375mg/ml) Rp 3と同時 下ルート	生食100mL 1瓶 アゼリオ注1000mg 1袋	生食100mL 1瓶 アゼリオ注1000mg 1袋	生食100mL 1瓶 アゼリオ注1000mg 1袋	生食 100mL 1瓶 メソナジン注 (90mg/ml) Rp 3と同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 メソナジン注 (90mg/ml) Rp 3と同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 メソナジン注 (90mg/ml) Rp 3と同時 上ルート
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
生食 50mL 1瓶 ヘパリス注 (10mg/ml) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 50mL 1瓶 ヘパリス注 (10mg/ml) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 250mL 1袋 ガザイバ注 (1000mg/body) 全量280mL	生食 500mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2と同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2と同時 下ルート	生食100mL 1瓶	生食100mL 1瓶	生食100mL 1瓶	生食 500mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2と同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2と同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2と同時 下ルート
持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)
生食 250mL 1袋 ガザイバ注 (1000mg/body) 全量280mL	生食 250mL 1袋 ガザイバ注 (1000mg/body) 全量280mL	開始～30分25mL/hr 30分～225mL/hr	生食100mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2終了後 メインルート	生食 50mL 1瓶 オムネビン注 (1.4mg/ml) MAX 5mg/hr/day 5～6分で投与	生食250mL 1袋 サークリサ注 (10mg/kg) 全量280mL	生食250mL 1袋 サークリサ注 (10mg/kg) 全量280mL	生食250mL 1袋 サークリサ注 (10mg/kg) 全量280mL	生食100mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2終了後 メインルート	生食100mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2終了後 メインルート	生食100mL 1袋 キロサイド注 (100mg/ml) Rp 2終了後 メインルート
持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)
開始～30分12.5mL/hr 30～60分25mL/hr 60～90分37.5mL/hr 90～120分50mL/hr	開始～30分25mL/hr 30分～225mL/hr	休養日 day58	生食 100mL 1瓶 ドシルビリン (90mg/ml) 上ルート	生食 100mL 1瓶 ドシルビリン (90mg/ml) 上ルート	5%ブドウ糖50mL 1瓶	5%ブドウ糖50mL 1瓶	5%ブドウ糖50mL 1瓶	5%ブドウ糖50mL 1瓶	5%ブドウ糖50mL 1瓶	5%ブドウ糖50mL 1瓶
120～150分62.5mL/hr 150～180分75mL/hr 180～210分87.5mL/hr 210分～100mL/hr	120～150分62.5mL/hr 150～180分75mL/hr 180～210分87.5mL/hr 210分～100mL/hr	120～150分62.5mL/hr 150～180分75mL/hr 180～210分87.5mL/hr 210分～100mL/hr	生食 100mL 1瓶 ダクマシタ注 (90mg/ml) Rp 2と同時 上ルート	生食 500mL 1袋 エンドキサン (750mg/ml) 上ルート	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイフロリス注 (46mg/ml) 注射用水は希薄液 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイフロリス注 (46mg/ml) 注射用水は希薄液 全量を100mLに	5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイフロリス注 (46mg/ml) 注射用水は希薄液 全量を100mLに	生食 100mL 1瓶 メソナジン注 (90mg/ml) Rp 2と同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 メソナジン注 (90mg/ml) Rp 2と同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 メソナ

b4064-01	b4065-01	b4066-01	b4067-01	b4068-01	b4069-01	b4070-01	b4071-01	b4072-01	b4073-01	b4074-01	b4075-01	b4076-01	b4078-01	b4079-01	b4080-01
入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ+シリンジ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 シリンジ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
APL寛解導入D(C追加)	DR+Arac療法	トリセノックス療法	R-CHOP+Ht	エトポシド療法(150mg/m ² (患者設定)		HD+Arac	Arac+MTT(第1コース)	Arac+DNR(第2コース)	k(MTX)/Arac+PSL	Arac+ACR(第3コース)	A+triple-V(第4コース)	A+CHP療法	ALL202-O(60歳以上) 寛解導入療法	ALL202-O(60歳以上) 寛解導入療法	ALL202-O(60歳以上) 寛解導入療法v(反内注あり)
グラネセトシタハッダ 1袋	キロサイドはケモセーフ経験者が調製	トリセノックスはアンブルキヤップ付けたままアンブルキャップすること できるだけケモセーフ経験者が優先して調製	プレドニゾン20mg 1A シリンジ注 (15mg/body) キロサイド注 (40mg/body) 生食注 4mL	カイトリル注ハッダ 3mg 1袋 フィルターなし					プレドニゾン20mg 1A シリンジ注 (15mg/body) キロサイド注 (40mg/body) 生食注 4mL			カイトリル注ハッダ 3mg 1袋	day1~3	day8, 15, 22	day9 ロイターゼ 静注 反内注あり
持続点滴末梢(30分)	day1	day1~5	腫瘍内注(腫瘍)	持続点滴末梢(30分)		day1	day1~3	day1~3	腫瘍内注(腫瘍)	day1~5	day1~5	持続点滴末梢(30分)	day1	day8, 15, 22	day9
生食 100mL 1瓶 イマザミン注(15mg/m ²) 注射用水100mL 1瓶 注射用水は準備用	アロキシ注ハッダ 1袋 メインルート	カイトリル注ハッダ 3mg 1袋	生食 50mL 1瓶 ソル+コナラフ100mg 1V	生食 1000mL 1袋 エトポシド (180mg/m ²)		アロキシ注ハッダ 1袋 デキサート注8.6mg 1V	グラネセトシタハッダ 3mg 1袋	グラネセトシタハッダ 3mg 1袋	休薬完了 day1	グラネセトシタハッダ 3mg 1袋	グラネセトシタハッダ 3mg 1袋	生食 100mL 1瓶 ドキルビシ注(80mg/m ²)	アロキシ注ハッダ 1袋	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.3mg/m ²) MAX 2mg/body 5~6分で投与	ロイターゼ注 1瓶 注射用水20mL 1A 生食20mL ※静注は夜間反応(30分経過観察)の観察後、ケモセーフに調製可否を電話相談 反内注あり
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	反内注あり
生食 1000mL 1袋	生食 100mL 1瓶 イマザミン注(15mg/m ²) 注射用水100mL 1瓶 注射用水は準備用 Ro.3と同時 上ルート	生食250mL 1袋 トリセノックス注 (0.15mg/kg)	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	休薬完了 day1		生食500mL 1袋 シタラピン注(2g/m ²) 金量800mL	生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) Ro.3と同時 上ルート	生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) Ro.3と同時 上ルート	5mLシリンジで調製 ①MTX50mg+1Vあたり生食4mLで溶解 ②溶解液12mLとキロサイド6mLを混合 ③混合液でプレドニゾンを溶解※ケモセーフ経験者が調製	生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) Ro.3と同時 上ルート	生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) Ro.3と同時	生食500mL 1袋 エトポシド注(780mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.3mg/m ²) MAX 2mg/body 5~6分で投与	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	5dドクサール500mL 1袋 ロイターゼ注(3000IU/m ²) 注射用水20mL 1A ※静注は夜間反応(30分経過観察)の観察後、ケモセーフに調製可否を電話相談 反内注あり
持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)		持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)
休薬完了 day14	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/m ²) Ro.2と同時 下ルート	休薬完了 day5	生食 500mL 1袋 リゾパサン (376mg/m ²) 開始時間→50mL/h 2回目以降、忍容性→			生食 100mL 1瓶 ロシタラピン注(2g/m ²) Na100mg 1A Ro.2のシタラピン終了8時間後から 下ルート	生食100mL 1袋 ハントロン (7mg/m ²) ダウ/マイシン(80mg/m ²) Ro.2と同時 下ルート	生食100mL 1袋 ダウ/マイシン(80mg/m ²) Ro.2と同時 下ルート		生食100mL 1袋 アクリナシン(20mg/m ²) Ro.2と同時 下ルート	生食500mL 1袋 エトポシド注(100mg/m ²) Ro.2と同時	生食 100mL 1瓶 アドセトリス注(1.8mg/kg) 注射用水100mL 1瓶 注射用水は準備用	生食 100mL 1瓶 タラマシ注(80mg/m ²)	休薬完了 day1	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用
	持続点滴末梢(24時間)		持続点滴末梢			持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(5分)
アプレビタント内服	生食1000mL 1袋 Ro.3終了後 メインルート	寛解導入1日1回60回まで 寛解導入後1週間の間1日1回25回投与	グラネセトシタハッダ 3mg 1袋			生食500mL 1袋 シタラピン注(2g/m ²) 金量800mL			休薬完了 day5		休薬完了 day21	休薬完了 day21		生食 500mL 1袋 エンドキサン(800mg/m ²)	休薬完了 day1
	持続点滴末梢(23時間30分)		持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(180分)	day4, 5	day4, 5				day8		持続点滴末梢(60分)	
	day2, 3	トリセノックス、4時間まで投与時間延長可	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/m ²) MAX 2mg/body 5~6分で投与			生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) 上ルート	生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) 上ルート	生食500mL 1袋 キロサイド注(200mg/m ²) 上ルート			生食 50mL 1瓶 オンコピン (0.8mg/m ²) MAX 2mg/body 5~6分で投与	休薬が、8mg以上だとアドセトリスの毒副作用が十分の可能性あり→生食250mLへ変更考慮	アプレビタント内服		
	生食 100mL 1瓶 イマザミン注(15mg/m ²) 注射用水100mL 1瓶 注射用水は準備用 Ro.22と同時 上ルート	投与後チェック付きビニール袋でルート専用BOXに調製、BOXが溜まったら、化学療法調製室へ持ちていく	生食 100mL 1瓶 ドキルビシ注 (80mg/m ²)			生食 100mL 1瓶 デキサート注8.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用			生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	休薬が、8mg以上だとアドセトリスの毒副作用が十分の可能性あり→生食250mLへ変更考慮	アプレビタント内服		反内注あり 2.5mLシリンジに調製 ①11を注射用水4mLで溶解後、生食2mLを注加。 ②①を0.1mL取ったシリンジに生食0.1mLを注加し混濁し、0.2mLを調製。
	持続点滴末梢(30分)	※調製室でまとめて調製	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)			持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)		
	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/m ²) Ro.1と同時 下ルート	調製に使用したシリンジ、薬液アンブルをチャック付きビニール袋に密閉して専用BOXへ調製 専用BOXは調製付きの場所に保管する	生食 500mL 1袋 エンドキサン (780mg/m ²)			生食500mL 1袋 シタラピン注(2g/m ²) 金量800mL	休薬完了 day5	休薬完了 day5					生食 50mL 1瓶 ルートキープ用		<反内注 調製例> 調製に使用した注射用水のアンブルを密にする。①0.1mLと生食0.1mLを空アンブルに入れて混濁する。混濁したものから0.1mL調製。
	持続点滴末梢(24時間)		持続点滴末梢(15分)			持続点滴末梢(180分)				day10			持続点滴末梢(15分)		
	生食1000mL 1袋 Ro.1終了後 メインルート	休薬完了 day21				生食 100mL 1瓶 ドキルビシ注8.6mg 1V				生食 50mL 1瓶 フィルダシン (2mg/m ²)		休薬完了 day7			
	持続点滴末梢(23時間30分)					持続点滴末梢(15分)					持続点滴末梢(15分)				
			5mLシリンジで調製 ①MTX50mg+1Vあたり生食4mLで溶解 ②溶解液12mLと4dH ₂ O2mLを混合 ③混合液でプレドニゾンを溶解※ケモセーフ経験者が調製			生食500mL 1袋 シタラピン注(2g/m ²) 金量800mL					生食 50mL 1瓶 ルートキープ用				4dH ₂ Oのシリンジに溶解、混濁あわせてALL202-O(60歳以上「寛解導入療法」レジメンとして使用。休薬完了 day10であることを確認すること。
	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/m ²) Ro.2と同時 下ルート	内服、解熱予防的に内服することあり				休薬完了 day5					休薬完了 day10				
	持続点滴末梢(24時間)														
	生食1000mL 1袋 Ro.1と同時 メインルート	トリセノックスの投与速度が「初回」 開始1時間→50mL/hr その後1時間→100mL/hr その後1時間→200mL/hr その後200mL/hr													
	持続点滴末梢(24時間)		②回目以降、忍容性あり ①②のどちらかで投与可 ①開始30分後→100mL/hr その後30分間→200mL/hr その後→300mL/hr ②生食調製の手配があれば、以下の速度可 開始30分→200mL/hr その後→400mL/hr ※副作用重篤な疾患なし、採血リンパ球数5000/μL未満												
	アプレビタント内服														

入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬	入薬	入薬	入薬	入薬	入薬	入薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬	入薬・外薬
ケモセフ	シリンジ	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ(下ルート)	ケモセフ	
AL202-Q(95濃以上) 既投薬入薬済	AL202-Q(95濃以上) 既投薬入薬済	A+AVD療法	CHASE療法	ピーリンサイト1 <45mg	ピーリンサイト1 <45mg	ピーリンサイト1 <45mg	ピーリンサイト1 <45mg	ピーリンサイト1 <45mg	ピーリンサイト1 <45mg	ピーリンサイト1 <45mg	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ	Hyper-CVAD	Hyper-CVAD	
day11, 13, 16, 18, 20 ロイターゼ 静注	day11, 13, 16, 18, 20 ロイターゼ 静注	ダカルバシンは消れては消滅 出来残り観察時間は短し、投 薬時に観察する。アムニオ ンルートは通流後で管々とし									前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり			
day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	day11, 13, 16, 18, 20	
9hパウチ500mL 1袋 ロイターゼ注(3000U/ml) 注射用水20mL 1A 注射用水は静置用	ロイターゼ注(3000U/ml) 9hパウチ500mL 1A 9hパウチ500mL 1A 注射用水は静置用	アロキシ注1バング 1袋 デキサル注16.6mg 15V メインルート	アロキシ注1バング 1袋 デキサル注16.6mg 5V メインルート	アロキシ注1バング 1袋 デキサル注16.6mg 5V メインルート	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ	ケモセフ	アロキシ注1バング 1袋 デキサル注16.6mg 6V メインルート	アロキシ注1バング 1袋 デキサル注16.6mg 6V メインルート	
持続点満末(120分)	持続点満末(120分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 50mL 1瓶 ルネキープ 1瓶	生食 50mL 1瓶 ルネキープ 1瓶 休養完了 day1	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 15V メインルート	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デキサル注16.6mg 6V メインルート	生食 500mL 1袋 デキサル注16.6mg 6V メインルート	
持続点満末(120分)	持続点満末(120分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
休養完了 day1	休養完了 day1	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより Rp.2と同時	
持続点満末(120分)	持続点満末(120分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(24時間)	中心静脈(24時間)	中心静脈(24時間)
生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL	生食 500mL	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 50mL 1瓶 エクラン(0.6mg/ml) MAX 10mg/body 全量で 5～6分で投与 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより Rp.2と同時	
持続点満末(120分)	持続点満末(120分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(120分)	中心静脈(24時間)	中心静脈(120分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 250mL 1袋 生食 20mL 1A ※注射前に①生食20mL之輸液 安定化後5.5mLを加注 注射用水20mL 1A ピーリン付(16 μg/ml/day) 下ルート	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(120分)	中心静脈(24時間)	中心静脈(120分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 50mL 1瓶 ポラタニ 3mg 1A	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	生食 500mL 1袋 デカルバシン(376mg/ml) 下ルートより Rp.3終了10時間後から	
持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(30分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	持続点満末(15分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)	中心静脈(30分)
生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デカルバシン(376mg/ml) 1人別入薬で点注 ベリンサイトの点注 下ルートより	生食 50mL 1瓶 デキサル注16.6mg 5V 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 500mL 1袋 エンドキサン(1200mg/ml) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※80％モ用ルートを使用しない	生食 100mL 1瓶 デキサル注16.6mg 3V ※8									

[illegible]

[illegible]

© 2006 The Authors

btk135-01		btk136-01		btk137-01		btk138-01		btk139-01		btk140-01		btk141-01		btk142-01		btk143-01	
入院		入院		入院・ 外来		入院・ 外来		入院		入院		入院		入院		入院	
ケモセーブ下ルート		ケモセーブ		ケモセーブ		ケモセーブ		ケモセーブ下ルート		ケモセーブ下ルート		ケモセーブ下ルート		ケモセーブ下ルート		ケモセーブ	
ACR-AraC.GML21[9地固めC3]		AspaMedDev療法(2回目〜)		キイトルーダ(3週毎)		キイトルーダ(6週毎)		IDA-AraC.APL21[2寛解導入B群]		IDA-AraC.APL21[2寛解導入C群]		IDA-AraC.APL21[2寛解導入D群、Aから]		IDA-AraC.APL21[2寛解導入D群、Bから]		IDA-AraC.APL21[2寛解導入D群、Cから]	
キロサイドはケモセーブ経験者が調製		day1〜8		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body)		キロサイドはケモセーブ経験者が調製		キロサイドはケモセーブ経験者が調製		キロサイドはケモセーブ経験者が調製		キロサイドはケモセーブ経験者が調製		キロサイドはケモセーブ経験者が調製	
day1		day2-5		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		day1		day2		day3-5		day1		day2	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1		day2-3		day4-7		day1	
day1		day2-5		day1		day2		day3-5		day1</							

bk144-01	bkl445-01				bkl446-01	bkl47-01	bkl48-01	bkl49-01	bkl50-01	bkl51-01	bkl51-01	bkl52-01	bkl53-01	bkl54-01	bkl55-01
入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ				入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ
トシゲックス APL212[2]地 域C3]	DNR-AraC APL212[2]地 域C2]				マイロタール APL212[2]地 域D4, Day1, 15]	エプキン[10コース]	エプキン[12コース]	エプキン[14コース]	エプキン[16コース]	エプキン[10コース以降]	ESHAP	R-ESHAP	MA+18療法	R-DA-EPOCH療法[1level]	R-DA-EPOCH療法[2level]
	キロサイドはケモセーフ経験者が調製				生食 50mL 1瓶 ソル・コープ100mg 1V ※同時にアゼトアミフン 300mgの内服								day1の12時以降投与分の day1を調整室から払い出し その他は入院予約注射 (2〜3)で払い出し	day1から5日間ブレドニン 内服	day1から5日間ブレドニン 内服
day1〜5	day1	day2-3	day4-5	持続点滴末梢(15分)	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day2-4	day1	day2-4	day1	day1
グラミシド注ハブ3mg 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	ラクテック 500mL 1本 ※同時に73hの4(4T, 12h) 5T, 73h7(7F)1000mg内服 ※DM患者は73hの4(3Tへ 変更可	エプキンリ度下注 48mg ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付	エプキンリ度下注 48mg ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付	エプキンリ度下注 48mg ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付	エプキンリ度下注 48mg ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付	生食 500mL 1袋 フィルタージ メインルート	ソル・マドロール 500mg 生食 50mL 1瓶 フィルタージ メインルート	ソル・マドロール 500mg 生食 50mL 1瓶 フィルタージ メインルート	ソル・マドロール 500mg 生食 50mL 1瓶 フィルタージ メインルート	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(2時間)	持続点滴末梢(6時間)	持続点滴末梢(6時間)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	持続点滴末梢(2時間)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)
生食250mL 1袋 アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート	アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/100mL) メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	エプキンリ度下注 0.16mg 生食100mL 1瓶 ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付					マンニツールS注 1袋 メインルート	エトボシド注(40mg/100mL) メインルート	エトボシド注(40mg/100mL) メインルート	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	皮下投与					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)
休養完了 day5	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/100mL) メインルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(200mg/100mL) メインルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(200mg/100mL) メインルート	生食 100mL 1瓶 注射用5mL/V用溶解 ※調製キャビネット内のみ 調製						アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 ソル・マドロール(80mg/100mL) メインルート	生食 500mL 1袋 ソル・マドロール(80mg/100mL) メインルート	生食 500mL 1袋 ソル・マドロール(80mg/100mL) メインルート	生食 500mL 1袋 ソル・マドロール(80mg/100mL) メインルート	生食 500mL 1袋 ソル・マドロール(80mg/100mL) メインルート
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(120分)	day6					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(22時間45分)	持続点滴末梢(22時間45分)	持続点滴末梢(22時間45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
1週間(15日間、これを5週間 繰り返す) WCO後、骨髄抑制から回復 後、骨髄液検査を行い、腫瘍 マーカー(MTX)15mg/body, AraC 40mg/body, PS, 10mg/body を行う	生食 500mL 1袋 キロサイド注(200mg/100mL) メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ラクテック 500mL 1本 ※同時に73hの4(4T, 12h) 5T, 73h7(7F)1000mg内服 ※DM患者は73hの4(3Tへ 変更可	エプキンリ度下注 0.8mg 生食100mL 1瓶 ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	ソル・マドロール 500mg 生食 50mL 1瓶 メインルート	生食 500mL 1袋 シスプラチンと同時 メインルート	マンニツールS注 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 シスプラチンと同時 メインルート	アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート	アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート
持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(15時間)	持続点滴末梢(6時間)	持続点滴末梢(6時間)	持続点滴末梢(120分)	皮下投与	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(22時間45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(22時間45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
トシゲックス、4時間まで投 与時間延長可	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	エプキンリ度下注 0.8mg 生食100mL 1瓶 ※調製方法: 別紙参照 ※シリンジ・遮光交付	休養完了 day14	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	エトボシド注(40mg/100mL) メインルート	生食 250mL 1袋 メインルート	アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート	アロキシ注ハブ3mg 1袋 メインルート	生食 300mL 1袋 オゾンビシ(0.4mg/100mL) MAX 2mg/body ※DM患者は73hの4(3Tへ 変更可	生食 300mL 1袋 オゾンビシ(0.4mg/100mL) MAX 2mg/body ※DM患者は73hの4(3Tへ 変更可
持続点滴末梢(2時間)	持続点滴末梢(6時間)	持続点滴末梢(6時間)	持続点滴末梢(6時間)	皮下投与	day15, 22	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	休養完了 day28	シスプラチン					

bk156-01	bk157-01	bk158-01	bk159-01		bk160-01	
入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート)		入院 ケモセーフ(下ルート)	
R-DA-EPOCH療法(level3)	R-DA-EPOCH療法(level6)	リツキシマブ+it	R-CEOP		R-CEOP+it	
day1から5日間プレドニン内服	day1から5日間プレドニン内服					
day1	day1	day1	day1	Day2-3	day1	day2-3
生食 50mL 1瓶 ソル・コーチフ100mg 1V	生食 50mL 1瓶 ソル・コーチフ100mg 1V	プレドニン注20mg 1A メトトレキサート (18mg/body) キロサイド注 (40mg/body) 生食注 4mL	生食 50mL 1瓶 ソル・コーチフ100mg 1V フィルタ―なし	グラニセド注ハッパ3mg 1袋 フィルタ―なし	プレドニン注20mg 1A メトトレキサート (18mg/body) キロサイド注 (40mg/body) 生食注 4mL	グラニセド注ハッパ3mg 1袋 フィルタ―なし
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	髄腔内注(腰髄)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	髄腔内注(腰髄)	持続点滴末梢(30分)
生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ソル・コーチフ100mg 1V	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1V メインルート	5ブドウ糖 250mL 1瓶 エトボシド (80mg/inf)	生食 50mL 1瓶 ソル・コーチフ100mg 1V フィルタ―なし	5ブドウ糖 250mL 1瓶 エトボシド (80mg/inf)
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)
生食 500mL 1袋 リツキシマ (378mg/inf) 開始1時間→50mL/hr 2回目以降、忍容性…	生食 500mL 1袋 リツキシマ (378mg/inf) 開始1時間→50mL/hr 2回目以降、忍容性…	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 500mL 1袋 リツキシマ (378mg/inf) 間 開始1時間→50mL/hr 2回目以降、忍容性… 下ルート	/	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1V メインルート	/
持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(15分)	
アロキシ注ハッパ 1袋 フィルタ―なし	アロキシ注ハッパ 1袋 フィルタ―なし	生食 500mL 1袋 リツキシマ (378mg/inf) 開始1時間→50mL/hr 2回目以降、忍容性…	グラニセド注ハッパ3mg 1袋 メインルート	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 リツキシマ (378mg/inf) 間 開始1時間→50mL/hr 2回目以降、忍容性… 下ルート	休薬完了day21
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢	
生食 500mL 1袋 オンコピン (0.4mg/inf) MAX 2mg/body ドキシルピシン(14.4mg/inf) エトボシド (72mg/inf)	生食 500mL 1袋 オンコピン (0.4mg/inf) MAX 2mg/body ドキシルピシン(14.4mg/inf) エトボシド (72mg/inf)	/	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/inf) MAX 2mg/body 5～6分で投与 下ルート		グラニセド注ハッパ3mg 1袋 メインルート	
持続点滴末梢 (23mL/h)	持続点滴末梢 (23mL/h)		持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)	
/	iv.4, iv.8はiv.8のレジメンを減量して対応 をiv.の用量は下記		5ブドウ糖 250mL 1瓶 エトボシド (80mg/inf) 上ルート		生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/inf) MAX 2mg/body 5～6分で投与 下ルート	
	day2～4	day2～4	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(5分)	
生食 50mL 1瓶 フィルタ―なし 全間で	生食 50mL 1瓶 フィルタ―なし 全間で		生食 500mL 1袋 エンドキサン (780mg/inf) 下ルート		5ブドウ糖 250mL 1瓶 エトボシド (80mg/inf) 上ルート	
持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
生食 500mL 1袋 オンコピン (0.4mg/inf) MAX 2mg/body ドキシルピシン(14.4mg/inf) エトボシド (72mg/inf)	生食 500mL 1袋 オンコピン (0.4mg/inf) MAX 2mg/body ドキシルピシン(14.4mg/inf) エトボシド (72mg/inf)				生食 500mL 1袋 エンドキサン (780mg/inf) 下ルート	
持続点滴末梢 (23mL/h)	持続点滴末梢 (23mL/h)				持続点滴末梢 (60分)	
/	/				5mL/10分にて調製 ①MTX20mg1Vあたり生食4mLを 2袋毎 ②溶液速1.2mLと10分1.2mLを 調合 ③混合液でプレドニンを溶解 ※ケモセーフ経験者の調製	
		day5	day5			
グラニセド注ハッパ3mg 1袋	グラニセド注ハッパ3mg 1袋	《リツキシマの投与速度》 【初回】 開始1時間→50mL/hr その後1時間→100mL/hr その後1時間→200mL/hr その後→300mL/hr	《リツキシマの投与速度》 【初回】 開始1時間→50mL/hr その後1時間→100mL/hr その後1時間→200mL/hr その後→300mL/hr		《リツキシマの投与速度》 【初回】 開始1時間→50mL/hr その後1時間→100mL/hr その後1時間→200mL/hr その後→300mL/hr	
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
生食 500mL 1袋 エンドキサン (1080mg/inf)	生食 500mL 1袋 エンドキサン (1080mg/inf)	【2回目以降、忍容性あり】 1か2のどちらかで投与可 ①開始30分→100mL/hr その後30分→200mL/hr その後→300mL/hr	【2回目以降、忍容性あり】 1か2のどちらかで投与可 ①開始30分→100mL/hr その後30分→200mL/hr その後→300mL/hr		【2回目以降、忍容性あり】 1か2のどちらかで投与可 ①開始30分→100mL/hr その後30分→200mL/hr その後→300mL/hr	
持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					
休薬完了day6	休薬完了day6	②主治医の指示があれば、以下の速度可 開始30分→200mL/hr その後→400mL/hr 参照：重篤な心疾患なし、採血リンパ球数5000/μL未満	②主治医の指示があれば、以下の速度可 開始30分→200mL/hr その後→400mL/hr 参照：重篤な心疾患なし、採血リンパ球数5000/μL未満			
DA-EPOCH療法は効果・副作用を鑑別しながら量を減量して投与するレジメン(Lvの詳細は、血液47 DA-EPOCH参照)		体表面積が、1.5で1.92㎡以上、1.8で1.6㎡以上と1.8未満の患者が不十分の可能性あり→生食1000mLへ変更考慮				