

コード	kk001-06		kk002-05		kk003-05		kk004-06		kk005-06		kk006-06		kk007-03	
	入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来	
ルート	ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)		ケモセーフ	
プロトコ ル名	シスプラチン・ ジェムザール		シスプラチン・ ナベルピン		シスプラチン・ TS-1		シスプラチン・ カンプト		シスプラチン・ タキシテル		シスプラチン・ ラステット		パラプラチン・ Monthlyタキソール	
投与順序	1 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	★TS-1開始時がday 1		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ファミモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレシメジナー75錠服 用			
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎎)	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/㎎) 全開で	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取		生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎎)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/㎎) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/㎎)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V						
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)				
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/㎎)						
	手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)						
4 薬剤	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg						
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)						
5 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎎) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎎) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎎) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎎) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎎) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎎) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎎) 全量を500mL 下ルートより	day8,15は、休薬週						
	手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)							
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	休薬完了day21						
	手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	カルボプラチンはAUC6に減量 されていても同じ合わせ不要						
7 薬剤	day8		day8		day8,15は、休薬週		day8,15は、休薬週							
	手技													
8 薬剤	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/㎎) 全開で	休薬完了day35		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	※入院 アロカリス注→アプレビタントを内 服						
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)							
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎎)	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	※入院 アロカリス注→アプレビタント を内服		生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎎)	※入院 アロカリス注→アプレビタント を内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/㎎)							
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)							
# 薬剤	day15は、休薬週		day15は、休薬週		day22は、休薬週		day8,15は、休薬週							
# 薬剤	休薬完了day21		休薬完了day21		休薬完了day28		休薬完了day21							
	手技													
# 薬剤	※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服		※入院 アロカリス注→アプレビタント を内服		※入院 アロカリス注→アプレビタント を内服		※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服							
	手技													
# 薬剤														
	手技													
# 薬剤														
	手技													
# 薬剤														
	手技													
# 薬剤														
	手技													
# 薬剤														
	手技													
旅行日数	2	2		3	1	3								

施行日数		3	1	1	2	3	3	1	3	1	2	3
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

コード	ルート	プロトコル名	kk020-05	kk022-04	kk023-03	kk024-03	kk025-04	kk026-03	kk027-03	kk028-02	kk029-03	kk030-02	kk031-02
			入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来
			ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
			ナベルピン	カンプト	カルセド	ハイカムチン	シスプラチン・アリムタ	Biweekly ジェムザール	Biweekly パラプラチン・カンプト	アリムタ	パラプラチン・タキソール・アバスチン	アバスチン	パラプラチン・アリムタ
投与順序	1 薬剤		カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注1mg筋注	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 フマゼジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にシスシニュー75錠服用	生食 100mL 1瓶 ペハシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋注	
	手技		day1.3	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴側室 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	day1	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	day1	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (90分)	day1
	2 薬剤		生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/㎡) 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎡)	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 ハイカムチン (1.0mg/㎡)	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水1L摂取	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン (1000mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (40mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V
	手技	持続点滴末梢 (5分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (5分)	持続点滴末梢 (30分)
	3 薬剤		生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	day1～16まで計3コース	生食 100mL 1瓶 カルセド (40mg/㎡) 全開で Rp.1終了後	day1～5まで計6コース	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)	休薬完了 day14	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 2) MAX300mg	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注 (200mg/㎡)	休薬完了 day21	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)
	手技	持続点滴側室	day22は、休薬週	持続点滴側室 (約10分)		持続点滴末梢 (10分)		持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (10分)	持続点滴末梢 (180分)		持続点滴末梢 (10分)	
	4 薬剤	day1～8まで計2コース	休薬完了 day7	day1～3	休薬完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq			休薬完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	
	手技	day15は、休薬週			持続点滴末梢 (60分)		day8は、休薬週		持続点滴末梢 (120分)		持続点滴末梢 (120分)		
	5 薬剤	休薬完了 day21		休薬完了 day21		マンニトールS 200mL		休薬完了 day14		生食 100mL 1瓶 ペハシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可			
	手技				持続点滴末梢 (30分)				持続点滴末梢 (90分)		day8.15は、休薬週		
	6 薬剤					生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/㎡) 全量を500mL				休薬完了 day21		休薬完了 day21	
	手技				持続点滴末梢 (120分)								
	7 薬剤					ソルデム3A500mL 1袋				※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服		※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服	
	手技				持続点滴末梢 (60分)								
	8 薬剤												
	手技				day8.15は、休薬週								
	9 薬剤					休薬完了 day21							
	手技												
	# 薬剤					※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服							
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												
	# 薬剤												
	手技												

コード	kk032-01	kk033-01	kk034-01	kk035-06	kk036-01	kk037-01	kk038-01	kk039-01	kk040-01	kk042-01	kk043-01
ルート	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来
プロトコル名	ケモセーフ アリムタ・アバステン	ケモセーフ パラプラチン・アリムタ・アバステン	ケモセーフ アクブラ・タキソテール	ケモセーフ シスプラチン・タキソテール (放射線併用)	ケモセーフ ドセタキセル・サイラムザ	ケモセーフ オプジーボ(2週毎)	ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタナシ)	ケモセーフ キイトルーダ(3週毎)	ケモセーフ テセントリク	ケモセーフ キイトルーダ・パラプラチン・アリムタ	ケモセーフ キイトルーダ・パラプラチン・Monthlyタキソール
投与順序 1 薬剤	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋注	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アプレビタント内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にシスプラチン・75B内服	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(240mg/body)		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)
手技	day1	day1	持続点滴末梢(30分)	day1,8,23,38	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/㎡) 調製時ポンピング必要	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V 投与中に水分1L摂取	生食250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 メインルートを全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルタナシ	生食 50mL 1瓶 メインルートを全開で	生食 50mL 1瓶 メインルートを全開で	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 フアモジシン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にシスプラチン・75B内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(800mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(800mg/㎡)	生食 500mL 1袋 アクブラ (100mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/㎡) 調製時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 全開で	休薬完了 day14	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	休薬完了 day21	休薬完了 day21	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V
手技	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX750mg	ラクテック500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1B 硫酸Mg 8mEq 調製時ポンピング必要	生理食塩液250mL 1袋 ドセタキセル (80mg/㎡) 調製時ポンピング必要		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより		生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	休薬完了 day21	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ラクテック500mL 1袋	マンニトールS 200mL	休薬完了 day21					ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)			day8,15			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤			休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 シスプラチン (40mg/㎡) 全量を500mL			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルタナシ				
手技		day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)			day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週
7 薬剤		休薬完了 day21		ソルデム3A500mL 1袋			生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄		休薬完了 day21	休薬完了 day21	休薬完了 day21
手技				持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(30分)				
8 薬剤		※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服					休薬完了 day21			※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服	カルボプラチンはAUC6に調整されていても問い合わせ不要
手技				day15,22,43は、休薬週							
9 薬剤				休薬完了 day49			※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服				※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
旅行日数	1	1	1	4	1	1	3	1	1	1	

コード	kk044-01	kk045-01	kk046-01	kk047-01	kk048-01	kk050-01	kk051-01	kk052-01	kk053-01	kk054-01	kk055-01
ルート	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ・ 外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ・ 外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ
プロトコ ル名	キイトルーダ・シスプラチン・ アリムタ	キイトルーダ・アリムタ	テセントリク・パラプラチン・ タキソール・アバステン	テセントリク・アバステン	キイトルーダ・カルボプラチン・ アブラキサン	テセントリク・パラプラチン・ラス テット療法	イミフィンジ肺維持小細胞・肝	イミフィンジ・パラプラチン・ラス テット療法	イミフィンジ・シスプラチン・ ラステット療法	オプジーボ(4週毎)	キイトルーダ(6週毎)
投与順序	1 薬剤 1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1 朝 9週毎 メチコパー ル注 1mg防注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1 朝 9週毎 メチコパー ル注 1mg防注	生食 100mL 1瓶 テセントリク注 (1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 テセントリク注 (1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 ヘハシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 テセントリク注 (1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body) 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注 (480mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body)
手技	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1袋 ヘハシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ヘハシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body) 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルード 全開で	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルード 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルード 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスチンウ5錠服 用	生食 50mL 1瓶 メインルード 全開で	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)	休薬完了 day28	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V フィルターなし	休薬完了 day28	休薬完了 day42
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/ml)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/ml)	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	休薬完了 day21	生食100mL (20mL/ml) アブラキサン注 (100mg/ml) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)		
手技	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)		
5 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	休薬完了 day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注 (200mg/ml)		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq		
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(120分)	day2,3 持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		
6 薬剤	マンニトールS 200mL		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(30分)		マンニトールS 200mL			
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		day8,15 持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(30分)		day2,3 持続点滴末梢(30分)			
7 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/ml) 全量を500mL		休薬完了 day21	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(120分)		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 シスプラチン (80mg/ml) 全量を500mL 下ルートより			
手技	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(120分)		day2,3 持続点滴末梢(30分)			
8 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋		※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服		生食100mL (20mL/ml) アブラキサン注 (100mg/ml) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(30分)		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)	ソルデム3A500mL 1袋		
手技	持続点滴末梢(60分)				day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週 持続点滴末梢(30分)		day2,3 持続点滴末梢(120分)	day2,3 持続点滴末梢(60分)		
9 薬剤					休薬完了 day21	休薬完了 day21					
手技	day8,15は、休薬週 day8,15は、休薬週					day8,15は、休薬週 day8,15は、休薬週		day8,15は、休薬週 day8,15は、休薬週	day2,3 持続点滴末梢(30分)		
# 薬剤	休薬完了 day21				※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服		休薬完了 day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		
手技									持続点滴末梢(30分)		
# 薬剤	※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服							※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml)		
手技									持続点滴末梢(30分)		
# 薬剤											
手技									day8,15は、休薬週		
# 薬剤									休薬完了 day21		
手技											
# 薬剤									※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服		
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
# 薬剤											
手技											
旅行日数	1						3	1	3	3	1

コード	kk056-01	kk057-01	kk057-01	kk058-01	kk059-01	kk060-01	kk061-01	kk062-01	kk063-01	kk064-01	kk065-01
ルート	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ・ 外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ	入院 ・ 外来 ケモセーフ
プロトコ ル名	オブジーボ+ヤーボイ(マノマ)	オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA +PTX day1	オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA +PTX day22	オブジーボ+ヤーボイ(肺小 胞・食道)	テセントリク・カルボプラチン +アブラキサン	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん) +mab-PTX+CBDCA(非扁平 上皮・扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん) +PEM+CBDCA(非扁平上 皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん) +PEM+CCDP(非扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん) +GEM+CBDCA(扁平上皮)	イミフィンジ+イジユド(非小細胞肺がん) +GEM+CCDP(扁平上皮)	イミフィンジ(非小細胞肺がん) +PEM維持(非扁平上皮)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (80mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (80mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (80mg/body)				生食 100mL 1瓶 イジユド注 (75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イジユド注 (75mg/body)		アブレピタント内服	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	div1	div1	div1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	div1	div1	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.2と同時にレスタシノー75錠服用	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (80mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注 (1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルートより	生食 100mL 1瓶 イジユド注 (75mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 100mL 1瓶 イジユド注 (75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イジユド注 (75mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 ヤーボイ注 (3mg/kg)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注 (1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	生食 100mL 1瓶	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注 (200mg/mf)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注 (1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	生食 100mL (20mL/mf) アブラキサン注 (100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/mf)
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(10分)
5 薬剤	休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.5と同時にレスタシノー75錠服用	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶	生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	休薬完了day21
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤	4回投与後、オブジーボ単剤へ	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	休薬完了day21			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1 朝 9週毎 メチコパー ル注 1mg筋注
手技		持続点滴末梢(30分)	div22	div15	div8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤		5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注 (200mg/mf)	※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (80mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注 (100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 8mEq	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	
手技		持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg		生食 50mL 1瓶	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注 (100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	休薬完了day21	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 4) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	
手技		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	
9 薬剤		休薬完了day21		休薬完了day42	休薬完了day21		1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1 9週毎 メチコパー ル注 1mg筋注	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/mf) 全量500mL		マンニトールS 200mL	
手技					div8,15	div8,15	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	div8	持続点滴末梢(30分)	
# 薬剤		※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服		※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服	ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/mf) 全量500mL		
手技					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		
# 薬剤					生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注 (100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄		休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋		
手技					持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		
# 薬剤					休薬完了day21			1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1 9週毎 メチコパー ル注 1mg筋注	休薬完了day21		
手技									div8		
# 薬剤					※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服		※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		
手技									持続点滴末梢(30分)		
# 薬剤									生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)		
手技									持続点滴末梢(30分)		
# 薬剤									休薬完了day21		
手技											
# 薬剤									※入院 アロカリス注→アブレピタントを 内服		
手技											
# 薬剤											
手技											
旅行日数		1									

2