

コード ナンバリング		ng002-01	ng003-01	ng004-01
		2	3	4
		入院	入院	入院
		ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ
プロトコー ル名		ICE療法	HD-MTX療法	アバステン(10mg/kg)
投与順序	1 薬剤	Rp.1のソルデム1は入院予 約注射(カート)で払い出し ウロミテキサンは薬剤師が調製	day1のRp.8~14(12時以降投 与分)は調製室から払い出 し。その他は入院予約注射 (カート)で払い出し。	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30 分へ短縮可
	手技	day1~5		持続点滴末梢(90分)
	2 薬剤	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	別紙	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
	手技	持続点滴末梢(210分)		持続点滴末梢(5分)
	3 薬剤	グラニセロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食500mL 1袋 マトルキセート (3500mg/mf) メイロン20mL 1A 全量500mL	休薬完了day14
	手技	持続点滴側管(30分)		
	4 薬剤	生食500mL 1袋 エトポシド注(60mg/mf) 上ルートより	休薬完了day14	
	手技	持続点滴末梢(120分)		
	5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注(270mg/mf) Rp.5と同時に 下ルートより		
	手技	持続点滴末梢(30分)		
	6 薬剤	生食 500mL 1袋 イホマイド (0.9g/mf) Rp.4と同時に 上ルートより		
	手技	持続点滴末梢(120分)		
	7 薬剤	生食500mL 1袋 シスプラチン(20mg/mf) 上ルートより		
	手技	持続点滴末梢(120分)		
	8 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注(270mg/mf) メインルートより		
	手技	持続点滴末梢(30分)		
	9 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより		
	手技	持続点滴末梢(90分)		
	10 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注(270mg/mf) メインルートより		
	手技	持続点滴末梢(30分)		
	11 薬剤	ソルデム3AG 500mL 1袋 メインルートより		
	手技	持続点滴末梢(5時間30分)		
	12 薬剤	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより		
	手技	持続点滴末梢(6時間)		
	13 薬剤	休薬完了day28		
	手技			
	14 薬剤			
	手技			
	15 薬剤			
	手技			