

コード ナンバリング	ct001-01 1	ct002-01 2	ct003-01 3	ct004-01 4	ct005-01 5	ct006-01 6	ct007-01 7
入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
レミケード (3mg/kg)	レミケード (5mg/kg)	レミケード (10mg/kg)	レミケード (10mg/kg)	エンドキサンパルス[500mg/m ²]	リツキサン(50mg/h)	リツキサン (25mg/h)	エンドキサンパルス[15mg/kg] ANCA関連血管炎
投与順序 1 薬剤	生食 100mL 1瓶 ソル・コージェフ100mg 1V 持続点滴末梢 (30分)	生食 100mL 1瓶 ソル・コージェフ100mg 1V 持続点滴末梢 (30分)	生食 100mL 1瓶 ソル・コージェフ100mg 1V 持続点滴末梢 (30分)	生食500mL 1袋 エンドキサン (500mg/m ²) 持続点滴末梢 (60分)	生食 50mL 1瓶 ソル・コージェフ100mg 1V 持続点滴末梢 (15分)	生食 50mL 1瓶 ソル・コージェフ100mg 1V 持続点滴末梢 (15分)	生食500mL 1袋 エンドキサン (15mg/kg) 持続点滴末梢 (60分)
2 薬剤	生食250mL 1袋 インフリキシマブ (3mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr 持続点滴末梢	生食250mL 1袋 インフリキシマブ (5mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr 持続点滴末梢	生食250mL 1袋 インフリキシマブ (10mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr 持続点滴末梢	生食250mL 1袋 メインルート 持続点滴末梢 (30分)	生食 50mL 1瓶 ポ ラミン 5mg 1V 持続点滴末梢 (15分)	生食 50mL 1瓶 ポ ラミン 5mg 1V 持続点滴末梢 (15分)	生食250mL 1袋 メインルート 持続点滴末梢 (30分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr 持続点滴末梢	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr 持続点滴末梢	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr 持続点滴末梢	休薬完了 day14	生食 500mL 1袋 リツキサン (375mg/m ²) 開始30分→50mL/hr 2回目以降、忍容性… 持続点滴末梢	生食 500mL 1袋 リツキサン (375mg/m ²) 開始1時間→25mL/hr 2回目以降、忍容性… 持続点滴末梢	休薬完了 day14
4 薬剤	休薬完了 day14	休薬完了 day14	休薬完了 day14		休薬完了 day1	休薬完了 day1	
5 薬剤					内服、解熱剤予防的に内服 することあり。	内服、解熱剤予防的に内服 することあり。	
6 薬剤						《リツキサンの投与速度》 【初回】 開始1時間→25mL/hr その後1時間→100mL/hr その後→200mL/hr	
7 薬剤						【2回目以降、忍容性あり】 ①か②のどちらかで投与可能 ①開始1時間→100mL/hr その後→200mL/hr	
8 薬剤						②主治医の指示があれば、 以下の速度可 開始1時間→200mL/hr その後→400mL/hr 参照：重篤な心疾患なし、採 血リンパ球数5000/μL未満	
9 薬剤							
10 薬剤							
11 薬剤							
12 薬剤							
13 薬剤							
14 薬剤							
15 薬剤					腎内1、血液4と共通	血液15、総診1と共通	総診4と共通

ct008-01	ct009-01
8	9
入院 ・ 外来	入院 ・ 外来
ケモセーフ	ケモセーフ
エンドキサンパルス[500mg/体]	リツキサン【ANCA関連血管炎・前投薬ステロイドOFF】
ANCA関連血管炎	
生食500mL 1袋	生食 50mL 1瓶 ポ
エンドキサン(600mg/body)	ラミン 5mg 1V
持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(15分)
生食250mL 1袋	生食 500mL 1袋
メインルート	リツキサン(375mg/mf)
	開始1時間→25mL/hr
	2回目以降、忍容性...
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢
休薬完了day14	休薬完了day1
	内服、解熱剤予防的に内服することあり。
●血清CRE(1.7～3.4mg/dL)	《リツキサンの投与速度》
60歳未満:15mg/kg/回	【初回】
60-70歳未満:12.5mg/kg/回	開始1時間→25mL/hr
70歳以上:10mg/kg/回	その後1時間→100mL/hr
	その後→200mL/hr
●血清CRE(3.4～5.7mg/dL)	【2回目以降、忍容性あり】
60歳未満:12.5mg/kg/回	①か②のどちらかで投与可能
60-70歳未満:10mg/kg/回	①開始1時間→100mL/hr
70歳以上:7.5mg/kg/回	その後→200mL/hr
	②主治医の指示があれば、以下の速度可
	開始1時間→200mL/hr
	その後→400mL/hr
	参照:重篤な心疾患なし、採血リンパ球数5000/μL未満
総診5と共通	総診6と共通