

コード ナンバリング	sf001-03	sf002-06	sf004-06	sf005-05	sf006-03	sf007-02	sf009-01	sf010-01	sf011-03	sf012-01
	入院・外来 ¹	入院・外来 ²	入院・外来 ⁴	入院 ⁵	入院 ⁶	入院 ⁷	入院・外来 ⁹	入院・外来 ¹⁰	入院 ¹¹	入院 ¹²
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	dose dense TC	TC 3weeks	DC 3weeks	CAP	CPT-11+CDDP	weeklyCDDP+RT	ドキシル(BSA1.5㎡未満)	ドキシル(BSA1.5㎡以上)	AP	CPT-11+NDP
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75T内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2. 5V Rp.1と同時にレスタシノー75T内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V	ラクテック 1袋 下ルートより	ラクテック 500mL 1袋 Rp.2と同時に	/	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	ラクテック 500mL 1袋 下ルートより	グラニセト注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	day1,8,15,22,29	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/㎡)	生食 500mL 1袋 セタキセル注(70mg/㎡) 調製時ボンピング必要	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時に	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注(50mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注(50mg/㎡)	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 500mL 1袋 イリノテカン(50mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX750mg	生食 100mL 1瓶 エビルシジン注(40mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/㎡)	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時に	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.2と同じ速度で	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.2と同じ速度で	ドキソルビン注(80mg/㎡) 生食 100mL 1瓶	生食 500mL 1袋 アクトラ注(80mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	/	休薬完了day21	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 シスプラチン注(50mg/㎡) 全量500mLに	生食 500mL 1袋 シスプラチン注(50mg/㎡) 全量500mLに	ソルデム3A500mL 1袋	初回のみday1から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与	初回のみday1から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与	生食 500mL 1袋 シスプラチン注(50mg/㎡) 全量500mLに	ラクテック500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.25A
手技		day8,15		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75T内服			生食 500mL 1袋 エンドキサン注(300mg/㎡)	ラクテック 500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.25A	生食 500mL 1袋 シスプラチン注(40mg/㎡) 全量500mLに	各クール プレドニソロン錠投与 day1から 16T朝昼 4日分 day5から 8T 朝昼 1日分 day6から 4T 朝 1日分	各クール プレドニソロン錠投与 day1から 16T朝昼 4日分 day5から 8T 朝昼 1日分 day6から 4T 朝 1日分	生食 500mL 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 KOL注 1キット
手技	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
6 薬剤	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/㎡)			ソルデム3A500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.5A	ソルデム3A 500mL 1袋 KOL注 1キット	ソルデム3A 500mL 1袋 ラシックス注20mg 1A	休薬完了day28	休薬完了day28	ソルデム3A500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.5A	/
手技	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)	
7 薬剤	休薬完了day21			ラクテック 1袋 KOL注 1キット	ラクテック 500mL 1袋 10%NaCl注 1瓶	ソルデム3A 500mL 1袋	体表面積注意！	体表面積注意！	ラクテック 500mL 1袋 KOL注 1キット	day8, day15 グラニセト注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤				ソルデム3A500mL 1袋	/	ソルデム3A500mL 1袋			ソルデム3A500mL 1袋	生食 500mL 1袋 イリノテカン(50mg/㎡)
手技				持続点滴末梢(120分)		day8, day15			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
9 薬剤				ラクテック 1袋	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	/			ラクテック500mL 1袋	休薬完了day28
手技				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	day2,9,16,23,30			持続点滴末梢(120分)	
10 薬剤				休薬完了day21	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋 Rp.2と同時に			休薬完了day21	
手技					持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)				
11 薬剤				アブレタント内服	休薬完了day28	グラニセト注キット 1袋 Rp.1と同時に			アブレタント内服	
手技						持続点滴末梢(30分)				
12 薬剤					アブレタント内服	ソルデム3A500mL 1袋				
手技						持続点滴末梢(120分)				
13 薬剤						計 5回 休薬完了 day35				
手技										
14 薬剤	産婦人科は、【AUC=6、 Jelliffe式、CRE+0.2補正あり】が基本(25/3/3 個)	産婦人科は、【AUC=6、 Jelliffe式、CRE+0.2補正あり】が基本(25/3/3 個)	産婦人科は、【AUC=6、 Jelliffe式、CRE+0.2補正あり】が基本(25/3/3 個)							
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sf013-02	sf014-01	sf015-01	sf016-01	sf017-01	sf018-01
	入院 13	入院 14	入院 15	入院・外来 16	入院 17	入院 18
ルート	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	カテーテルシリンジチップ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)
プロトコール 名	IAP	トボテカン	CDDP腹腔内	タキシテール	EMA/CO	BEP療法
投与順序	1 薬剤	アプレビタント内服	グラニセドロン注ハッグ 1袋 デキサル注6.6mg 0.5V	ラクテック500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V	ロコボリン錠15mg 12時間ごとに4回 メトキシセト投与開始後24時間より服用開始
手技	Day1~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	Day1	Day8
2 薬剤	ラクテック500mL 1袋 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ハイカムテン(1.5mg/㎡)	グラニセドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/㎡) 調製時ポンピング必要	グラニセドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V	グラニセドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	グラニセドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V 7/27開始60分から メインルート	day1~5まで計5コース	生食250mL 150mL シスプラチン注(50mg/㎡)		蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 250mL 1袋 エンドキサン注(800mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(30分)		腹腔内投与	day8、15は、休薬週	静脈注射	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ドキシソルビン注 (40mg/㎡) イホマイドへ継ぎ換え時 下ルートより Day4のみ	休薬完了day21	ソルデム3A 500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.5A	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 エトポシド注(100mg/㎡) 上ルートより	生食 20mL 1A オンコビン注 (0.8mg/㎡) 下ルートより ◆シリンジで調製 MAX 2mg/body 主治医がiv.
手技	持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	静脈注射	持続点滴末梢(15分)
5 薬剤	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/㎡) ウロシキサン1回目と同時に 上ルートより		ラクテック500mL 1袋 KCL注 1キット	生食 500mL 1袋 メトキシセト (300mg/㎡) 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 500mL 1袋 KOL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(12時間)	静脈注射継続に	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロシテキサン注 (300mg/㎡) (イホマイドの20%相当) イホマイドと同時に 下ルートより		ソルデム3A 500mL 1袋	生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより	休薬完了day14	生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/㎡) 下ルートより Rp.3終了後
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)	静脈注射継続に		持続点滴末梢(120分)
7 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン注 (20mg/㎡) 上ルートより		ラクテック 500mL 1袋	アプレビタント内服		生食 500mL 1袋 KOL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	Day2		生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより
8 薬剤	マンニトールS 300mL 1瓶 ウロシキサン2回目と同時に 上ルートより	休薬完了day7		グラニセドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V メインルートより フィルタナシ		生食 500mL 1袋 KOL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(5時間)
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロシテキサン注 (300mg/㎡) (イホマイドの20%相当) マンニトールと同時に 下ルートより	調製方法 別紙参照		蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製		ソルデム3A 500mL 1袋 KOL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)			静脈注射		持続点滴末梢(5時間)
10 薬剤	ラクテック 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A グラニセドロンと同時に メインルート		カテーテルシリンジ 期限・在庫確認	生食 500mL 1袋 エトポシド注 (100mg/㎡) 上ルートより		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート
手技	持続点滴末梢(3hr)			持続点滴末梢(60分)		day8、15
11 薬剤	グラニセドロン注ハッグ3mg 1袋 Rp.9と同時に 下ルートより			生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより		エトポシドはフィルタナシ!
手技	持続点滴末梢(30分)			静脈注射継続に		生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより
12 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A ウロシテキサンと同時に メインルート					アプレビタント内服
手技	持続点滴末梢(3hr)					生食 50mL 1瓶 ルートキープ用
13 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロシテキサン注 (300mg/㎡) (イホマイドの20%相当) Rp.11と同時に 下ルートより					休薬完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)					
14 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A メインルート					
手技	持続点滴末梢(2hr)					
15 薬剤	休薬完了day21					
手技						

コード ナンバリング	sf019-01	sf020-01	sf021-01	sf022-02	sf023-03	sf024-04	sf025-01	sf026-01	sf027-01
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)
プロトコール 名	FP療法	アドリアシン療法	カンプト	CP+アバステン	アバステン(15mg/kg)	ジェムザール	DC+アバステン	OPT-11(単剤)	AI療法
投与順序	1 薬剤 ラクテック 500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フマモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスミン-75T内服	生食 100mL 1瓶 ベバシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フマモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にベナ5T内服	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カード)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カード)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	day1,2
2 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/m ²) Rp.1投与60分後	生食 100mL 1瓶 ドキシソルビン(80mg/m ²)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(80mg/m ²)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²)	生食 500mL 1袋 ドセタキセル注 (70mg/m ²) 調製時ポンピングが必要	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	ラクテック 500mL 1袋	休薬完了day21	day1～15まで計3コース	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC8) MAX750mg	休薬完了day21	day1～day15の計3回	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC8) MAX750mg	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/m ²)	グラニトロン注キヤ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより
手技	持続点滴末梢(90分)		day22は、休薬満	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ラクテック 500mL 1袋	休薬完了day7		生食 100mL 1瓶 ベバシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはベバシズマブ		生食 100mL 1瓶 ベバシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) Rp.4と同時に下ルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) Rp.4と同時に下ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(90分)		day22は休薬	持続点滴末梢(90分)	day22は休薬	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		休薬完了day21		休薬完了day7	休薬完了day21	休薬完了day28	生食 500mL 1袋 イボマイド (2g/m ²) Rp.3と同時に上ルートより	生食 500mL 1袋 イボマイド (2g/m ²) Rp.3と同時に上ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)							持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)
6 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/m ²) 全量を300mLに		子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはベバシズマブ		子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはベバシズマブ		生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A 全開で							生食 500mL 1袋 ドキシソルビン注(30mg/m ²) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより
手技	持続点滴末梢(5分)							持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
8 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							マンニトール300mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注(400mg/m ²) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)
10 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)
11 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)
12 薬剤		day2～4						ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休薬完了day21
手技								持続点滴末梢(4時間30分)	
13 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/m ²)							9時間開始レジメン ウロチキサン・イボマイドは11時間開始	9時間開始レジメン ウロチキサン・イボマイドは11時間開始
手技	持続点滴末梢(24hr)								
14 薬剤	休薬完了day21			産婦人科は、【AUC=8、Jelliffe式、CRE+0.2補正あり】が基本(25/3/3,類)			産婦人科は、【AUC=8、Jelliffe式、CRE+0.2補正あり】が基本(25/3/3,類)	day1～3アプレビタント内服	
手技									
15 薬剤	アプレビタント内服								
手技									

コード ナンバリング	sf028-01	sf030-01	sf031-01	sf032-01	sf033-01	sf034-01	sf035-01	sf036-01	sf037-01
入院・外来	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	シリンジ	シリンジ	ケモセーフ (メインフィルターなし)
プロトコール 名	パラプラチン・ ジェムザール	ゲムシタピン+アバステン	AI療法(限定)(杉本正子)	EP/EMA療法	FA	MEA療法	5-day メントレキセート	5-day Act-D療法	5-day ETP療法
投与順序	1 薬剤		Rp.1のソルデム1は入院予約 注射(カード)で払い出し リドチキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約 注射(カード)で払い出し リドチキサンは薬剤師が調製			蒸留水は溶解用 2mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の 2.5mLシリンジに調製	蒸留水は溶解用 1.1mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の 2.5mLシリンジに調製	
手技	day1	day1	day1,2,3	day4,5	Day1	day1~5	day1~5	day1~5	day1~5
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 メインルートより フィルターなし	グラニドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	グラニドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	メントレキセート(0.4mg/kg) 蒸留水 20mL 1A 1Vあたり蒸留水2mLで溶 解 ◆シリンジで調製	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	グラニドロン注キオ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	グラニドロン注キオ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 デキサート注(100mg/mf) 上ルートより	生食 500mL 1V フルオロウラシル(150mg/body) 上ルートより	蒸留水 6mL メントレキセート (150mg/body) 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 ◆シリンジで調製	蒸留水20mL 1mA コスメゲン (0.01mg/kg) 下ルートより ◆シリンジで調製
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(8hr)	静脈注射	静脈注射
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン注(15mg/kg) MAX800mg	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 リドチキサン注(300mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 リドチキサン注(300mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5B メインルートより	生食 500mL 1袋 メントレキセート(300mg/mf) 下ルートより	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 500mL 1袋 メントレキセート (300mg/body) 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)	静脈注射	持続点滴末梢(4時間)	持続点滴末梢(5分)
5 薬剤			生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 エトポシド注 (150mg/mf) 上ルートより	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	休薬完了 day14	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	休薬完了 day14
手技	day8	day8,15	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(60分)	静脈注射	静脈注射	静脈注射	
6 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 リドチキサン注(300mg/mf) メインルートより	生食 100mL 1瓶 リドチキサン注(300mg/mf) メインルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(75mg/mf) 生食を500mLに 下ルートより 点滴ハッグは減量	休薬完了 day14		生食 500mL 1袋 ラスデット注(100mg/body) 上ルートより	アプレビタント内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(112時間)			持続点滴末梢(60分)	
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 500mL 1袋 ドキシルビシン注(20mg/mf) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 ラシックス 1A メインルートより				
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			day2~5	
8 薬剤			マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 リドチキサン注(300mg/mf) メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより			グラニドロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1B メインルートより フィルターなし	
手技	day15は、休薬中	day22は、休薬中	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤	休薬完了 day21	休薬完了 day28	生食 100mL 1瓶 リドチキサン注(300mg/mf) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	アプレビタント内服			蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)			静脈注射		
10 薬剤	子宮頸がんはアバステン 肺癌がんはペバシズマブ		ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			生食 500mL 1袋 ラスデット注(100mg/body) 上ルートより		
手技			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)			持続点滴末梢(60分)		
11 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			休薬完了 day14		
手技			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)					
12 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休薬完了 day21			アプレビタント内服		
手技			持続点滴末梢(4時間30分)						
13 薬剤			9時間開始レジメン リドチキサン・イホマイドは11時間 開始	9時間開始レジメン リドチキサン・イホマイドは11時間 開始					
手技									
14 薬剤			day1~3アプレビタント内服						
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sf038-02	sf039-01	sf040-01	sf041-01	sf042-01	sf043-01	sf044-01	sf045-01	sf047-01		
	入院 ・ 外来 37	入院 ・ 外来 38	入院 ・ 外来 39	入院 ・ 外来 40	入院 ・ 外来 41	入院 ・ 外来 42	入院 ・ 外来 43	入院 ・ 外来 44	入院 ・ 外来 45	入院 ・ 外来 46	
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール 名	キイトルーダ(3週毎)	キイトルーダ(6週毎)	DG療法	Bev+ドキシル (BSA1.5㎡未満)	Bev+ドキシル (BSA1.5㎡以上)	Bev+PTX	キイトルーダ+PTX+CBDCA	キイトルーダ+PTX+CBDCA+Bev	weekly TC	リブタヨ(3週毎)	
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body)	/	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可 下ルートより	/	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	/	生食 100mL 1瓶 リブタヨ注 (350mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		day1,15	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2. 5V Rp.2と同時にレスタシコー75T内 服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2. 5V Rp.2と同時にレスタシコー75T内 服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1 と同時にレスタシコー75T内服	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	
3 薬剤	休薬完了 day21	休薬完了 day42	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (900mg/㎡)	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注 (40mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注 (40mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシコー75T内 服	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (175mg/㎡)	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (175mg/㎡)	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/㎡)	休薬完了 day21	
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(60分)		
4 薬剤			/	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.3と同じ速度で	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 RP.3と同じ速度で	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/㎡)	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC6) MAX750mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC6) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC2) MAX300mg		
手技				day8	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	
5 薬剤			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	/	/		休薬完了 day21	生食 100mL 1瓶 アバスチン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	休薬完了 day21		
手技			持続点滴末梢(30分)			day15	day15	day8,22	持続点滴末梢(90分)		
6 薬剤			生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (900mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコー75T内 服	休薬完了 day21				
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)					
7 薬剤			生食 250mL 1袋 ドセタキセル注 (70mg/㎡) 観望液ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/㎡)					
手技			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)					
8 薬剤			休薬完了 day21	初回のみ day1 から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与	初回のみ day1 から ビドキサル錠10mg 6T分3 56日間投与	休薬完了 day28					
手技											
9 薬剤				各クール プレドニゾン錠 (1mg)投与 day1から16T朝昼 4日分、 day5から8T朝昼 1日分、 day6から4T朝 1日分	各クール プレドニゾン錠 (1mg)投与 day1から16T朝昼 4日分、 day5から8T朝昼 1日分、 day6から4T朝 1日分	子宮頸がんはアバスチン 卵巣がんはペバシズマブ					
手技											
10 薬剤				休薬完了 day28	休薬完了 day28						
手技											
11 薬剤				体表面積注意！	体表面積注意！						
手技											
12 薬剤											
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤							産婦人科は、『AUC=6、 Jelliffe式、CRE+0.2補正あり』が基本(25/3/3 錠)	産婦人科は、『AUC=6、 Jelliffe式、CRE+0.2補正あり』が基本(25/3/3 錠)			
手技											
15 薬剤											
手技											