

コード ナンバリング	ge022-05 入院3	ge023-05 入院4	ge024-08 入院5	ge025-08 入院6	ge027-02 入院・外来8	ge028-01 入院・外来9	ge036-01 入院・外来12	ge039-01 入院・外来15	ge040-04 入院・外来16
ルート	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVIは、シール)
プロトコール名	FOLFOX6	FOLFOX6・ アバスタチン	FOLFIRI	FOLFIRI・ アバスタチン	イリノテカン(80mg/㎡)	ジェムザール	アービタックス	CPT-11(単剤)	mFOLFOX6(インフューザー用)
投与順序	1 薬剤 グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 認容性 良→60分→30分へ短縮可	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコー75錠服用		カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.2と同時 下ルートより	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食500mL 1袋 アービタックス(500mg/㎡) 全量を500mLに	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより		day1～day15の計3回	生食 250mL 1袋	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8は休業		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.3と同時 上ルートより	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.3と同時 上ルートより	休業完了 day14		休業完了 day14		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で
手技	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)		day22は休業		day22は休業	側注(5分)
5 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で		休業完了 day7		休業完了 day28	生食 100mL フルオロウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に					持続点滴末梢(46hr)
6 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)		ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル (2400mg/㎡)					
手技	day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)	day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)					day8は、休業週
7 薬剤	休業完了 day14		休業完了 day14						休業完了 day14
手技		day8は、休業週		day8は、休業週					
8 薬剤		休業完了 day14		休業完了 day14					
手技									
9 薬剤									
手技									
10 薬剤									
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge48-01 入院 ・ 外来 17	ge053-01 入院 ・ 外来 18	ge054-01 入院 ・ 外来 19	ge065-01 入院 ・ 外来 21	ge066-01 入院 ・ 外来 22	ge067-01 入院 ・ 外来 23	ge068-01 入院 ・ 外来 24	ge099-01 入院 ・ 外来 25
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	アバスチン(7.5mg/kg)・セロー ダ	ネダブラテン	5-FU(500mg/m ²)・LV(RPMI)	イリノテカン(150mg/m ²)	SOX/XELOX・アバスチン	SOX/XELOX	アバスチン(5mg/kg)・TS-1/ロ ンサー	DOC+GEM (限定)
投与順 序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短 縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮 可	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (100mg/m ²)	ソルデム3A 500mL 1袋 レボネリナートNa注 (250mg/m ²) 下ルート 開始60分後よりRp.3投与	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了 day21	ラクテック500mL 1袋	生食 50mL 1袋 フルオロウシラ(500mg/m ²) 上ルート Rp.2開始60分後より 全開で	3回投与後、3週間休薬、day49 で1クール (2回投与後、3週間休薬、day35 で1クールの場合もあり)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服	休薬完了 day14	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m ²)
手技		持続点滴末梢(90分)	静脈注射確徐に	day8は休薬	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	day1から2週間ゼローダ内服	ラクテック500mL 1袋	day1～36まで計6コース	休薬完了 day14	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		TS-1 day1～42までで1コース day1から4週間投与	
手技		持続点滴末梢(90分)	day43.50は休薬			day8.15は、休薬週		day8
5 薬剤		休薬完了 day28	休薬完了 day7			休薬完了 day21	ロンサーフ(35mg/m ²) day1～28までで1コース day1-5 day8-12	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技					day8.15は、休薬週			持続点滴末梢(30分)
6 薬剤					休薬完了 day21			5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/m ²) 調製時ボンピング必要
手技								持続点滴末梢(60分)
7 薬剤								生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m ²)
手技								持続点滴末梢(30分)
8 薬剤								休薬完了 day21
手技								
9 薬剤								
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge104-01	ge105-01	ge106-01	ge107-01	ge108-01	ge109-01, ge110-01	ge111-01	ge112-01
	入院 ・ 外来 26	入院 ・ 外来 27	入院 ・ 外来 28	入院 ・ 外来 29	入院 ・ 外来 30	入院 ・ 外来 31	入院 ・ 外来 32	入院 ・ 外来 33
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	CPT-11+ヘパティックス	ジェムザール+アブラキサン	FOLFIRINOX	IRIS+ペクティビックス	SOX (100mg/㎡)	XELOX+ハーセプチン(初回) XELOX+ハーセプチン	アバスチン+IRIS	SOX+アービタックス(初回)
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 初回は、 2回目以降は、6mg/kg	生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ (7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ペクティビックス (6mg/kg) 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (100mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシン→75錠服用
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 メインルート	生食100mL (25mL/㎡) アブラキサン注 (125mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) レボホリナート開始30分後からイリノテカン投与 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ペクティビックス (6mg/kg) 上ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡)	生食500mL 1袋 アービタックス (400mg/㎡) 全量を500mLに
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡) 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) レボホリナート開始30分後から投与 上ルートより	生食 250mL 1袋 メインルート		day1から2週間ゼローダ内服	day1から2週間TS-1内服	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8,15は、休薬週			持続点滴末梢(60分)
5 薬剤	休薬完了 day14		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (100mg/㎡) 上ルートより	休薬完了 day21		休薬完了 day21	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/㎡)
手技		day22は、休薬週	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(120分)
6 薬剤		休薬完了 day28	生食 100mL (入院ではシルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	day1から2週間TS-1内服		休薬完了 day21		
手技			持続点滴末梢(46hr)	day8,22は、休薬週				day8,15
7 薬剤				休薬完了 day28	※ 1段階減量 75mg/㎡			生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシン→75錠服用
手技			day8は、休薬週					持続点滴末梢(30分)
8 薬剤			休薬完了 day14					生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに
手技								持続点滴末梢(60分)
9 薬剤								生食 250mL 1袋
手技								持続点滴末梢(60分)
10 薬剤								day1から2週間ゼローダ内服
手技								
11 薬剤								休薬完了 day21
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge113-01 入院 ・ 外来 34	ge114-01 入院 ・ 外来 35	ge115-01 外来 36	ge118-01 入院 ・ 外来 38	ge120-01 入院 ・ 外来 39	ge121-01 入院 ・ 外来 40	ge122-01 入院 ・ 外来 41	ge123-01 入院 ・ 外来 42
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名	SOX+アービタックス	ヨンデリス	FOLFIRI+サイラムザ	5-FU肝動注(Weekly)	オブジーボ(2週毎)	FOLFIRI+ザルトラップ (インフューザー用)	XELIRI+アバスチン療法	アブラキサン+サイラムザ
投与順序	1 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 2.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンウ75錠服用	生食20mL 5mL フルオロウテシル(1000mg/㎡) シュア7-フェューザ-A:SFS-0504HR(P)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘハシズマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可	
手技	day1	中心静脈(30分)	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1.15
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンウ75錠服用	生食100mL 1瓶	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	休薬完了day7	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし Rp.1と同時にレスタミンウ75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	中心静脈(30分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに	生食 500mL 1袋 ヨンデリス (1.2mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 全開で	ベッド予約無い場合は放射線Ri 室で穿孔予定	休薬完了day14	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (200mg/㎡)	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 下ルートより 認容性 良 60分→30分へ短縮可
手技	持続点滴末梢(60分)	中心静脈(24時間)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	
4 薬剤	生食 250mL 1袋	休薬完了day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	day1から2週間ゼローダ内服 (800mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)		生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより			生食 50mL 1瓶 フルオロウテシル(400mg/㎡) 全開で	休薬完了day21	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)			静脈注射緩徐に		持続点滴末梢(30分)
6 薬剤			生食50mL 1瓶 フルオロウテシル(400mg/㎡) 全開で			生食 100mL フルオロウテシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節		
手技	day8.15		静脈注射緩徐に			持続点滴末梢(46hr)		day8
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンウ75錠服用		生食 100mL フルオロウテシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節					カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(46hr)			day8は、休薬週		持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/㎡) 全量を250mLに					休薬完了day14		生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 day22は、休薬週
手技	持続点滴末梢(60分)		day8は、休薬週					
9 薬剤	生食 250mL 1袋		休薬完了day14					休薬完了day28
手技	持続点滴末梢(60分)							
10 薬剤	day1から2週間TS-1内服							
手技								
11 薬剤	休薬完了day21							
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge124-01 入院 ・ 外来 43	ge125-01 入院 ・ 外来 44	ge127-01 入院 ・ 外来 45	ge128-01,ge129-01 入院 ・ 外来 46	ge130-01,ge131-01 入院 ・ 外来 47	ge135-01 入院 ・ 外来 48	ge137-01 入院 ・ 外来 49	ge141-01 入院 ・ 外来 50
ルート	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ポンプ	ポンプ
プロトコール名	FOLFOXIRI	FOLFOXIRI+Bev	アバステン+イリノテカン	Her+S-1+CDDP療法	SOX+ハーセプチン	オブジーボ(4週毎)	アバステン+5-FU肝動注(限定)	ガルトラップ+IRI+5-FU肝動注(限定)
投与順序	1 薬剤 アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	トラスツマブは2回目以降 8mg/kg(30分)	生食 250mL 1袋 トラスツマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、8mg/kg	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分 へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1 持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (185mg/mf) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、8mg/kg 投与中に経口補水液1L摂取 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食20mL 5mL フルオウラシル(1000mg/mf) Rp.1と同時 シュア-フューザ-A:SFS-0504HR(P)	生食20mL 5mL フルオウラシル(1000mg/mf) Rp.1と同時 シュア-フューザ-A:SFS-0504HR(P)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	動脈注射(5時間)	動脈注射(5時間)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (185mg/mf) 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/mf)	休薬完了day28	休薬完了day7	生食 250mL 1袋 ガルトラップ (4mg/kg) Rp.1終了後
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	休薬完了day14	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq メインルート	day1から2週間TS-1内服		5-FUのみレジメン(放射2)と 交互に	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.3終了後
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)				
5 薬剤	生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオウラシル(3200mg/mf) 全量230mL 生食で調節 インフューザーポンプLV5	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		マニットール 200mL メインルート			インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!	
手技	持続点滴末梢(48hr)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週			
6 薬剤		生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオウラシル(3200mg/mf) 全量230mL 生食で調節 インフューザーポンプLV5		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	休薬完了day21			生食20mL 5mL フルオウラシル(1000mg/mf) Rp.1と同時 シュア-フューザ-A:SFS-0504HR(P)
手技	day8は、休薬週	持続点滴末梢(48hr)		持続点滴末梢(120分)				動脈注射(5時間)
7 薬剤	休薬完了day14			生食 500mL 1袋 メインルート				休薬完了day14
手技		day8は、休薬週		持続点滴末梢(60分)				
8 薬剤	使用するインフューザーポンプ は「LV5」	休薬完了day14		休薬完了day21				インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!
手技								
9 薬剤		使用するインフューザーポンプ は「LV5」		day1から2週間TS-1内服				
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge142-01 51	ge143-01 52	ge152-01 53	ge157-01 54	ge161-01 55	ge162-01 56	ge163-01 57
入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来
ルート	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ
プロトコール名	mFOLFOXIRI	mFOLFOXIRI+Bev	オブジーボ+SOX (100mg/㎡)	オブジーボ+mFOLFOX6 (インフューザー用)	XELOX+Pmab療法	mFOLFIRINOX	キイトルーダ+XELOX (130mg/㎡)
投与順序	1 薬剤 アロキシ注バグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	アロキシ注バグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (360mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (240mg/body)	カイトリル注バグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ (200mg/body)
手技	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	アロキシ注バグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) 上ルートより	カイトリル注バグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (100mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) レボホリナート開始30分後からイリノテカン投与 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/㎡)
手技	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (120分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/㎡)	生食 250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) レボホリナート開始30分後から投与 上ルートより	day1から2週間ゼローダ内服
手技	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (120分)		持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (90分)	
5 薬剤	生食 100mL (入院ではリデム3A500mLもあり) フルオウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/㎡) 全開で	day1から2週間ゼローダ内服	生食 100mL (入院ではリデム3A500mLもあり) フルオウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	
手技	持続点滴末梢 (46hr)	持続点滴末梢 (120分)	day8.15は、休業週	静脈注射緩徐に		持続点滴末梢 (46hr)	day8.15は、休業週
6 薬剤		生食 100mL (入院ではリデム3A500mLもあり) フルオウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	休業完了 day21	生食 100mL フルオウラシル (2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節			休業完了 day21
手技	day8は、休業週	持続点滴末梢 (46hr)		持続点滴末梢 (46hr)	day8.15は、休業週	day8は、休業週	
7 薬剤	休業完了 day14			休業完了 day14	休業完了 day21	休業完了 day14	
手技		day8は、休業週					
8 薬剤		休業完了 day14					
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	sk001-01		sk002-01		sk003-07		sk004-01		sk005-01		sk006-01		sk007-01		sk008-08.ge024	
	入院・外来		入院・外来		入院		入院・外来		入院		入院		入院・外来		入院	
	ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ(LVIは、シール)	
プロトコール 名	ジェムザール		TS-1・CPT-11		TS-1・CDDP day8(60mg/ m)		TS-1・CDDP weekly(20mg/ m)		FP(700-70)		FP (low dose)		CDDP腹腔・5-FU		FOLFIRI	
投与順序	1 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	★TS-1 day1から3週間投 与		★TS-1 day1の7日前より 3週間投与		★TS-1 day1から3週間投 与		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		5%ブドウ糖250mL 1袋 フルオロラシル(500mg/body) Rp.2と同時 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL		グラニセロ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	
	手技	持続点滴末梢(30分)	day1,15		day1		day1		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)	
	2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋		生食 500mL 1袋 フルオロラシル(700mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル(200mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより		生食 20mL 2A シスプラチン(MAX 20mg/body) Rp.1と同時		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.3と同時 下ルートより	
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(100分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(24hr)		確投投与(volume)		持続点滴末梢(120分)	
	3 薬剤	day1～day15の計3回	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)		ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1投与60分後		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		休薬完了 day7		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/mf) Rp.2と同時 上ルートより	
	手技		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(100分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)				持続点滴末梢(120分)	
	4 薬剤				ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/mf)		ラクテック500mL 1袋 メインルート		グラニセロ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート		シスプラチンはシリンジ3本に 分ける 生食とシスプラチン1:1で調製		生食50mL 1瓶 フルオロラシル(400mg/mf) 全開で	
	手技	day22は休薬	day8,22,29は休薬		持続点滴末梢(100分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)				静脈注射緩徐に	
	5 薬剤	休薬完了 day7	休薬完了 day35		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V Rp.3投与開始70分後より		ラクテック500mL 1袋		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート		生食 500mL 1袋 シスプラチン(4mg/mf) Rp.4終了後 上ルートより		生食とシスプラチンそれぞれ吸 い、3方活栓使用して1本にま とめる		ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(2400mg/mf)	
	手技				持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)				持続点滴末梢(46hr)	
	6 薬剤				生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		休薬完了 day7		生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		①30mL (生食・シスプラチン 15mLず つ) (50mLシリンジ)		休薬完了 day14	
	手技				持続点滴末梢(120分)				持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(6分)					
	7 薬剤				生食 20mL 1A ラシックス注20mg 1A 下ルートより		3投2休が標準 (day1,8,15 5weekごと)		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		ラクテック500mL 1袋 メインルート		②30mL (生食・シスプラチン 15mLず つ) (50mLシリンジ)			
	手技				静脈注射				持続点滴末梢(6分)		持続点滴末梢(90分)					
	8 薬剤				ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより				ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		③20mL (生食・シスプラチン 10mLず つ) (30mLシリンジ)			
	手技				持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)					
	9 薬剤				ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより				ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート					
	手技				持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)					
	10 薬剤				ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより				ラクテック500mL 1袋 メインルート		グラニセロ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート					
	手技				持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)					
	11 薬剤				ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより				ラクテック500mL 1袋 メインルート							
	手技				持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(60分)		day2～5					
	12 薬剤										生食 500mL 1袋 フルオロラシル(200mg/mf) 下ルートより					
	手技		day8,15,22は休薬						day2～5		持続点滴末梢(24hr)					
	13 薬剤				休薬完了 day7				生食 500mL 1袋 フルオロラシル(700mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (4mg/mf) 上ルートより					
	手技								持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(120分)					
	14 薬剤								休薬完了 day21		休薬完了 day7					
	手技															
	15 薬剤															
	手技															
施行日数		1	21		21		7		5		5		1		1	

コード ナンバリング	sk009-05	sk011-01	sk012-01	sk013-04	sk016-01	sk017-01	sk020-01	sk021-01	sk022-01	sk025-08
	入院 9	入院・外来 11	入院・外来 12	入院・外来 13	入院・外来 14	入院 15	入院・外来 17	入院・外来 18	入院・外来 19	入院 21
プロトコール 名	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)
	FOLFOLX4・ アバステン	タキソール weekly	タキソール weekly	MTX・5-FU	GDDP・5-FU肝動注	FP(400-40)	アービタックス ・イリノテカン/weekly	アービタックス・イリノテカン Biweekly (初回)	アービタックス・イリノテカン Biweekly	FOLFIRI・アービタックス
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ブアモチジン注20mg 1A デキサル注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V メインルート	生食 100mL 1瓶 シスプラチン(10mg~20mg/body) 全量100mLに 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL	ラクテック500mL 1袋 メインルート	アービタックスは2回目以降 250mg/mf(60分) 全量250mL			
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(15分)	持続点滴末梢(90分)	day1.15	day1.15.29	day1.15.29	day1
2 薬剤	グラネトロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサル注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/mf) Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (25mg/mf) 始め10分は速度半分 調製時ポンピング必要	生食100mL 1瓶 ダイアモックス 0.5V メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロラシル(500~1000mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(400mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用 Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	グラネトロン注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	動注(3hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(100mg/mf) Rp.4と同時 下ルートより	休薬完了 day7	休薬完了 day7	生食100mL 1瓶 メトレキセート(100mg/mf) Rp.4と同時 下ルートより	休薬完了 day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食500mL 1袋 アービタックス(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/mf) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/mf) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(500mg/mf) 全量を500mLに
手技	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキザリジン注(95mg/mf) Rp.3と同時 上ルートより	3投1休が標準 (day1.8.15 4weekごと)		5%ブドウ糖500mL 1B メイロン注20mL 2A Rp.3と同時 メインルート		アロキシ注ハッグ 1袋 デキサル注6.6mg 1.5V メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロラシル(400mg/mf) 全開で			生食100mL 1瓶 フルオロラシル(600mg/mf) 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン(40mg/mf) 全量を500mLに Rp.4終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより
手技	静脈注射継続に(15分)			持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf)			内服 ロイコボリン錠5mg 12T分4 6時間毎 Rp.3投与24時間後より計6回		生食 50mL 1瓶 ラクテックス注20mg 1A メインルート 全開で				生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(22hr)			day1の内服		持続点滴末梢(5分)	day6.22	day6.22.36.43	day6.22.36.43	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤				内服 ロイコボリン錠5mg 6T分2 6時間毎		ラクテック500mL 1袋 メインルート	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/mf) 全開で
手技	day2			day2の内服		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	静脈注射継続に
8 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサル注6.6mg 1V			休薬完了 day7		ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(2400mg/mf)
手技	持続点滴末梢(30分)					持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(46hr)
9 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (100mg/mf)					ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	休薬完了 day14
手技	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(60分)	day29	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
10 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロラシル(400mg/mf) 全開で					生食 100mL 1瓶 デキサル注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用		休薬完了 day49	休薬完了 day49	
手技	静脈注射継続に(15分)					day2~5	持続点滴末梢(30分)			
11 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf)					生食 500mL 1袋 フルオロラシル(400mg/mf) 下ルートより	生食500mL 1袋 アービタックス(600mg/mf) 全量を500mLに			
手技	持続点滴末梢(22hr)					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)			
12 薬剤	休薬完了 day14					計5コース	生食 250mL 1袋			
手技							持続点滴末梢(60分)			
13 薬剤						休薬完了 day7	休薬完了 day42			
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										
施行日数	2	1	1		1	5	6	7	7	2

コード ナンバリング	sk026-01		sk027-01		sk028-05		sk029-01		sk030-01		sk031-04		sk032-04		sk034-04		sk036-02		sk038-02		sk039-01	
	22		23		24		25		26		27		28		30		32		34		35	
	入院 ・ 外来		入院		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院		入院 ・ 外来	
プロトコール 名	ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ(LVIは、シール)		ケモセーフ	
	レミケード		5-FU肝動注(連日)		アバステン・mFOLFOX6 (インフューザー用)		SOX/XELOX・アバステン		SOX/XELOX		FOLFIRI(インフューザー用)		FOLFIRI・ アバステン(インフューザー用)		FOLFIRI・アービタックス (インフューザー用)		mFOLFOX6・アービタックス(イン フューザー用)		mFOLFOX6・アービタックス		ベクティビックス	
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V			生食 100mL 1瓶 ベハシズマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ベハシズマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技		持続点滴末梢(30分)	day1-5は、休薬週		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤		生食250mL 1袋 イリノテカン(5mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロラシル(500mg/body)		カイトリル注ハッパ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッパ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)
手技		持続点滴末梢	持続点滴末梢(5時間)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤		生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	休薬完了day14		5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.4と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)
手技		持続点滴末梢	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤					5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.3と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.3と同時 上ルートより	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服	day1から2週間TS-1またはゼ ロ-ダ内服
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤					生食 50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/㎡) 全開で	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21
手技			静脈注射緩徐に		day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週
6 薬剤					生食 100mL フルオロラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調剤	生食 100mL フルオロラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調剤	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21
手技			持続点滴末梢(46hr)		day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週
7 薬剤							休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14
手技			day8は、休薬週																			
8 薬剤					休薬完了day14	休薬完了day14							休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14
手技																						
9 薬剤																						
手技																						
10 薬剤																						
手技																						
11 薬剤																						
手技																						
12 薬剤																						
手技																						
13 薬剤																						
手技																						
14 薬剤																						
手技																						
15 薬剤																						
手技																						
施行日数			1		10		1		14		14		1		1		2		2		2	

コード ナンバリング	sk040-02		sk041-02		sk042-02		sk043-02		sk044-01,sk045-01		sk046-01		sk047-01		sk049-01		sk050-01		sk051-01	
	入院 36	入院・ 外来 37	入院 38	入院・ 外来 39	入院・ 外来 40	入院・ 外来 42	入院 43		入院 44		入院・ 外来 45		入院・ 外来 46							
プロトコール 名	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)							
	FOLFIRI・ヘクティビックス	FOLFIRI・ヘクティビックス (インフューザー用)	mFOLFOX6・ヘクティビックス	mFOLFOX6・ヘクティビックス (インフューザー用)	ハーセプチン・XP	TS-1・タキソテール	DCF		ODDP・CPT-11(Biweekly)		タキソテール		シスプラチン・ラステット							
投与順序	1 薬剤	グラニセロ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	グラニセロ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	トラスツマブは2回目以降 6mg/kg(30分)		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			グラニセロ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取							
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1		持続点滴末梢(30分)	day1		day2・3		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V フマモジシ注20mg 1V		5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/㎡) 調製時ボンピング必要	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/㎡)	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/㎡)								
	手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)							
3 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.3と同時に 下ルートより		day8,15は、休薬週		生食 500mL 1袋 フルオロウシラ(800mg/㎡) Rp.1と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ(800mg/㎡) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq								
	手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(60分)								
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボボリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボボリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボボリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボボリナート (200mg/㎡) Rp.5と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、 6mg/kg Rp.2と同時に、上ルートより		休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(30mg/㎡) 全量を500mL	休薬完了 day21	マンニトールS300mL 200mL								
	手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)								
5 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) Rp.4と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 Rp.5と同時に 下ルートより		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより		ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 ラシックス注20mg 1A	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎡) 全量を500mL 下ルートより									
	手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)								
6 薬剤	生食 50mL 1瓶 フルオロウシラ (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウシラ (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウシラ (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウシラ (400mg/㎡) 全開で	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎡) Rp.4と同時に 全量を500mLに 上ルートより		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/㎡) Rp.4終了後 上ルートより 調製時ボンピング必要		ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋									
	手技	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)								
7 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウシラ(2400mg/㎡)	生食 100mL フルオロウシラ(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウシラ(2400mg/㎡)	生食 100mL フルオロウシラ(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	ソルデム3A500mL 1袋		生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより		day4・5		day2・3									
	手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	day4・5		day2・3									
8 薬剤	休薬完了 day14	休薬完了 day14	休薬完了 day14	休薬完了 day14	生食 500mL 1袋		ラクテック500mL 1袋 シスプラチン終了後 メインルートより		生食 500mL 1袋 フルオロウシラ(800mg/㎡) 下ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし										
	手技				持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)										
9 薬剤					マンニトール300mL 1瓶		ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/㎡)										
	手技				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)										
10 薬剤					生食 50mL 1瓶 ラシックス20mg 1A		マンニトール300mL 1瓶 メインルートより		day15		day8,15は、休薬週									
	手技				持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(60分)	day15		day8,15は、休薬週										
11 薬剤					day2~4		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		持続点滴末梢(30分)		休薬完了 day21									
	手技				day2~4		day2~4		持続点滴末梢(30分)		day2~4									
12 薬剤					生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/㎡) 調製時ボンピング必要		持続点滴末梢(60分)		アプレピタント内服									
	手技				持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)		アプレピタント内服									
13 薬剤					ソルデム1 500mL 1袋		休薬完了 day28		day28		day28									
	手技				持続点滴末梢(90分)		day28		day28		day28									
14 薬剤					生食 500mL 1袋		day28		day28		day28									
	手技				持続点滴末梢(120分)		day28		day28		day28									
15 薬剤					休薬完了 day21		day21		day21		day21									
	手技				day21		day21		day21		day21									
施行日数	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

コード ナンバリング		sk052-01		sk053-01		sk055-01		sk056-01		sk057-01		sk058-01		sk059-01		sk060-01		sk061-01		sk062-01,sk063-01	
		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56	
		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院		入院		入院		入院 ・ 外来		入院		入院 ・ 外来	
プロトコール 名		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ	
		GEM+CDDP		TS-1・CPT-11(術前CRT)		タキソール+サイラムザ		サイラムザ(単剤)		FP(700-70)-RT		術前FP(800-80)		FP(800-80)		CDDP+5-FU肝動注		NDP+5-FU+RT		ハーセプチン・XP(ショット・ハイドレーション)	
投与順序	1 薬剤			★TS-1 day1～day5 day8～day12 day22～day28 day29～day33				生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) Rp.1と同時にレスタミン-75錠内服 認容性 良 60分～30分へ短縮可				ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		投与速度注意！ 入院と外来で速度が違う		ラクテック500mL 1袋 メインルート		トラスツマブは2回目以降 8mg/kg(30分)	
	手技			day1, 8	day1, 8, 22, 29			day1, 15	持続点滴末梢(60分)			day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1～5	持続点滴末梢(90分)	day1				
2 薬剤	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.2と同時に	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミン-75錠内服		生食 50mL 1瓶 全開で		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 キサート注6.6mg 1.5V メインルート 投与中に水分1L摂取		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより		生食 100mL 1瓶 シスプラチン (10mg～20mg/body) 全量100mLに メインはフラッシュ用生食50mL 経口補水液(OSJ)1L/Day摂取		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V ファモチジン注20mg 1V 投与中に経口補水液 (OSJ)1L摂取			
	手技	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	day1～5	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)						
3 薬剤	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)		生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分～30分へ短縮可				生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		5%ブドウ糖(500mL 1袋 フルオロラシル(250～500mg/body)		ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食 250mL 1袋 トラスツマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、8mg/kg 上ルートより			
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8は、休薬			持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	動注(外来:3hr, 入院:5hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)								
4 薬剤	生食 250mL 1袋 シスプラチン (25mg/mf) Rp.2終了後 下ルートより			生食 50mL 1瓶 全開で		休薬完了 day14		ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		休薬完了 day7		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq			
	手技			持続点滴末梢(60分)	day15は休薬	持続点滴末梢	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)								
5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/mf) Rp.3終了後 下ルートより	休薬完了 day35		生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/mf)		マンニトール 200mL メインルート		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート		デ アプレビタント内服		アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート		マンニトール 200mL					
	手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)										
6 薬剤	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp.4終了後 下ルートより			生食 500mL 1袋 フルオロラシル (700mg/mf) Rp.6と同時 下ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに Rp.5終了後 下ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより					
	手技			持続点滴末梢(10分)	day8	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)											
7 薬剤			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミン-75錠内服		生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/mf) 全量を500mLに Rp.5と同時 上ルートより		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		生食 250mL 1袋						
			手技	day15は休薬	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)									
8 薬剤	休薬完了 day21	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/mf)		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		休薬完了 day21							
	手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)											
9 薬剤			休薬完了 day28				ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート				
			手技	day2～4			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)									
10 薬剤			生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート				
			手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)									
11 薬剤			生食 500mL 1袋 フルオロラシル (700mg/mf) 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		day2～5				
			手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)										
12 薬剤			休薬完了 day28				生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより				
			手技	day2～5			day2～5	day2～5	day2～5	day2～5	day2～5	day2～5	day2～5								
13 薬剤			生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		休薬完了 day28				
			手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			
14 薬剤			生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf) 下ルートより				
			手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)		
15 薬剤			休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		休薬完了 day21		
			手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	
旅行日数		2		20																	

コード ナンバリング	sk064-01		sk065-01		sk066-01		sk067-01		sk068-01		sk069-01		sk070-01		sk071-01		
	入院 ・ 外来 57		入院 ・ 外来 58		入院 59		入院 ・ 外来 60		入院 ・ 外来 61		入院 ・ 外来 62		入院 ・ 外来 63		入院 ・ 外来 64		
	ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)		
プロトコール 名	パブラプラチン・ Monthlyタキソール		5-FU+MMC+RT		術前DCF療法		GCS		ザノサー単剤Daily		ザノサー単剤Weekly		ザノサー+5-FU		パブラプラチン・ ラストテ		
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1 瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシニコ-75錠服用					デカトロン8mg/日内服 (Day2~4)				生食 500mL 1 袋				カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし		
手技	持続点滴末梢(30分)		day1		day1		day2~3		day1		day1~5		持続点滴末梢(90分)		day1~5		持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルートより		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより		アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取		生食 500mL 1 袋		グラニセト注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		生食 500mL 1 袋		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/㎡)		
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)		
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡)	グラニセト注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/㎡) Rp.1と同時に 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/㎡) 下ルートより		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)		グラニセト注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		生食 100mL 1瓶 ザノサー(1000mg/㎡)		グラニセト注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより		
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 500mL 1瓶 マイトマイシン(10mg/㎡) 上ルートより	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルートより		ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/㎡)		生食 250mL 1袋		生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡)				
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)		day23
5 薬剤			生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食 50mL 1瓶 メインルートより 全開で		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより		マンニトールS 200mL		生食 250mL 1袋		休薬完了 day7		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし		
手技	day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		
6 薬剤	休薬完了 day21			アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン(25mg/㎡)		休薬完了 day42				生食 250mL 1袋		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/㎡)	
手技			day2~4		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)		
7 薬剤	カルボプラチンはAUC5に減量 されていても問い合わせ不要		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/㎡) Rp.5終了後 上ルートより 調製時ボンピング必要				ソルデム3A500mL 1袋				休薬完了 day42				
手技			持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)		day4~5		持続点滴末梢(60分)						day8,15は、休薬週		
8 薬剤		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/㎡) 下ルートより		休薬完了 day14								休薬完了 day21		
手技			持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(24hr)										
9 薬剤		休薬完了 day28	ラクテック500mL 1袋 シスプラチン終了後 メインルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルートより		day1から1週間 TS-1(80mg/㎡)内服										
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)												
10 薬剤		通常2クールで終了	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより		休薬完了 day21												
手技			持続点滴末梢(120分)														
11 薬剤			マンニトール300mL 1瓶 メインルートより														
手技			持続点滴末梢(60分)														
12 薬剤																	
手技																	
13 薬剤																	
手技																	
14 薬剤																	
手技																	
15 薬剤																	
手技																	
施行日数					5												

コード		sk072-01	sk073-01	sk074-01	sk075-01	sk076-01	sk077-01、sk078-01	sk079-01	sk080-01	sk081-01
ナンバリング		65	66	67	68	69	70, 71	72	73	74
		入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
		ポンプ・シリンジ	ポンプ・シリンジ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名		LFP変法(限定3)	LFP動注療法	FL+naI-IRI療法	テセントリク・アバステン	エンハーツ	ハーセプチン 3weeks	シスプラチン・ カンボト	テセントリク・パラプラチン・ラ ステット療法	イミフィンジ・パラプラチン・ラ ステット療法
投与順序	1 薬剤	インフューザーポンプ SFS-1005D(P) 慎重注意！	インフューザーポンプ SFS-1005D(P) 慎重注意！	オニバイドは入院時バッグを 遮光する 外来では遮光不要	生食 100mL 1瓶 テセントリク注 (1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、 6mg/kg	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 テセントリク注 (1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body) (1500mg/body) 下ルートより
手技		day1	day1		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
	2 薬剤	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(1250mg/body) 全量60mL 生食で調節	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし
手技		動注(120時間)	動注(5日間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
	3 薬剤	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	5%ブドウ糖500mL 1袋 オニバイド(70mg/mf) 入院時遮光	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶 エンハーツ注(6.4mg/kg) 注射用水100mL 1瓶 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 減量必要	/	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技		動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
	4 薬剤	/	/	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) 下ルートより	休薬完了day21	5%ブドウ糖100mL 1瓶	休薬完了day21	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)
手技		day3	day2~5	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
	5 薬剤	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調節		休薬完了day21		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mL	/	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX900mg 下ルートより
手技		動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(46hr)				持続点滴末梢(120分)	day23	持続点滴末梢(120分)
	6 薬剤	休薬完了day7	/	/	エンハーツ調製後は点滴 バッグを遮光する			ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	/
手技			day8,15,22	day8は、休薬週				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day23
	7 薬剤	/	生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	休薬完了day14		調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝 えること		/	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技			動注(5日間)					day8,15	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
	8 薬剤	/	シスプラチン(5mg/body)			全量125mL以上のときは1.5% ブドウ糖添付く②速度再計算 必要		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	/	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)
手技			動注(30分)					持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(120分)
	9 薬剤	/	/					生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	休薬完了day21	
手技		day10,17,24						持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休薬週
	10 薬剤	/	シスプラチン(5mg/body)					/		休薬完了day21
手技			動注(30分)					day22は、休薬週		
	11 薬剤	/	休薬完了day28					休薬完了day28		

コード ナンバリング	sk083-01	sk084-02	sk085-01	sk086-01	sk087-01	sk088-01	sk089-01	sk090-01
	入院 ・ 外来 76	入院 ・ 外来 77	入院 ・ 外来 78	入院 ・ 外来 79	入院 80	入院 ・ 外来 81	入院 ・ 外来 82	入院 83
	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(下ルート)
プロトコール 名	カルセド	タキソール weekly(100mg/㎡)	オブジーボ+ヤーボイ (肺小細胞・食道)	イミフィンジ肺維持小細胞・肝	イミフィンジ+GC	イミフィンジ+イジユド (肝細胞がん)	FOLFOX6 (CRT) (シユアーフユザー用)	キイトルダ+FP療法(食道がん)
投与順序	1 薬剤	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注ハッグ 3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にシタミンコウ5錠 服用	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)		生食 100mL 1瓶 イジユド注(300mg/body)	カイトリル注ハッグ 3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(60分)	day1	day8	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(100mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(300mg/body)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注 (1500mg/body)	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.2と同時に	生食 100mL 1瓶	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリサート (200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 カルセド (40mg/㎡) 全開で Rp.1終了後	休薬完了day7	生食 100mL 1瓶	休薬完了day28	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.3と同時に	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 250mL 1袋 イミフィンジ注 (1500mg/body)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサワラシ注 (85mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(約10分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	day1～3	通1回投与を8回施行し、2週間休薬を1コースとし、反復	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて観察		アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.2と同時に	生食 250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) 下ルートより Rp.2終了後	生食 50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技			持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	静脈注射緩徐に 持続点滴末梢(5分)
5 薬剤	休薬完了day21		生食 50mL 1瓶		生食 250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) Rp3終了後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) Rp3終了後 下ルートより	生食 100mL 1袋 フルオロラシル(1600mg/㎡) Rp3終了後 全量100mL 生食で調節	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより
手技			持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(60分)
6 薬剤					生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) Rp4終了後 下ルートより	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp4終了後 下ルートより	休薬完了day14	マンニトール メインルート 200mL
手技			day22		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)		持続点滴末梢(30分)
7 薬剤			生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(300mg/body)		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp5終了後 下ルートより			生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより
手技			持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(10分)	day15は休薬		持続点滴末梢(60分)
8 薬剤			生食 50mL 1瓶			休薬完了day21		生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより
手技			持続点滴末梢(5分)		day15は休薬			持続点滴末梢(60分)
9 薬剤			休薬完了day42					生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/㎡) 下ルートより
手技								持続点滴末梢(24hr)
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
施行日数					1			

コード ナンバリング	sk091-01		sk092-01		sk093-01		sk094-01		sk095-01		sk096-01		sk097-01	
	入院		入院		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来		入院 ・ 外来	
	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ	
	オプジーボ(2週毎)+FP療法		オプジーボ(4週毎)+FP療法		キイトルーダ+GC[8コースまで]		ビロイ+CapeOX【初回】		ビロイ+CapeOX【2回目～】		ビロイ+mFOLFOLX6【初回】		ビロイ+mFOLFOLX6【2回目～】	
投与順序	1 薬剤													
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
2 薬剤	生食100mL 1袋 オプジーボ(240mg/body) 上ルートより		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食100mL 1袋 オプジーボ(480mg/body) 上ルートより		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		生食1000mL 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート Rp.2と同時に		生食1000mL 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート Rp.1と同時にレキスチン75錠内服		生食500mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート Rp.1と同時にレキスチン75錠内服	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
3 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 縫口補水液(OSI)1L/Day摂取		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 縫口補水液(OSI)1L/Day摂取		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食1000mL 1袋 メインルート Rp.3と同時に		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に		生食1000mL 1袋 注射用水100mL(溶解用) ビロイ(800mg/㎡) ※点滴速度等、下記注意あり	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
4 薬剤	生食50mL 1瓶 メインルート 全開で		生食50mL 1瓶 メインルート 全開で		生食50mL 1瓶 メインルート 全開で		生食250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) 下ルートより Rp.2と同時に		生食250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) 下ルートより Rp.2と同時に		5%ブドウ糖250mL オキサリプラチン注(130mg/㎡) Rp.4と同時に		5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時に	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
5 薬剤	生食500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより		生食100mL 1瓶 オプジーボ注(240mg/body)		生食500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより		生食250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/㎡) Rp3終了後 下ルートより		生食100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) Rp3終了後 下ルートより				生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
6 薬剤	マンニトール 200mL メインルート		生食50mL 1瓶 メインルート 全開で		マンニトール 200mL メインルート		生食100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) Rp4終了後 下ルートより		生食50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp4終了後 下ルートより				生食100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調製	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
7 薬剤	生食500mL 1袋 シスプラチン(80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより		生食50mL 1瓶 シスプラチン(80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより		生食50mL 1瓶 シスプラチン(80mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより		生食50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp5終了後 下ルートより		生食50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp5終了後 下ルートより		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
8 薬剤	生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
9 薬剤	生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/㎡) 下ルートより	
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
10 薬剤														
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
11 薬剤														
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
12 薬剤														
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
13 薬剤														
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
14 薬剤														
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
15 薬剤														
	手技		手技		手技		手技		手技		手技		手技	
施行日数														

コード ナンバリング	sk098-01	
	入院91	
	ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール 名	キイトルーダ+GC[9コース以降]	
投与順序	1 薬剤	
	手技	day1day8
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ(200mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
	手技	持続点滴末梢(30分)持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)
	手技	持続点滴末梢(30分)持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/ml)	
	手技	持続点滴末梢(30分)day15は休薬
5 薬剤		休薬完了day21
	手技	day15は休薬
6 薬剤		
	手技	
7 薬剤		
	手技	
8 薬剤		
	手技	
9 薬剤		
	手技	
10 薬剤		
	手技	
11 薬剤		
	手技	
12 薬剤		
	手技	
13 薬剤		
	手技	
14 薬剤		
	手技	
15 薬剤		
	手技	
施行日数		