

コード	kk001-06	kk002-06	kk003-05	kk004-06	kk005-06	kk006-06	kk007-03	kk008-03	kk009-04	kk010-03	kk011-03
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	シスプラチン・ジェムザール	シスプラチン・ナベルピン	シスプラチン・TS-1	シスプラチン・カンブ	シスプラチン・タキソール	シスプラチン・ラステット	パラブラチン・Monthlyタキソール	パラブラチン・weeklyタキソール	weeklyパラブラチン・タキソール-RT	パラブラチン・タキソール	パラブラチン・ジェムザール
投与順序	1 薬剤 アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	★TS-1開始時がday1	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にシスプラチン75錠服用	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にシスプラチン75錠服用	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にシスプラチン75錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day6	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ジェムシタピン(1000mg/inf)	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/inf) 全開で	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/inf)	5ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/inf) 真傾時ホシピン必須	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/inf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/inf) 真傾時ホシピン必須	生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン(1000mg/inf)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/inf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/inf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(40mg/inf)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX780mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 4) MAX800mg
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX760mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 2) MAX300mg		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8.15は、休薬週	day8
5 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/inf) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/inf) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/inf) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/inf) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/inf) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/inf) 全量を500mL 下ルートより			休薬完了 day7	休薬完了 day21	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8.15は、休薬週	day8.15	day8.15	day8.15は、休薬週	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	休薬完了 day21	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にシスプラチン75錠服用	day1~36まで計6コース	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン(1000mg/inf)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)
7 薬剤							カルボプラチンはAUC6に設定 されていても開い合わせ不要	カイトリル注バッグ3mg 1袋			
手技	day8	day8	day15.22.29は、休薬週	day8.15	day8.15は、休薬週	day2.3		持続点滴末梢(30分)			day15は、休薬週
8 薬剤	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/inf) 全開で	休薬完了 day95	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了 day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/inf)			休薬完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)			
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン(1000mg/inf)	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/inf)	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/inf)					※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)		day22は、休薬週			
10 薬剤								休薬完了 day28			
手技	day15は、休薬週	day15は、休薬週		day22は、休薬週		day8.15は、休薬週					
11 薬剤	休薬完了 day21	休薬完了 day21		休薬完了 day28		休薬完了 day21			※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服		
手技											
12 薬剤	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服		※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服		※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服					
手技											
13 薬剤											
手技											
14 薬剤											
手技											
15 薬剤											
手技											
16 薬剤											
手技											
17 薬剤											
手技											
旅行日数	1	2	2		3	1	3	1	3	1	2

コード	kk012-03	kk013-03	kk014-03	kk016-03	kk017-03	kk018-03	kk019-03	kk020-05	kk022-04	kk023-03	kk024-03	kk025-04	kk026-03
ルート	入院・外来 ケモセーフ下ルート (メソフィルタなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコル名	パラプラチン・ラステット	パラプラチン・カンプト	パラプラチン・TS-1	タキソール	Triweeklyタキソール	Biweeklyタキソール	ジェムザール	ナベルピン	カンプト	カルセド	ハイカムチン	シスプラチン・アリムタ	Biweekly ジェムザール
1 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 フィルタなし		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V Rp.2と同時	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注1mg筋注	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1.8.15	持続点滴末梢(30分)	day1.8.15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1.8.15	day1.8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/100mL)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX700mg	生食 100mL 1瓶 フアモジジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にメチコバル注5錠服用	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/100mL) 副作用時リンゼン必須	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/100mL) 副作用時リンゼン必須	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	生食50mL 1瓶 ロセウス (25mg/100mL) 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/100mL)	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 ハイカムチン(1.0mg/100mL)	アロカリス注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/100mL)
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴側管(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX700mg 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン(40mg/100mL)	ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋			生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/100mL)	生食 50m 1瓶 ルートキープ用	day1~15まで計3コース	生食 100mL 1瓶 カルセド 全開で Rp.1終了後	day1~8まで計5コース	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/100mL)	休業完了 day14
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	day8.15は、休業週	day8は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管	day22は、休業週	持続点滴側管(約10分)	持続点滴末梢(10分)		持続点滴末梢(10分)
4 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg		5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/100mL)	休業完了 day21		day1~15まで計3コース	day1~8まで計2コース	休業完了 day7	day1~3	休業完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	
手技	day2.3	持続点滴末梢(120分)	day8.15は、休業週	持続点滴末梢(120分)		day15	day22は、休業週	day15は、休業週				持続点滴末梢(60分)	
5 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルタなし	day1~15まで計3コース	休業完了 day21	day1~15まで計3コース		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了 day28	休業完了 day21		休業完了 day21		マンニトールS 200mL	
手技	持続点滴末梢(30分)	day22は、休業週		day22は、休業週		持続点滴末梢(30分)						持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/100mL)	休業完了 day28	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	休業完了 day28		5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル(35mg/100mL)						生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/100mL) 全量を500mL	
手技	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(90分)						持続点滴末梢(120分)	
7 薬剤												ソルデム3A500mL 1袋	
手技	day8.15は、休業週					day22は、休業週						持続点滴末梢(60分)	
8 薬剤	休業完了 day21						休業完了 day28						day8.15は、休業週
手技													
9 薬剤	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服											休業完了 day21	
手技													
10 薬剤												※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服	
手技													
11 薬剤													
手技													
12 薬剤													
手技													
13 薬剤													
手技													
14 薬剤													
手技													
15 薬剤													
手技													
16 薬剤													
手技													
17 薬剤													
手技													
旅行日数	1	3	3	1	3	1	2	3	2	1	3	5	1

コード	kk027-03	kk028-02	kk029-03	kk030-02	kk031-02	kk032-01	kk033-01	kk034-01	kk035-06	kk036-01	kk037-01	kk038-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	Bweekly パラプラチン・アムタ	アリムタ	パラプラチン・タキソール・アムタ	アムタ	パラプラチン・アリムタ	アリムタ・アムタ	パラプラチン・アリムタ・アムタ	アムタ・タキソール	シスプラチン・タキソール (放射線併用)	ドセタキセル・サイラムザ	オプジーボ(2週毎)	カルボプラチン・アブラキサン
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 フモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Ro.1と同時にシスプラチン75錠服用	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アプレビタント内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Ro.1と同時にシスプラチン75錠服用	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注 (240mg/body)	
手技	持続点滴末梢 (30分)	day1	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (90分)	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1	day1
2 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (40mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	生食 50mL 1瓶 メイプルート 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/㎡) 調製時ポンピング必要	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V 投与中に水分1L摂取	生食250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 メイプルート 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (5分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (5分)
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 2) MAX300mg	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (200mg/㎡)	休業完了 day21	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/㎡)	生食 500mL 1袋 アムタ (100mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/㎡) 調製時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了 day14	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注 (100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (10分)	持続点滴末梢 (180分)		持続点滴末梢 (10分)	持続点滴末梢 (10分)	持続点滴末梢 (10分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢 (30分)
4 薬剤		休業完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg	ラクテック500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1B 硫酸Mg 8mEq	生食食塩濃度250mL 1袋 ドセタキセル (60mg/㎡) 調製時ポンピング必要		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより
手技	day8は、休業済		持続点滴末梢 (120分)		持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (120分)
5 薬剤	休業完了 day14		生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可		day8,15は、休業済	休業完了 day21	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ラクテック500mL 1袋	マンニトールS 200mL	休業完了 day21		
手技			持続点滴末梢 (90分)				持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)		day8,15
6 薬剤			休業完了 day21		休業完了 day21		休業完了 day21	休業完了 day21	生食 500mL 1袋 シスプラチン (40mg/㎡) 全量を500mL			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技							day8,15は、休業済	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (120分)			持続点滴末梢 (30分)
7 薬剤			※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服		※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服		休業完了 day21		ソルデム3A500mL 1袋			生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注 (100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技									持続点滴末梢 (60分)			持続点滴末梢 (30分)
8 薬剤							※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服					休業完了 day21
手技									day15,22,43は、休業済			
9 薬剤									休業完了 day48			※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服
手技												
10 薬剤												
手技												
11 薬剤												
手技												
12 薬剤												
手技												
13 薬剤												
手技												
14 薬剤												
手技												
15 薬剤												
手技												
16 薬剤												
手技												
17 薬剤												
手技												
旅行日数		1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	3

コード	kk039-01	kk040-01	kk042-01	kk043-01	kk044-01	kk045-01	kk046-01	kk047-01	kk048-01	kk050-01	kk051-01	kk052-01	
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコル名	キイトルーダ(3選毎)	テセントリク	キイトルーダ・バラプラチン・アリムタ	キイトルーダ・バラプラチン・アリムタ	キイトルーダ・バラプラチン・アリムタ	キイトルーダ・アリムタ	テセントリク・バラプラチン・タキソール・アバスタン	テセントリク・アバスタン	キイトルーダ・カルボプラチン・アブラキサン	テセントリク・バラプラチン・ラスニット療法	イミフィンジ肺腫小細胞・肝	イミフィンジ・バラプラチン・ラスニット療法	イミフィンジ(下ルート) (メインフィルターなし)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9選毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9選毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1期 9選毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Ro1と同時にレバシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1袋 ヘパスマ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 ヘパスマ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body) 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 フィルターなし	生食 50mL 1瓶 フィルターなし
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	休薬完了 day21	休薬完了 day21	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Ro1と同時にレバシコウ75錠服用	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	休薬完了 day28	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤			生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	休薬完了 day21	生食 100mL 1袋 カルボプラチン(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg 下ルートより		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)
手技			持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤			ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	休薬完了 day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(200mg/mf)		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX300mg 下ルートより		day23	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより
手技			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day23	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤				マンニトールS 200mL			ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし		day8,15は、休薬	day8,15は、休薬	day2,3
手技			day8,15は、休薬	day8,15は、休薬	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		day8,15	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬	day8,15は、休薬	day2,3
7 薬剤			休薬完了 day21	休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 スプラチン (75mg/mf) 全量を500mL		休薬完了 day21	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし
手技			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤			※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服	カルボプラチンはAUC6に減量 されていても開い合わせ不要	ソルデム3A500mL 1袋		※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	day8,15は、休薬		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)
手技					持続点滴末梢(60分)		day8,15は、休薬	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休薬	day8,15は、休薬		day8,15は、休薬	day8,15は、休薬
9 薬剤					※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服			休薬完了 day21	休薬完了 day21				
手技					day8,15は、休薬								
10 薬剤					休薬完了 day21				※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服		day8,15は、休薬	休薬完了 day21
手技												day8,15は、休薬	休薬完了 day21
11 薬剤					※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服								※入院 アロカリス注→アプレビタントを 内服
手技													
12 薬剤													
手技													
13 薬剤													
手技													
14 薬剤													
手技													
15 薬剤													
手技													
16 薬剤													
手技													
17 薬剤													
手技													
旅行日数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3

コード	kk053-01	kk054-01	kk055-01	kk056-01	kk057-01	kk057-01	kk058-01	kk059-01	kk060-01	kk061-01	kk062-01	kk063-01	
ルート	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタなし)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	
プロトコル名	イモフィンジシスプラテン・ マールート 投与中に水分1L摂取	オプジーボ(4週毎)	キイトルーダ(6週毎)	オプジーボ+ヤーボイ(17ノマ)	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA +PTX day1	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA +PTX day2	オプジーボ+ヤーボイ(肺小細胞 癌)薬選)	テセントリク+カルボプラテン+ アブラキサン	イソリジ+イグジブ(非小細胞肺がん) +mab-PTX+CBDCA(非扁平 上皮)薬平上薬)	イソリジ+イグジブ(非小細胞肺がん) +PEM+CBDCA(非扁平上皮)	イソリジ+イグジブ(非小細胞肺がん) +PEM+GDDP(非扁平上皮)	イソリジ+イグジブ(非小細胞肺がん) +GEM+CBDCA(非扁平上皮)	
1 薬剤	生食 250mL 1瓶 イモフィンジ注(1500mg/body) マールート 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(80mg/body)	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(380mg/body)	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(380mg/body)	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(380mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) アブラキサン注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イグジブ注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イグジブ注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イグジブ注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イグジブ注(75mg/body)	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 フィルタなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 フモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時に入シシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(380mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) アブラキサン注(75mg/body) 感受性 良→良→良以降30分 下ルート	生食 100mL 1瓶 イグジブ注(75mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 100mL 1瓶 イグジブ注(75mg/body)
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V フィルタなし	休薬完了 day28	休薬完了 day42	生食 100mL 1瓶 ヤーボイ注(3mg/kg)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	生食 100mL 1瓶	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルタなし	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 250mL 1瓶 イモフィンジ注(1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イモフィンジ注(1500mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)			生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	生食 500mL 1袋 アブラキサン注(100mg/mf) MAX3000mg 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イモフィンジ注(1500mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 250mL 1瓶 イモフィンジ注(1500mg/body)	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	
5 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	休薬完了 day21		生食 100mL 1瓶 フモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.5と同時にシシコウ75錠服用	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶	生食 500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 6) MAX3000mg 下ルートより	生食 500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 6) MAX3000mg 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 全開で	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	
6 薬剤	マンニトールS 200mL	4回投与後、オプジーボ単剤へ		アロキシ注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	休薬完了 day21			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V アロカリス注 1V フィルタなし	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(600mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(600mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(600mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day22	day8,15	day8,15	day8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)	
7 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラテン (80mg/mf) 全量を500mL 下ルートより			5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(380mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルタなし	生食 100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 6) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋			ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 6) MAX800mg		生食 50mL 1瓶	生食 100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) MAX3000mg 下ルートより	生食 500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 6) MAX3000mg 下ルートより	休薬完了 day21	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 4) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラテン (AUC 4) MAX800mg	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	
9 薬剤				休薬完了 day21		休薬完了 day42	休薬完了 day21		1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 500mL 1袋 シスプラテン (75mg/mf) 全量を500mL		day8	
手技	day2,3	day2,3	day2,3	day2,3	day2,3	day2,3	day2,3	day2,3	day8,15	day8,15	day8,15	day8	
10 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルタなし			※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルタなし	生食 100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
11 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)							生食 100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	休薬完了 day21		1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	休薬完了 day21	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
12 薬剤	休薬完了 day21								休薬完了 day21			休薬完了 day21	
手技	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	
13 薬剤	休薬完了 day21								※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服		※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	
手技	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	
14 薬剤	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服												
手技	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	
15 薬剤													
手技													
16 薬剤													
手技													
17 薬剤													
手技													
旅行日数		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

コード	kk064-01	kk065-01	kk066-01	kk067-01	kk068-01	kk069-01	kk070-01	kk071-01	kk072-01	kk073-01	kk074-01	kk075-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)+GEM+CDDP(扁平上皮)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)+PEM維持(非扁平上皮)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)+PEM+CBDCA(非扁平上皮)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)	サイラムザ(+erlotinib)	エンハーツ	weekly nab-PTX(B法)	weekly nab-PTX(B法)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)	イコゾグ+イゾト(非小細胞肺癌がん)
投与順序	1 薬剤 アプレビタント内服	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(100mg/body)	生食 100mL 1瓶 イコゾグ注(75mg/body)	生食 100mL 1瓶 イゾト注(75mg/body)	生食 250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg) 認容性 良 60分~90分へ短縮可	カイトリル注パッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注パッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルタナシ	生食500mL 1袋 イコゾグ注(800mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(300mg/body)	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V
手技	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 イゾト注(75mg/body)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食100mL (20mL/㎡) アロカリス注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	生食250mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 アモキシシリン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V R2.2と同時にパルスコントロール服用	イムデトラ1mg (1mg/body) 注射用水20mL 1V 生食250mL 1袋 ※①10mg/バイアルに注射用水1.3mLを加え溶解 ※②生食250mLから14mL抜き取る ※③ ②に輸液安定化液を13mL加える ※④ 溶解したイムデトラ1.1mLを③に加注	イムデトラ10mg(10mg/body) 注射用水20mL 1V 生食250mL 1袋 ※①10mg/バイアルに注射用水4.4mLを加え溶解 ※②生食250mLから17mL抜き取る ※③ ②に輸液安定化液を13mL加える ※④ 溶解したイムデトラ4.2mLを③に加注	イムデトラ10mg(10mg/body) 注射用水20mL 1V 生食250mL 1袋 ※①10mg/バイアルに注射用水4.4mLを加え溶解 ※②生食250mLから17mL抜き取る ※③ ②に輸液安定化液を13mL加える ※④ 溶解したイムデトラ4.2mLを③に加注
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(6分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	カイトリル注パッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(100mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(100mg/body)	休薬完了 day14	5%ブドウ糖100mL 1瓶 エンハーツ注(6.4mg/kg) 注射用水20mL 1A 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可 滅光必要	休薬完了 day7	休薬完了 day14	アロキシ注パッグ3mg 1袋 アロカリス注 1V	生食1000mL 1袋	生食1000mL 1袋	生食1000mL 1袋
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(4時間)
4 薬剤	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(100mg/body)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1瓶 全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/㎡)						
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(180分)						
5 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	休薬完了 day21	カイトリル注パッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了 day28	休薬完了 day21				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day14
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)						
6 薬剤	アロキシ注パッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V アロカリス注 1V 投与中に水分1L摂取	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	エンハーツ調製後は点滴パッグを滅光する					休薬完了 day21	※必ず入院で実施 ※投与遅延の場合、適正使用ガイド参照	※必ず入院で実施 ※投与遅延の場合、適正使用ガイド参照	※投与遅延の場合、適正使用ガイド参照
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)									
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムスタビン(1000mg/㎡)	休薬完了 day21				調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝えること			※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服			
手技	持続点滴末梢(30分)											
8 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注				エンハーツ400mgを超えると 注射用水2A必要になるので 処方修正してもらうこと			術前、3コースまで使用可			
手技	持続点滴末梢(60分)											
9 薬剤	マンニトールS 200mL											
手技	持続点滴末梢(30分)											
10 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/㎡) 全量を500mL											
手技	持続点滴末梢(120分)											
11 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋											
手技	持続点滴末梢(60分)											
12 薬剤												
手技	day8											
13 薬剤	カイトリル注パッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V											
手技	持続点滴末梢(30分)											
14 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムスタビン(1000mg/㎡)											
手技	持続点滴末梢(30分)											
15 薬剤	休薬完了 day21											
手技												
16 薬剤	※入院 アロカリス注→アプレビタントを内服											
手技												
16 薬剤												
手技												
17 薬剤												
手技												
旅行日数									2			

コード	kk076-01	kk077-01	kk078-01	kk079-01	kk080-01	kk081-01	kk082-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコル名	イムデトラ(維持10mg/body)						
投与順序	1 薬剤	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注				1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	
手技		day1	day1	day1	day1	day1	day1
2 薬剤	イムデトラ10mg(10mg/body) 注射用水20mL 1V 生食250mL 1瓶 ※①10mgバイアルに注射用 水4.4mLを加え希釈 ※②生食260mLから17mL取り 取る ※③④に輸液安定化液を 13mL加える ※⑤希釈したイムデトラ 4.2mLを⑥に加注	グラニセド注ハツグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	グラニセド注ハツグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	グラニセド注ハツグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V ※開始同時に、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服	グラニセド注ハツグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	グラニセド注ハツグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V	グラニセド注ハツグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V ※開始同時に、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食50mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ヘパレキド注(800mg/inf)	生食 100mL 1瓶 ヘパレキド注(800mg/inf)	生食 100mL 1瓶 ヘパレキド注(800mg/inf)	生食 100mL 1瓶 ヘパレキド注(800mg/inf)	生食 100mL 1瓶 ヘパレキド注(800mg/inf)	生食 100mL 1瓶 ヘパレキド注(800mg/inf)
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、デカドロン錠・ レスタミンコーワ錠・アセトアミ ノフェン錠内服	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、デカドロン錠・ レスタミンコーワ錠・アセトアミ ノフェン錠内服	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUJ 5) MAX750mg ※開始1時間後、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	皮下投与	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	皮下投与
5 薬剤	リプロファズ(1600mg/body) シリンジ製剤 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用	リプロファズ(2400mg/body) シリンジ製剤 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用	リプロファズ(2400mg/body) シリンジ製剤 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用	リプロファズ(2240mg/body) シリンジ製剤 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用	リプロファズ(3380mg/body) シリンジ製剤(10.5mL*2) 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用	リプロファズ(3380mg/body) シリンジ製剤(10.5mL*2) 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用	リプロファズ(3380mg/body) シリンジ製剤(10.5mL*2) 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用
手技	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与	皮下投与
6 薬剤	※投与遅延の場合、適正使用 ガイド参照						
手技		day8,15			day8,15		
7 薬剤		リプロファズ(2400mg/body) シリンジ製剤 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用 ※開始30分前、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服			リプロファズ(3380mg/body) シリンジ製剤(10.5mL*2) 約5分かけて、腹部皮下に 23Gの翼状針を使用 ※開始30分前、レスタミンコー ワ錠・アセトアミノフェン錠内服		
手技		皮下投与			皮下投与		
8 薬剤							
手技							
9 薬剤		休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤		リプロファズ製剤前、常温で15 分以上置く	リプロファズ製剤前、常温で15 分以上置く	リプロファズ製剤前、常温で15 分以上置く	リプロファズ製剤前、常温で15 分以上置く	リプロファズ製剤前、常温で15 分以上置く	リプロファズ製剤前、常温で15 分以上置く
手技							
12 薬剤		-デカドロン錠(4)2.5T、レスタミ ンコーワ(10)5T、アセトアミノフェ ン(500)2T	-レスタミンコーワ(10)5T、アセ トアミノフェン(500)2T	-レスタミンコーワ(10)5T、アセ トアミノフェン(500)2T	-デカドロン錠(4)2.5T、レスタミ ンコーワ(10)5T、アセトアミノフェ ン(500)2T	-レスタミンコーワ(10)5T、アセ トアミノフェン(500)2T	-レスタミンコーワ(10)5T、アセ トアミノフェン(500)2T
手技							
13 薬剤		※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服		※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	※入院 アロカリス注→アプレピタントを 内服	
手技							
14 薬剤		※外来 初回は、リプロファズ投与後少 なく4時間は院内に留まる			※外来 初回は、リプロファズ投与後少 なく4時間は院内に留まる		
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							
旅行日数							