

コード ナンバリング	ge022-05	ge023-05	ge024-08	ge025-08	ge027-02	ge028-01	ge036-01	ge039-01	ge040-04
	入院 3	入院 4	入院 5	入院 6	入院・外来 8	入院・外来 9	入院・外来 12	入院・外来 15	入院・外来 16
ルート	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)
プロトコール名	FOLFOX6	FOLFOX6・ アバステン	FOLFIRI	FOLFIRI・ アバステン	イリノテカン(80mg/㎡)	ジェムザール	アービタックス	CPT-11(単剤)	mFOLFOX6(インフューザー用)
投与順序	1 薬剤 グラニセロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	グラニセロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシズマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンJ-75錠服用		カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時に 下ルートより	グラニセロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時に 下ルートより	グラニセロン注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン(1000mg/㎡)	生食500mL 1袋 アービタックス(500mg/㎡) 全量を500mLに	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.3と同時に 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.2と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/㎡) Rp.2と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時に 下ルートより		day1~day15の計3回	生食 250mL 1袋	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.2と同時に 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8は休業		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	休業完了day14		休業完了day14		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で
手技	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)		day22は休業		day22は休業	側注(5分)
5 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で		休業完了day7		休業完了day28	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に					持続点滴末梢(46hr)
6 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)		ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)					
手技	day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)	day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)					day8は、休業週
7 薬剤	休業完了day14		休業完了day14						休業完了day14
手技		day8は、休業週		day8は、休業週					
8 薬剤		休業完了day14		休業完了day14					
手技									
9 薬剤									
手技									
10 薬剤									
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge48-01	ge053-01	ge054-01	ge065-01	ge066-01	ge067-01	ge068-01	ge099-01
	17	18	19	21	22	23	24	25
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	アバステン(7.5mg/kg)・ゼローダ	ネダブラチン	5-FU(500mg/m <sup>2</sup> )・LV(RPMI)	イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )	SOX/XELOX・アバステン	SOX/XELOX	アバステン(5mg/kg)・TS-1/ロサーフ	DOC+GEM (限定)
投与順序	1 薬剤							
薬剤	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1
薬剤	2 薬剤							
薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (100mg/m <sup>2</sup> )	ソルデム3A 500mL 1袋 レボリナートNa注 (250mg/m <sup>2</sup> ) 下ルート 開始60分後よりRp.3投与	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m <sup>2</sup> )	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m <sup>2</sup> )	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
薬剤	3 薬剤							
薬剤	休薬完了 day21	ラクテック500mL 1袋	生食 50mL 1袋 フルオウラシル(500mg/m <sup>2</sup> ) 上ルート Rp.2開始60分後より全開で	3回投与後、3週間休薬、day49で1クール (2回投与後、3週間休薬、day35で1クールの場合もあり)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m <sup>2</sup> )	day1から2週間TS-1またはゼローダ内服	休薬完了 day14	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m <sup>2</sup> )
手技		持続点滴末梢(90分)	静脈注射緩徐に	day8は休薬	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)
薬剤	4 薬剤							
薬剤	day1から2週間ゼローダ内服	ラクテック500mL 1袋	day1～36まで計6コース	休薬完了 day14	day1から2週間TS-1またはゼローダ内服		TS-1 day1～42までで1コース day1から4週間投与	
手技		持続点滴末梢(90分)	day43.50は休薬			day8.15は、休薬週		day8
薬剤	5 薬剤							
薬剤		休薬完了 day28	休薬完了 day7			休薬完了 day21	ロサーフ(35mg/m <sup>2</sup> ) day1～28までで1コース day1-5 day8-12	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技					day8.15は、休薬週			持続点滴末梢(30分)
薬剤	6 薬剤							
薬剤					休薬完了 day21			5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/m <sup>2</sup> ) 調製時ボンピング必要
手技								持続点滴末梢(60分)
薬剤	7 薬剤							
薬剤								生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m <sup>2</sup> )
手技								持続点滴末梢(30分)
薬剤	8 薬剤							
薬剤								休薬完了 day21
手技								
薬剤	9 薬剤							
薬剤								
手技								
薬剤	10 薬剤							
薬剤								
手技								
薬剤	11 薬剤							
薬剤								
手技								
薬剤	12 薬剤							
薬剤								
手技								
薬剤	13 薬剤							
薬剤								
手技								
薬剤	14 薬剤							
薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge104-01	ge105-01	ge106-01	ge107-01	ge108-01	ge109-01, ge110-01	ge111-01	ge112-01
入院・外来	26	27	28	29	30	31	32	33
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	CPT-11+ベクティビックス	ジェムザール+アブラキサン	FOLFIRINOX	IRIS+ベクティビックス	SOX (100mg/㎡)	XELOX+ハーセプチン(初回) XELOX+ハーセプチン	アバスチン+IRIS	SOX+アービタックス(初回)
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b>	生食 100mL 1瓶 ヘパンスマブ( <b>7.5mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス ( <b>6mg/kg</b> ) 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注( <b>85mg/㎡</b> ) 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注( <b>100mg/㎡</b> )	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダシコウ5錠服用
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 メインルート	生食100mL ( <b>25mL/㎡</b> ) アブラキサン注( <b>125mg/㎡</b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート ( <b>200mg/㎡</b> ) レボホリナート開始30分後からイリノテカン投与 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス ( <b>6mg/kg</b> ) 上ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注( <b>130mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 イリノテカン ( <b>150mg/㎡</b> )	生食500mL 1袋 アービタックス ( <b>400mg/㎡</b> ) 全量を500mLに
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン ( <b>150mg/㎡</b> ) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン( <b>1000mg/㎡</b> ) 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン ( <b>180mg/㎡</b> ) オキサリプラチン注開始30分後から投与 上ルートより	生食 250mL 1袋 メインルート		day1から2週間ゼローダ内服	day1から2週間TS-1内服	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8,15は、休業週			持続点滴末梢(60分)
5 薬剤	休業完了day14		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル( <b>400mg/㎡</b> ) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン ( <b>100mg/㎡</b> ) 上ルートより	休業完了day21		休業完了day21	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注( <b>130mg/㎡</b> )
手技		day22は、休業週	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休業週		持続点滴末梢(120分)
6 薬剤		休業完了day28	生食 100mL (入院ではサルテム3A500mLもあり) フルオロウラシル( <b>2400mg/㎡</b> ) 全量100mL 生食で調節	day1から2週間TS-1内服		休業完了day21		
手技			持続点滴末梢(46hr)	day8,22は、休業週				day8,15
7 薬剤				休業完了day28	※ 1段階減量 75mg/㎡			生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダシコウ5錠服用
手技			day8は、休業週					持続点滴末梢(30分)
8 薬剤			休業完了day14					生食250mL 1袋 アービタックス ( <b>250mg/㎡</b> ) 全量を250mLに
手技								持続点滴末梢(60分)
9 薬剤								生食 250mL 1袋
手技								持続点滴末梢(60分)
10 薬剤								day1から2週間ゼローダ内服
手技								
11 薬剤								休業完了day21
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge113-01	ge114-01	ge115-01	ge118-01	ge120-01	ge121-01	ge122-01	ge123-01
入院・外来	34	入院・外来	35	外来	36	入院・外来	38	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名	SOX+アービタックス	ヨンデリス	FOLFIRI・サイラムザ	5-FU肝動注(Weekly)	オブジーボ(2週毎)	FOLFIRI+ザルトラップ (インフューザー用)	XELIRI+アバスチン療法	アブラキサン+サイラムザ
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤	8 薬剤
手技	day1	中心静脈(30分)	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1,15
1 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ錠服用	生食100mL 1瓶	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ錠服用	生食20mL 5mL フルオウラシル(1000mg/nf) シュア-フューザ-A:SFS-0504HR(P)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	
2 薬剤	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし Rp.1と同時にレスタミンコーワ錠服用
3 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/nf) 全量を250mLに	生食 500mL 1袋 ヨンデリス (1.2mg/nf)	生食 50mL 1瓶 全開で	ベッド予約無い場合は放射線RI室で穿刺予定	休薬完了day14	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/nf) Rp.4と同時に下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (200mg/nf)	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 下ルートより 認容性 良 60分→30分へ短縮可
4 薬剤	生食 250mL 1袋	休薬完了day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/nf) Rp.5と同時に下ルートより	インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!		生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/nf) Rp.3と同時に上ルートより	day1から2週間ゼロダ内服 (800mg/nf)	生食 50mL 1瓶 全開で
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/nf)		生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/nf) Rp.4と同時に上ルートより			生食 50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/nf) 全開で	休薬完了day21	生食100mL (20mL/nf) アブラキサン注(100mg/nf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより
6 薬剤			生食50mL 1瓶 フルオウラシル(400mg/nf) 全開で			生食 100mL フルオウラシル(2400mg/nf) 全量100mL 生食で調節		
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ錠服用		生食 100mL フルオウラシル(2400mg/nf) 全量100mL 生食で調節				day8は、休業週	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
8 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/nf) 全量を250mLに					休薬完了day14		生食100mL (20mL/nf) アブラキサン注(100mg/nf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 day22は、休業週
9 薬剤	生食 250mL 1袋		休薬完了day14					休薬完了day28
10 薬剤	day1から2週間TS-1内服							
11 薬剤	休薬完了day21							
12 薬剤								
13 薬剤								
14 薬剤								

コード ナンバリング	ge124-01	ge125-01	ge127-01	ge128-01.ge129-01	ge130-01.ge131-01	ge135-01	ge137-01	ge141-01
入院・外来	43	44	45	46	47	48	49	50
ルート	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ポンプ	ポンプ
プロトコール名	FOLFOXIRI	FOLFOXIRI+Bev	アバスチン+イリノテカン	Her+S-1+CDDP療法	SOX+ハーセプチン	オプジーボ(4週毎)	アバスチン+5-FU肝動注(限定)	ガルトラップ+IRI+5-FU肝動注(限定)
投与順序	1 薬剤 アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	トラスツスマブは2回目以降 6mg/kg(30分)	生食 250mL 1袋 ヘパシスマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(480mg/body)	生食 100mL 1瓶 アバスチン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (165mg/mf) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツスマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 投与中に経口補水液1L摂取 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/mf) Rp.1と同時 シュアフェューザー-A:SFS-0504HR(P)	生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/mf) Rp.1と同時 シュアフェューザー-A:SFS-0504HR(P)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	動脈注射(5時間)	動脈注射(5時間)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (165mg/mf) 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/mf)	休薬完了day28	休薬完了day7	生食 250mL 1袋 ガルトラップ (4mg/kg) Rp.1終了後
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	休薬完了day14	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq メインルート	day1から2週間TS-1内服		5-FUのみレジメン(放射2)と交互に	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/mf) Rp.3終了後
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)				
5 薬剤	生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/mf) 全量230mL 生食で調節 インフューザーポンプLV5	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		マンニトール 200mL メインルート			インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!	
手技	持続点滴末梢(48hr)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週			
6 薬剤		生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/mf) 全量230mL 生食で調節 インフューザーポンプLV5		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	休薬完了day21			生食20mL 5mL フルオロウラシル(1000mg/mf) Rp.1と同時 シュアフェューザー-A:SFS-0504HR(P)
手技	day8は、休業週	持続点滴末梢(48hr)		持続点滴末梢(120分)				動脈注射(5時間)
7 薬剤	休薬完了day14			生食 500mL 1袋 メインルート				休薬完了day14
手技		day8は、休業週		持続点滴末梢(60分)				
8 薬剤	使用するインフューザーポンプは「LV5」	休薬完了day14		休薬完了day21				インフューザーポンプ SFS-0504HR(P) 種類注意!
手技								
9 薬剤		使用するインフューザーポンプは「LV5」			day1から2週間TS-1内服			
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge142-01	ge143-01	ge152-01	ge157-01	ge161-01	ge162-01
入院・外来	51	52	53	54	55	56
ルート	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)
プロトコール名	mFOLFOXIRI	mFOLFOXIRI+Bev	オブジーボ+SOX (100mg/㎡)	オブジーボ+mFOLFOX6 (インフューザー用)	XELOX+Pmab療法	mFOLFIRINOX
投与順序	1 薬剤 アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1. 5V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ベハスマブ (5mg/kg) 経容性 良→60分→30分へ短縮可	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ベクテイビックス (6mg/kg)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(100mg/㎡)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) レボホリナート開始30分後からイリノテカン投与 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/㎡) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/㎡)	生食 250mL 1袋 イリノテカン (150mg/㎡) レボホリナート開始30分後から投与 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤	生食 100mL (入院ではルテム3A500mLもあり) フルオウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/㎡) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/㎡) 全開で	day1から2週間ゼローダ内服	生食 100mL (入院ではルテム3A500mLもあり) フルオウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	静脈注射緩徐に		持続点滴末梢(46hr)
6 薬剤		生食 100mL (入院ではルテム3A500mLもあり) フルオウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	休業完了day21	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節		
手技	day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)		持続点滴末梢(46hr)	day8,15は、休業週	day8は、休業週
7 薬剤	休業完了day14			休業完了day14	休業完了day21	休業完了day14
手技		day8は、休業週				
8 薬剤		休業完了day14				
手技						
9 薬剤						
手技						
10 薬剤						
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						

コード ナンバリング	ge163-01 57 入院 ・ 外来
ルート	ケモセーフ
プロトコール名	キイトルーダ+XELOX (130mg/m <sup>2</sup> )
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ (200mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注パッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリアチン注(130mg/m <sup>2</sup> )
手技	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	day1から2週間ゼローダ内服
手技	
5 薬剤	
手技	day8,15は、休業週
6 薬剤	休業完了day21
手技	
7 薬剤	
手技	
8 薬剤	
手技	
9 薬剤	
手技	
10 薬剤	
手技	
11 薬剤	
手技	
12 薬剤	
手技	
13 薬剤	
手技	
14 薬剤	
手技	

コード ナンバリング	sk001-01 1	sk002-01 2	sk003-07 3	sk004-01 4	sk005-01 5	sk006-01 6	sk007-01 7	sk008-08.ge024 8	
	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院	入院	入院・外来	入院	
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	
ジェムザール	ジェムザール	TS-1・CPT-11	TS-1・CDDP day8 (60mg/㎡)	TS-1・CDDP weekly (20mg/㎡)	FP(700-70)	FP (low dose)	CDDP腹腔・5-FU	FOLFIRI	
投与順序	1 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	★TS-1 day1から3週間投与	★TS-1 day1の7日前より3週間投与	★TS-1 day1から3週間投与	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 フルオロウラシル(500mg/body) Rp.2と同時 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1.15	day1	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	ラクテック500mL 1袋	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(200mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 20mL 2A シスプラチン(MAX 20mg/body) Rp.1と同時	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	腹腔投与(valus)	持続点滴末梢(120分)	
3 薬剤	day1～day15の計3回	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎡)	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1投与60分後	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	休業完了day7	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより	
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)	
4 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/㎡)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	シスプラチンはシリンジ3本に分ける 生食とシスプラチン1:1で調製	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で	
手技	day22は休業	day8.22.29は休業	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)		静脈注射緩徐に	
5 薬剤	休業完了day7	休業完了day35	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V Rp.3投与開始70分後より	ラクテック500mL 1袋	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V Rp.4終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(4mg/㎡) Rp.4終了後 上ルートより	生食とシスプラチンそれぞれ吸い、3方活栓使用して1本にまとめる	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)	
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(46hr)	
6 薬剤			生食 500mL 1袋 シスプラチン(60mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより	休業完了day7	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 全量を500mLに 上ルートより	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で	①30mL (生食・シスプラチン 15mLずつ) (50mLシリンジ)	休業完了day14	
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)			
7 薬剤			生食 20mL 1A ラシックス注20mg 1A 下ルートより	3投2体が標準 (day1.8.15 5weekごと)	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で	ラクテック500mL 1袋 メインルート	②30mL (生食・シスプラチン 15mLずつ) (50mLシリンジ)		
手技			静脈注射		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)			
8 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	③20mL (生食・シスプラチン 10mLずつ) (30mLシリンジ)		
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)			
9 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)			
10 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)			
11 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート				
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	day2～5			
12 薬剤						生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(200mg/㎡) 下ルートより			
手技			day8, 15, 22は休業		day2～5	持続点滴末梢(24hr)			
13 薬剤			休業完了day7		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(4mg/㎡) 上ルートより			
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)			
14 薬剤					休業完了day21	休業完了day7			
手技									
15 薬剤									
手技									
施行日数	1	21	21	7	5	5	1	1	

コード ナンバリング	sk009-05	sk011-01	sk012-01	sk013-04	sk016-01	sk017-01	sk020-01	sk021-01	sk022-01	sk025-08			
	9	11	12	13	14	15	17	18	19	21			
	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院			
プロトコール 名	ケモセーフ(LV)は、シール) FOLFOLX4・ アバステン	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LV)は、シール) FOLFOLX4・アバステン			
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤	8 薬剤	9 薬剤	10 薬剤			
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	動脈注射(15分)	持続点滴末梢(90分)	day1.15	day1.15,29	day1.15,29	day1			
1 薬剤	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠 内服	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 100mL 1瓶 シスプラチン(10mg~20mg/body) 全量100mLに 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(400mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用
2 薬剤	グラニセロ注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/ mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (25mg/mf) 始め10分は速度半分 観視時ポンピング必要	生食100mL 1瓶 メトドレキセート 0.5V メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロラシル(600~1000mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(400mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(100mg/mf) Rp.4と同時 下ルートより	休業完了day7	休業完了day7	生食100mL 1瓶 メトドレキセート(100mg/mf) Rp.4と同時 下ルートより	休業完了day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アロカリス注(400mg/mf) 全量	生食250mL 1袋 アロカリス注(250mg/mf) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.3と同時 上ルートより	3投1休が標準 (day1.8.15 4weekごと)		5%ブドウ糖500mL 1B メイトレキセート 2A Rp.3と同時 メインルート		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
5 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロラシル(400mg/mf) 全開で			生食100mL 1瓶 フルオロラシル(600mg/mf) 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン(40mg/mf) 全量を500mLに Rp.4投与後 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf)			内服 ロイコボリン錠5mg 12T分4 6時間毎 Rp.3投与2.4時間後より計6回		生食 50m 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラクテック注20mg 1A メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより
7 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			内服 ロイコボリン錠5mg 6T分2 6時間毎		ラクテック500mL 1袋 メインルート	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食90mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/mf) 全開で
8 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			休業完了day7		ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	生食 250mL 1袋 アロカリス注(250mg/mf) 全量を250mLに	生食 250mL 1袋 アロカリス注(250mg/mf) 全量を250mLに	生食 250mL 1袋 アロカリス注(250mg/mf) 全量を250mLに	生食 250mL 1袋 アロカリス注(250mg/mf) 全量を250mLに	生食 250mL 1袋 アロカリス注(250mg/mf) 全量を250mLに	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(2400mg/mf)
9 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (100mg/mf)					ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	休業完了day14
10 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロラシル(400mg/mf) 全開で					生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ75錠服用	休業完了day49
11 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf)					生食 500mL 1袋 フルオロラシル(400mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 アロカリス注(500mg/mf) 全量を500mLに	
12 薬剤	休業完了day14					計6コース	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	
13 薬剤						休業完了day7	休業完了day42	休業完了day42	休業完了day42	休業完了day42	休業完了day42	休業完了day42	
14 薬剤													
15 薬剤													
施行日数	2	1	1	1	1	1	5	6	7	7	2		

コード ナンバリング	sk026-01	sk027-01	sk028-05	sk029-01	sk030-01	sk031-04	sk032-04	sk034-04	sk036-02	sk038-02	sk039-01	
	入院・外来 22	入院 23	入院・外来 24	入院・外来 25	入院・外来 26	入院・外来 27	入院・外来 28	入院・外来 30	入院・外来 32	入院 34	入院・外来 35	
	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	
プロトコール名	レミケード	5-FU肝動注(連日)	アバスチン・mFOLFOX6 (インフューザー用)	SOX/XELOX・アバスチン	SOX/XELOX	FOLFIRI(インフューザー用)	FOLFIRI・アバスチン(インフューザー用)	FOLFIRI・アビタックス (インフューザー用)	mFOLFOX6・アビタックス(インフューザー用)	mFOLFOX6・アビタックス	ベクティビックス	
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短 縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ヘパシマブ(5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスシコ→75錠 服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスシコ→75錠 服用	グラネキド注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスシコ→75錠 服用	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)
手技	持続点滴末梢(30分)	day1-5,8-12	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食250mL 1袋 レボホリナート(50mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル(500mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.3と同時 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食500mL 1袋 アビタックス(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アビタックス(500mg/mf) 全量を500mLに	生食500mL 1袋 アビタックス(500mg/mf) 全量を500mLに	生食 250mL 1袋	
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	休薬完了day14	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.4と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/mf)	day1から2週間TS-1またははぜ ローダ内服	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.4と同時 下ルートより	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	休薬完了day14
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8, 15は、休薬週	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤			5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.3と同時 上ルートより	day1から2週間TS-1またははぜ ローダ内服		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/mf) Rp.3と同時 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	
手技			持続点滴末梢(120分)		day8, 15は、休薬週	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤			生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/mf) 全開で		休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調剤	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	
手技			静脈注射緩徐に	day8, 15は、休薬週		持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤			生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調剤		休薬完了day21		生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調剤	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で	
手技			持続点滴末梢(46hr)			day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	
7 薬剤							休薬完了day14	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調剤	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調剤	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調剤	ソルチム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/mf)	
手技			day8は、休薬週			day8は、休薬週	day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	
8 薬剤			休薬完了day14				休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14	
手技												
9 薬剤												
手技												
10 薬剤											FOLFFOX+Omab+ピラフトビ の場合、前投薬に注意！ピ ラフトビ・アロカリス注で相互 作用の可能性	
手技												
11 薬剤												
手技												
12 薬剤												
手技												
13 薬剤												
手技												
14 薬剤												
手技												
15 薬剤												
手技												
施行日数	1	10	1	14	14	1	1	2	2	2	1	

コード ナンバリング	sk040-02	sk041-02	sk042-02	sk043-02	sk044-01,sk045-01	sk046-01	sk047-01	sk049-01	sk050-01	sk051-01	
	36	37	38	39	40	42	43	44	45	46	
	入院	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院	入院・外来	入院・外来	
	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	
プロトコール 名	FOLFIRI+ベクテビックス	FOLFIRI+ベクテビックス (インフューザー用)	mFOLFLOX6+ベクテビックス	mFOLFLOX6+ベクテビックス (インフューザー用)	ハーセプチン・XP	TS-1+タキソテール	DCF	CDDP+CPT-11(Biweekly)	タキソテール	シスプラチン+ラステット	
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	
	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	トラスクスマブは2回目以降 6mg/kg(30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	グラネトロン注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	day2~3	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (8mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (8mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (8mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (8mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V フマチジン注20mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/mf) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/mf)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
3 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.3と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル (800mg/mf) Rp.1と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオウラシル (800mg/mf) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスクスマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg Rp.2と同時 上ルートより	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(30mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 シスプラチン(30mg/mf) 全量を500mLに	生食 500mL 1袋 シスプラチン(30mg/mf) 全量を500mLに	マンニトールS300mL 200mL
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 キリフリン注(85mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 キリフリン注(85mg/mf) Rp.4と同時 上ルートより	生食 500mL 1袋 Rp.5と同時 下ルートより	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 ランシックス注20mg 1A	ソルデム3A500mL 1袋 ランシックス注20mg 1A	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオウラシル (400mg/mf) 全開で	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) Rp.4と同時 全量を500mLに 上ルートより	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) Rp.4終了後 上ルートより 調製時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋
手技	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
7 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/mf)	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/mf) 全量100mL、生食で調製	ソルデム3A500mL 1袋 フルオウラシル(2400mg/mf)	生食 100mL フルオウラシル(2400mg/mf) 全量100mL、生食で調製	ソルデム3A500mL 1袋	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	day4~5	day4~5	day4~5	day4~5	day2,3
8 薬剤	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	生食 500mL 1袋	ラクテック500mL 1袋 シスプラチン終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし
手技					持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤					マンニトール300mL 1瓶	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)
手技					持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
10 薬剤					生食 50mL 1瓶 ランシックス20mg 1A	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより
手技					持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	day15	day15	day15	day15	day8,15は、休業週
11 薬剤					day2~4	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	休業完了day21
手技					day2~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
12 薬剤					生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/mf) 調製時ポンピング必要	アプレピタント内服
手技					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
13 薬剤					ソルデム1 500mL 1袋	ソルデム1 500mL 1袋	ソルデム1 500mL 1袋	ソルデム1 500mL 1袋	ソルデム1 500mL 1袋	ソルデム1 500mL 1袋	ソルデム1 500mL 1袋
手技					持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
14 薬剤					生食 500mL 1袋	生食 500mL 1袋	生食 500mL 1袋	生食 500mL 1袋	生食 500mL 1袋	生食 500mL 1袋	生食 500mL 1袋
手技					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
15 薬剤					休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21
手技					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
施行日数	1	1	1	1	1	1	6	1	1	3	

コード ナンバリング	sk052-01	sk053-01	sk055-01	sk056-01	sk057-01	sk058-01	sk059-01	sk060-01	sk061-01	sk062-01.sk063-01
	入院・外来 47	入院・外来 48	入院・外来 49	入院・外来 50	入院 51	入院 52	入院 53	入院・外来 54	入院 55	入院・外来 56
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ
プロトコール名	GEM+CDDP	TS-1・CPT-11(術前CRT)	タキソール+サイラムザ	サイラムザ(単剤)	FP(700-70)-RT	術前FP(800-80)	FP(800-80)	CDDP+5-FU肝動注	NDP+5-FU+RT	ハーセプチン・XP(コートハドレーショ)
投与順序	1 薬剤	★TS-1 day1~day5 day6~day12 day22~day28 day29~day33		生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) Rp.1と同時にレスタジコウ75錠内服 認容性 良 60分~30分へ短縮可		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	投与速度注意! 入院と外来で速度が違う	ラクテック500mL 1袋 メインルート	トラスズマブは2回目を以降 6mg/kg(30分)
手技	day1, 8	day1, 8, 22, 29	day1, 15	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1
2 薬剤	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.2と同時に	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチン注20mg 1A デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタジコウ75錠内服	生食 50mL 1瓶 全開で	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 キヤート注6.6mg 1.5V メインルート 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/nf) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/nf) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 シスプラチン (10mg~20mg/body) 全量100mLに メインはフラスコ用生食50mL 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/nf) Rp.1投与60分後 下ルートより	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキササート注6.6mg 1.5V フアモチン注20mg 1V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取
手技	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	動脈注射(外来:30分, 入院:60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	アロキシ注ハッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/nf)	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 認容性 良 60分~30分へ短縮可		生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロラシル (250~500mg/body)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋 トラスズマブ 初回は、 8mg/kg 2回目を以降は、 6mg/kg 上ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8は、休業週	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	動注(外来:3hr, 入院:5hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 シスプラチン(25mg/nf) Rp2終了後 下ルートより		生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了day14	ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	休業完了day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq
手技	持続点滴末梢(60分)	day15は休業	持続点滴末梢	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/nf) Rp3終了後 下ルートより	休業完了day35	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/nf)		マンニトール 200mL メインルート	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 キヤート注6.6mg 1.5V メインルート	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 キヤート注6.6mg 1.5V メインルート	アプレピタン内服	アロキシ注ハッグ 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	マンニトール 200mL
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A Rp4終了後 下ルートより				生食 500mL 1袋 フルオロラシル (700mg/nf) Rp.6と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/nf) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/nf) 全量を500mLに Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 アプアラ (90mg/nf) Rp.5終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/nf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/nf) 全量を500mLに 上ルートより
手技	持続点滴末梢(10分)		day8	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチン注20mg 1A デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタジコウ75錠内服		生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/nf) 全量を500mLに Rp.5と同時に 上ルートより	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で		生食 50mL 1瓶 ラシックス注20mg 1A メインルート 全開で	生食 250mL 1袋
手技	day15は休業		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	休業完了day21		生食 250mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/nf)		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート	休業完了day21
手技			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
9 薬剤			休業完了day28		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		ラクテック500mL 1袋 メインルート	
手技			day2~4	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
10 薬剤					生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート			
手技					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day2~5	持続点滴末梢(30分)	
11 薬剤					生食 500mL 1袋 フルオロラシル (700mg/nf) 下ルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート	
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(24hr)	
12 薬剤					休業完了day28				生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/nf) 下ルートより	
手技					day2~5	day2~5	day2~5		持続点滴末梢(24hr)	
13 薬剤					生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート		休業完了day28	
手技					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	
14 薬剤					生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/nf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/nf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/nf) 下ルートより			
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(24hr)	
15 薬剤					休業完了day21	休業完了day28				
手技										
施行日数		2	20							

コード	sk064-01	sk065-01	sk066-01	sk067-01	sk068-01	sk069-01	sk070-01	sk071-01
ナンバリング	57	58	59	60	61	62	63	64
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名	パラプラチン・ Monthlyタキソール	5-FU+MMC+RT	術前DCF療法	GCS	ザノサー単剤Daily	ザノサー単剤Weekly	ザノサー+5-FU	パラプラチン・ ラステット
投与順序	1 薬剤							
薬剤	生食 100mL 1瓶 ファミジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシニュー75錠服用			デカロン8mg/日内服 (Day2~4)		生食 500mL 1袋		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day2・3	day1	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1~5
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分IL摂取	生食 500mL 1袋	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 500mL 1袋
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/nf)	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/nf) Rp.1と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/nf) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/nf)	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 ザノサー(1000mg/nf)	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶 マイタイン(10mg/nf) 上ルートより	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/nf)	生食 250mL 1袋	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/nf)
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/nf) 下ルートより	生食 50mL 1瓶 メインルートより 全開で	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	マンニトールS 200mL	生食 250mL 1袋	休薬完了day7	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/nf)
手技	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day23
6 薬剤	休薬完了day21		アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(25mg/nf)	休薬完了day42	生食 250mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし
手技		day2~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤	カルボプラチンはAUC6に減量 されていても間い合わせ不要	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(70mg/nf) Rp.5終了後 上ルートより 副領時ポンピング必要		ソルデム3A500mL 1袋		休薬完了day42	
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day4・5	持続点滴末梢(60分)			day8,15は、休薬週
8 薬剤		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/nf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/nf) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/nf) 下ルートより	休薬完了day14			休薬完了day21
手技		持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)				
9 薬剤		休薬完了day28	ラクテック500mL 1袋 シスプラチン終了後 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	day1から1週間 TS-1(80mg/m)内服			
手技			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)				
10 薬剤		通常2クールで終了	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	休薬完了day21				
手技			持続点滴末梢(120分)					
11 薬剤			マンニトール300mL 1瓶 メインルートより					
手技			持続点滴末梢(60分)					
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
施行日数			5					

コード	sk072-01	sk073-01	sk074-01	sk075-01	sk076-01	sk077-01、sk078-01	sk079-01	sk080-01	sk081-01	
ナンバリング	65	66	67	68	69	70、71	72	73	74	
入院	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
ポンプ・シリンジ	ポンプ・シリンジ	ポンプ・シリンジ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	
プロトコール名	LFP療法(限定3)	LFP動注療法	FL+nal-IRI療法	テセントリク・アバステン	エンハーツ	ハーセプチン 3weeks	シスプラチン・ カンボト	テセントリク・バラプラチン・ラス テット療法	イミフィンジ・バラプラチン・ラス テット療法	
投与順序	1 薬剤	インフューザーポンプ SFS-1005D(P) <b>経腸注意!</b>	インフューザーポンプ SFS-1005D(P) <b>経腸注意!</b>	オニバイドは入院時バッグを 遮光する 外来では遮光不要	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスズマブ 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 <b>下ルートより</b>	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) <b>下ルートより</b>
手技	day1	day1	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 フルオロウラル(1250mg/body) 全量90mL 生食で調節	生食 100mL 1瓶 フルオロウラル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/rf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	
手技	動注(120時間)	動注(5日間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
3 薬剤	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	5%ブドウ糖500mL 1袋 オニバイド(70mg/rf) <b>入院時遮光</b>	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 エンハーツ注(84mg/kg) 注射用水100mL 1瓶 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 <b>遮光必要</b>	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/rf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		
手技	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	day8.15は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	
4 薬剤			5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/rf) <b>下ルートより</b>	<b>休業完了 day21</b>	5%ブドウ糖 100mL 1瓶	<b>休業完了 day21</b>	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) <b>MAX750mg</b> <b>下ルートより</b>	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/rf)	
手技	day3	day2~5	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
5 薬剤	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	生食 100mL 1瓶 フルオロウラル(2400mg/rf) 全量100mL 生食で調節		<b>休業完了 day21</b>		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/rf) 全量を500mL		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) <b>MAX900mg</b> <b>下ルートより</b>	
手技	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(46hr)				持続点滴末梢(120分)	day2.3	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤	<b>休業完了 day7</b>				<b>エンハーツ調製後は点滴 バッグを遮光する</b>		ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		
手技		day8.15.22	day8は、休業週				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day2.3	
7 薬剤		生食 100mL 1瓶 フルオロウラル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	<b>休業完了 day14</b>		調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝 えること			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/rf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技		動注(5日間)					day8.15	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤		シスプラチン(5mg/body)			全量125mL以上のときは①3% ブドウ糖液抜く②速度再計算 必要		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/rf)	
手技		動注(30分)					持続点滴末梢(30分)	day8.15は、休業週	持続点滴末梢(120分)	
9 薬剤							生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/rf)	<b>休業完了 day21</b>		
手技		day10.17.24					持続点滴末梢(90分)		day8.15は、休業週	
10 薬剤		シスプラチン(5mg/body)							<b>休業完了 day21</b>	
手技		動注(30分)					day22は、休業週			
11 薬剤		<b>休業完了 day28</b>						<b>休業完了 day28</b>		
手技										
12 薬剤							アプレピタント内服			
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										
15 薬剤										
手技										
施行日数				1						

コード ナンバリング	sk083-01 76	sk084-02 77	sk085-01 78	sk086-01 79	sk087-01 80	sk088-01 81	sk089-01 82	sk090-01 83
	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(下ルート)
	カルセド	タキソール weekly(100mg/m <sup>2</sup> )	オブジーボ+ヤーボイ (肺小細胞・食道)	イミフィンジ肺維持小細胞・肝	イミフィンジ+GC	イミフィンジ+イジユド (肝細胞がん)	FOLFOX6(CRT) (シユアーフューザー用)	キイトルーダ+FP療法(食道がん)
投与順序	1 薬剤	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注バッグ3mg 1袋 フアモチン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスシヨ-75錠服用	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1800mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1800mg/body)	生食 100mL 1瓶 イジユド注(300mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトルーダ注6.6mg 1V デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(60分)	day1	day8	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	ソルテム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(100mg/m <sup>2</sup> )	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(300mg/body)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1800mg/body)	生食 100mL 1瓶 メインルート Rp.2と同時に	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/m <sup>2</sup> ) Rp.3と同時 下ルートより	生食100mL 1瓶 キイトルーダ (200mg/body) 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 カルセド (40mg/m <sup>2</sup> ) 全開で Rp.1終了後	休薬完了day7	生食 100mL 1瓶	休薬完了day28	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.3と同時に	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 250mL 1袋 イミフィンジ注(1800mg/body)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m <sup>2</sup> ) Rp.2と同時 上ルートより
手技	持続点滴側管(約10分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	day1~3	週1回投与を6回施行し、2週間休薬を1コースとし、反復	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調整	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.2と同時に	生食 250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/m <sup>2</sup> ) Rp2終了後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) Rp3終了後 下ルートより	生食 50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/m <sup>2</sup> ) 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	静脈注射緩徐に 持続点滴末梢(5分)
5 薬剤	休薬完了day21		生食 50mL 1瓶	生食 250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/m <sup>2</sup> ) Rp3終了後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) Rp3終了後 下ルートより	生食 100mL 1袋 フルオロラシル(1800mg/m <sup>2</sup> ) 全量100mL 生食で調整	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	
手技			持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(46分)	持続点滴末梢(60分)	
6 薬剤				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) Rp4終了後 下ルートより	生食 50mL 1瓶 ランタス注20mg 1A Rp4終了後 下ルートより	休薬完了day14	マンニトール 200mL メインルート	
手技			day22	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)		持続点滴末梢(30分)	
7 薬剤			生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(300mg/body)	生食 50mL 1瓶 ランタス注20mg 1A Rp5終了後 下ルートより	day15は休薬		生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)			持続点滴末梢(60分)	
8 薬剤			生食 50mL 1瓶	休薬完了day21			生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより	
手技			持続点滴末梢(5分)	day15は休薬			持続点滴末梢(60分)	
9 薬剤			休薬完了day42				生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/m <sup>2</sup> ) 下ルートより	
手技							持続点滴末梢(24分)	
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
施行日数				1				

コード ナンバリング	sk091-01	sk092-01	sk093-01	sk094-01	sk095-01	sk096-01	sk097-01	
	84	85	86	87	88	89	90	
	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール 名	オプジーボ(2週毎)+FP療法	オプジーボ(4週毎)+FP療法	キイトルーダ+GC(8コースまで)	ピロイ+CapeOX【初回】	ピロイ+CapeOX【2回目~】	ピロイ+mFOLFOLFOX6【初回】	ピロイ+mFOLFOLFOX6【2回目~】	
投与順序	1 薬剤				★Cape Day1から2週間内服	★Cape Day1から2週間内服	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠内服	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技	day1	day2~3	day1	day2~3	day1	day8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1袋 オプジーボ(240mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1袋 オプジーボ(480mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1瓶 キイトルーダ(200mg/body) メインルート	生食1000mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時に	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠内服	生食500mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(約180分)	持続点滴末梢(約180分)
3 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/mf) 下ルートより	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/mf) 下ルートより	生食1000mL 1袋 メインルート Rp.3と同時に	生食1000mL 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食1000mL 1袋 注射用水100mL(溶解用) ピロイ(800mg/mf) ※点滴速度等、下記注意あり	生食1000mL 1袋 注射用水100mL(溶解用) ピロイ(800mg/mf) Rp.3と同時に 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(約180分)	持続点滴末梢(約180分)
4 薬剤	生食50mL 1瓶 メインルート 全開で		生食50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食50mL 1瓶 メインルート 全開で 休薬完了day28	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時に	生食250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/mf) 下ルートより	5%ブドウ糖250mL オキサリプラチン注(130mg/mf)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/mf) Rp.4と同時に 上ルートより
手技	持続点滴末梢(5分)	day15	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	生食100mL 1瓶 オプジーボ注(240mg/body)	生食500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	生食250mL 1袋 シスプラチン注(25mg/mf) Rp3終了後 下ルートより	生食100mL 1瓶 シスプラチン注(25mg/mf) Rp2終了後 下ルートより	生食100mL 1瓶 ゲムスタビン(1000mg/mf) 下ルートより	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/mf) 全開で
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に
6 薬剤	マンニトール 200mL メインルート	生食50mL 1瓶 メインルート 全開で	マンニトール 200mL メインルート	生食100mL 1瓶 ゲムスタビン(1000mg/mf) Rp4終了後 下ルートより	生食50mL 1瓶 ランタス注20mg 1A Rp3終了後 下ルートより		生食100mL フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調節	生食100mL フルオロウラシル(2400mg/mf) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)
7 薬剤	生食500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量500mLに 上ルートより	休薬完了day28	生食500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量500mLに 上ルートより	生食50mL 1瓶 ランタス注20mg 1A Rp5終了後 下ルートより		ピロイ点滴速度 ●投与開始~30分:125mL/hr ●30~60分:250mL/hr ●60分以降:500mL/hr ※悪心・嘔吐・発熱・悪寒など出現時は投与STOP、症状回復後に半分の速度で再開	ピロイ点滴速度 ●投与開始~30分:125mL/hr ●30~60分:250mL/hr ●60分以降:500mL/hr ※悪心・嘔吐・発熱・悪寒など出現時は投与STOP、症状回復後に半分の速度で再開	ピロイ点滴速度 ●投与開始~30分:125mL/hr ●30~60分:250mL/hr ●60分以降:500mL/hr ※悪心・嘔吐・発熱・悪寒など出現時は投与STOP、症状回復後に半分の速度で再開
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(10分)	day15は休薬			
8 薬剤	生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day14
手技	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	day15は休薬				
9 薬剤	生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/mf) 下ルートより		生食500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/mf) 下ルートより					
手技	持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(24hr)					
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
施行日数								

コード ナンバリング	sk098-01	sk100-01	sk101-01	sk102-01	sk103-01	sk104-01	sk105-01
	入院 91	入院・外来 93	入院・外来 94	入院 95	入院 96	入院・外来 97	外来 98
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	キイトルーダ+GC[9コース以降]	キイトルーダ+トラスツズマブ+ CapeOX、SOX[初回]	キイトルーダ+トラスツズマブ+ CapeOX、SOX[2コース目以降]	キイトルーダ+トラスツズマブ+FP[初回]	キイトルーダ+トラスツズマブ+FP[2コース目以降]	オブジーボ+ヤーボイ	【特殊】ダラキューロ+IRIS
投与順序	1 薬剤	★Cape or S-1 Day1から2週間内服	★Cape or S-1 Day1から2週間内服			生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(80mg/body)	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶
手技	day1	day8		day1	day2~5	day1	day2~5
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ(200mg/body)	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ(200mg/body)	生食 100mL 1袋 キイトルーダ(200mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食100mL 1袋 キイトルーダ(200mg/body) 上ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2回目以降は、 8mg/kg 認容性良:90→30分へ短縮可	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf) 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2回目以降は、 6mg/kg 認容性良:90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf) 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	グロセトロン注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	グロセトロン注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキン注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1) 1L/Day 摂取	休薬完了day21	アロキン注ハック 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート 経口補水液(OS1) 1L/Day 摂取	休薬完了day21
手技	持続点滴末梢(30分)	day15は休薬	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤		休薬完了day21	5%ブドウ糖250mL オキザリブ注(130mg/mf)	5%ブドウ糖250mL オキザリブ注(130mg/mf)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	休薬完了day21
手技	day15は休薬		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	day8、15は、休薬週
6 薬剤				生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	※シスプラチンは、原則6コ ースまで。	生食 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq KCl注 10mEq メインルートより	4回投与後、オブジーボ単剤へ
手技		day8、15は、休薬週	day8、15は、休薬週	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	休薬完了day21
7 薬剤		休薬完了day21	休薬完了day21	マンニトール メインルート 200mL	※CPS>1のみ	マンニトール メインルート 200mL	※CPS>1のみ
手技				持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤		※CPS>1のみ	※CPS>1のみ	生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン(80mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	※ダラキューロq4w、IRIS q3W→ 間日投与の時のみに使用する レジメン ※前投薬のDEX注は不要(DLd 療法で、朝食後にDEX内服する ため)
手技				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
9 薬剤				生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより		生食 500mL 1袋 KCl注 10mEq メインルートより	ダラキューロ口調製前、常温で30 分以上置く
手技				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
10 薬剤				生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル(800mg/mf) 下ルートより	
手技				持続点滴末梢(24hr)		持続点滴末梢(24hr)	
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							1
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
施行日数						皮膚科4と共通	14