





b028-01、b029-01、b030-01		b031-01		b032-01		b033-01		b034-01		b035-01		b036-01		b037-01		b038-01		b039-01		b040-01		b041-01		b042-01			
入院・外来		入院		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来		入院・外来	
ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ	
GCVF療法 1, 2, 3~		ロイスタチン		DCyBorD療法1, 2		DCyBorD療法3~6		DCyBorD療法7~		EPd療法(50kg未満)1, 2		EPd療法(50kg未満)3~		EPd療法(50-90kg)1, 2		EPd療法(50-90kg)3~		EPd療法(90kg超)1, 2		EPd療法(90kg超)3~		weeklyKd療法1		weeklyKd療法2~			
GCVF療法		R療法(血液15使用)		生食 500mL 1瓶 ロイスタチン(0.02mg/kg)		デキサメタゾンシリンジ 内服処方あり		デキサメタゾンシリンジ 内服処方あり		デキサメタゾンシリンジ 内服処方あり		day1~21:67リシ4mg内服処方あり day8,15,22:リシ428mg内服処方あり(76歳以上は8mg)		day1~21:67リシ4mg内服処方あり day8,15,22:リシ428mg内服処方あり(76歳以上は8mg)		day1~21:67リシ4mg内服処方あり day8,15,22:リシ428mg内服処方あり(76歳以上は8mg)		day1~21:67リシ4mg内服処方あり day8,15,22:リシ428mg内服処方あり(76歳以上は8mg)		day1~21:67リシ4mg内服処方あり day8,15,22:リシ428mg内服処方あり(76歳以上は8mg)		day22 レナデュクス40mg内服		day22 レナデュクス40mg内服			
day1		GOVP療法の前またはday2~のいずれか		持続点滴末梢(24時間)		day1, 8, 15, 22		day1, 15		day1		day1, 8, 15, 22		day1		day1, 8, 15, 22		day1		day1, 8, 15, 22		day1		day1, 8, 15			
7-エピドコ注100mg 1袋		生食 50mL 1瓶 ソルコチン100mg 1V		生食 50mL 1瓶		ダラキユーロ(16mL/body) シリンジ調製 生食20mL 1A シリンジ調製		ダラキユーロ(16mL/body) シリンジ調製 生食20mL 1A シリンジ調製		ダラキユーロ(16mL/body) シリンジ調製 生食20mL 1A シリンジ調製		生食 100mL 1瓶 デキサメタゾン 1V フェモジン注20mg 1A Ro.1と同時にスリネコウ5錠加へる服用		生食 100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V フェモジン注20mg 1A Ro.1と同時にスリネコウ5錠加へる服用		生食 100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V フェモジン注20mg 1A Ro.1と同時にスリネコウ5錠加へる服用		生食 100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V フェモジン注20mg 1A Ro.1と同時にスリネコウ5錠加へる服用		生食 100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V フェモジン注20mg 1A Ro.1と同時にスリネコウ5錠加へる服用		5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V フェモジン注20mg 1A		5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V フェモジン注20mg 1A			
持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢		皮下投与		皮下投与		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)			
生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/㎡) MAX 2mg/body 5~9分で投与		生食 50mL 1瓶 ボラミン 5mg 1V		休薬完了 day28		ボルネゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリンジ調製		ボルネゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリンジ調製		休薬完了 day28		生食 100mL 1瓶		生食 100mL 1瓶		生食 100mL 1瓶		生食 100mL 1瓶		生食 100mL 1瓶		5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水20mL 1A カイロリス注(70mg/㎡) 注射用水は静脈用 全量を100mLに		5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(70mg/㎡) 注射用水は静脈用 全量を100mLに			
持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(15分)				皮下投与		皮下投与		持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)			
生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (19-ル目:780mg/㎡) (29-ル目:1780mg/㎡) (39-ル以降目:1000mg/㎡)		生食 500mL 1袋 ソルコチン (370mg/㎡) 開始1時間→25mL/hr 2日目以降、忍容性…		休薬完了 day28		ゲムシタピン調製、常量で30分以上置く		ゲムシタピン調製、常量で30分以上置く		生食250mL 150mL I.I7リシ注(10mg/kg) 1瓶 注射用水100mL 1瓶		生食250mL 150mL I.I7リシ注(10mg/kg) 1瓶 注射用水100mL 1瓶		生食250mL 150mL I.I7リシ注(10mg/kg) 1瓶 注射用水100mL 1瓶		生食250mL 150mL I.I7リシ注(10mg/kg) 1瓶 注射用水100mL 1瓶		生食250mL 150mL I.I7リシ注(10mg/kg) 1瓶 注射用水100mL 1瓶		生食250mL 150mL I.I7リシ注(10mg/kg) 1瓶 注射用水100mL 1瓶		生食 50mL 1瓶		生食 50mL 1瓶			
持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢				day8, 22		下記参照		下記参照		下記参照		下記参照		下記参照		下記参照		下記参照		持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(5分)			
生食 500mL 1袋 エンドキサン (790mg/㎡)		休薬完了 day1		ダラキユーロ調製、常量で30分以上置く		ボルネゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリンジ調製		ボルネゾミブ(1.3mg/㎡) 生食20mL 1A シリンジ調製		【初回】 開始→30分30mL/hr 認容性良→30~60分60mL/hr 認容性良→60分→終了120mL/hr		【3コース目】 開始→30分180mL/hr 認容性良→30→終了240mL/hr		【初回】 開始→30分30mL/hr 認容性良→30~60分60mL/hr 認容性良→60分→終了120mL/hr		【3コース目】 開始→30分180mL/hr 認容性良→30→終了240mL/hr		【初回】 開始→30分30mL/hr 認容性良→30~60分60mL/hr 認容性良→60分→終了120mL/hr		【3コース目】 開始→30分180mL/hr 認容性良→30→終了240mL/hr		休薬完了 day28		休薬完了 day28			
持続点滴末梢(120分)				皮下投与																		day8, 15					
休薬完了 day1				休薬完了 day28		休薬完了 day28		休薬完了 day28		【2回目】 認容性良→開始→30分180mL/hr 認容性良→30→終了240mL/hr		【4コース目以降】 認容性良→300mL/hr		【2回目】 認容性良→開始→30分180mL/hr 認容性良→30→終了240mL/hr		【4コース目以降】 認容性良→300mL/hr		【2回目】 認容性良→開始→30分180mL/hr 認容性良→30→終了240mL/hr		【4コース目以降】 認容性良→300mL/hr		5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V ボラミン注5mg 1A フェモジン注20mg 1A		5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキサメタゾン注8.6mg 1V ボラミン注5mg 1A フェモジン注20mg 1A			
day8		day1~5 フロドコゾル 100mg/body 前投薬、支持療法 処方あり		ダラキユーロ調製、常量で30分以上置く		ダラキユーロ調製、常量で30分以上置く		【3回目以降】 認容性良→300mL/hr		休薬完了 day28		【3回目以降】 認容性良→300mL/hr		休薬完了 day28		【3回目以降】 認容性良→300mL/hr		休薬完了 day28		【3回目以降】 認容性良→300mL/hr		5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(70mg/㎡) 注射用水は静脈用 全量を100mLに		5%ブドウ糖100mL 1瓶 注射用水100mL 1瓶 カイロリス注(70mg/㎡) 注射用水は静脈用 全量を100mLに			
持続点滴末梢(30分)								休薬完了 day28		エムブリシディの 生食100mL抜く!		休薬完了 day28		休薬完了 day28		エムブリシディの 生食150mL抜く!		休薬完了 day28		エムブリシディの 生食150mL抜く!		生食 50mL 1瓶					
生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (19-ル目:780mg/㎡) (29-ル目:1780mg/㎡) (39-ル以降目:1000mg/㎡)		R療法、GOVP療法(day1,8)を3つのシリンジに分け、組み合わせてGOVP療法として投与。休薬完了 day21であることを確認すること。																									
持続点滴末梢(30分)																											
生食 50mL 1瓶 メンルート 全量で		day1にリソキシマブ投与の場合は血液18,127参照								エムブリシディの 生食100mL抜く!						エムブリシディの 生食150mL抜く!						休薬完了 day28					
持続点滴末梢(5分)																											
休薬完了 day1																											



bk053-01	bk054-01	bk055-01	bk056-01	bk057-01	bk058-01	bk059-01	bk060-01	bk061-01	bk062-01	bk063-01		
入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ		
GB療法1	GB療法2~6	GB療法7~	DNR-AraC療法	R-CHOP	IsaK療法 1クール目	IsaK療法 2クール目以降	APL寛解導入B	APL寛解導入C	APL寛解導入D(A追加)	APL寛解導入D(B追加)		
ガザイバ投与開始30分前に 前投薬投与	ガザイバ投与開始30分前に 前投薬投与	ガザイバ投与開始30分前に 前投薬投与	キロサイドはケモセーフ経路 での投与	生食 50mL 1瓶 ポララミン 5mg 1V	生食 50mL 1瓶 ポララミン 5mg 1V	サークリサ速度表、払い出すとき添付 day1は「0.5倍」を使用	サークリサ速度表、払い出すとき添付 day2は「2.0倍」を使用	サークリサ速度表、払い出すとき添付 day1は「0.5倍」を使用	キロサイドはケモセーフ経路 での投与	キロサイドはケモセーフ経路 での投与	キロサイドはケモセーフ経路 での投与	キロサイドはケモセーフ経路 での投与
day1	day1	day1	day1	持続点滴末梢(15分)	day8, 15	day22	day1, 15	day1	day1	day1	day1	day1
生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A カゾール同時投与	生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A カゾール同時投与	生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A カゾール同時投与	アロキシ注ハヴ 1袋 メインルート	生食 50mL 1瓶 ポララミン 5mg 1V	生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	アロキシ注ハヴ 1袋 メインルート	アロキシ注ハヴ 1袋 メインルート	アロキシ注ハヴ 1袋 メインルート	アロキシ注ハヴ 1袋 メインルート
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
カイトリル注ハヴ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注ハヴ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 500mL 1袋 リソキシ 37mg/ml 開始時間→30分/日 2回以上、必要時...	アゼリオ注100mg 1袋	アゼリオ注100mg 1袋	アゼリオ注100mg 1袋	アゼリオ注100mg 1袋	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
生食 50mL 1瓶 ヘンダシ注(80mg/ml) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 50mL 1瓶 ヘンダシ注(80mg/ml) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 250mL 1袋 ガザイバ注(1000mg/body) 全量200mL	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 カンピロ (14mg/ml) MAX. 2mg/body 5~6分で投与	生食100mL 1瓶	生食100mL 1瓶	生食100mL 1瓶	生食100mL 1瓶	生食 500mL 1袋 アゼリオ注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 アゼリオ注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 アゼリオ注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 アゼリオ注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート
持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)
生食 250mL 1袋 ガザイバ注(1000mg/body) 全量200mL	生食 250mL 1袋 ガザイバ注(1000mg/body) 全量200mL	開始～30分25mL/hr 30分～225mL/hr	生食1000mL 1袋 Ro.2終了後 メインルート	生食 50mL 1瓶 カンピロ (14mg/ml) MAX. 2mg/body 5~6分で投与	生食250mL 1袋 サークリサ注(10mg/kg) 全量200mL	生食250mL 1袋 サークリサ注(10mg/kg) 全量200mL	生食250mL 1袋 サークリサ注(10mg/kg) 全量200mL	生食250mL 1袋 サークリサ注(10mg/kg) 全量200mL	生食1000mL 1袋 Ro.2終了後 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.2終了後 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.2終了後 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.2終了後 メインルート
			持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(5分)	下記参照	下記参照	下記参照	下記参照	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)
開始～30分12.5mL/hr 30分～60分25mL/hr 60分～90分37.5mL/hr 90分～120分50mL/hr	開始～30分25mL/hr 30分～225mL/hr	休薬完了 day9		生食 100mL 1瓶 ドキシリジン (80mg/ml)	5ブドウ糖50mL 1瓶	5ブドウ糖50mL 1瓶	点滴速度換算表を用いて投与速度を 確認(体重により異なる) 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:275mg/hr 認容性良～90分～120分:375mg/hr 認容性良～120～400mg/hr	5ブドウ糖50mL 1瓶				
day2	day2		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24時間)
120～150分62.5mL/hr 150～180分75mL/hr 180～210分87.5mL/hr 210分～100mL/hr			生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 500mL 1袋 エンドキサン (70mg/ml) 下ルート	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水20mL 1A カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水100mL 1瓶 カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに	休薬完了 day28	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水100mL 1瓶 カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 100mL 1瓶 タリマシ注(80mg/ml) Ro.2同時 上ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート
day2	day2		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24時間)
カイトリル注ハヴ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注ハヴ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	休薬完了 day21	点滴速度換算表を用いて投与速度を 確認(体重により異なる) 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:275mg/hr 認容性良～90分～120分:375mg/hr 認容性良～120～400mg/hr	day23 レナデックス20mg内服 (skipの可能性あり)	点滴速度換算表を用いて投与速度を 確認(体重により異なる) 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:275mg/hr 認容性良～90分～120分:375mg/hr 認容性良～120～400mg/hr	点滴速度換算表を用いて投与速度を 確認(体重により異なる) 開始～60分:175mg/hr 認容性良～60～90分:275mg/hr 認容性良～90分～120分:375mg/hr 認容性良～120～400mg/hr	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食1000mL 1袋 Ro.15同時 メインルート
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(24時間)		持続点滴末梢(24時間)	day9, 16	day2, 9, 16	day2, 9, 16	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)
生食 50mL 1瓶 ヘンダシ注(80mg/ml) 溶解後8時間以内に投与終了	生食 50mL 1瓶 ヘンダシ注(80mg/ml) 溶解後8時間以内に投与終了		生食1000mL 1袋 Ro.1終了後 メインルート	内服、解熱剤予防的に内服 することあり。	認容性良～90分～120分275mg/hr 認容性良～120～150分375mg/hr 認容性良～150分～180分375mg/hr 認容性良～180分～240分400mg/hr		5ブドウ糖100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	5ブドウ糖100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	生食1000mL 1袋 Ro.1終了後 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.1終了後 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.1終了後 メインルート	休薬完了 day14
持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)		持続点滴末梢(23時間30分)	day2	持続点滴末梢(15分)	day2	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	持続点滴末梢(23時間30分)	
ベンドメスタン 凍結時、室温で溶解後に調製	休薬完了 day28		<リソキシンの投与速度> 【初回】 開始時間→40分/日 その1時間→100mL/hr その後1時間→200mL/hr その後→300mL/hr	5ブドウ糖100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A フモキシ注20mg 1A デキサート注6.6mg 3V	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水100mL 1瓶 カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水100mL 1瓶 カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水100mL 1瓶 カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水100mL 1瓶 カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用 全量を100mLに				アプレビタント内服
day8,15			day5, 7	day5, 7	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day3, 3	day7	day7	day7	
生食100mL 1瓶 ポララミン5mg 1A デキサート注6.6mg 1V カゾール同時投与	ベンドメスタン 凍結時、室温で溶解後に調製		生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	【2回目以降、認容性あり】 ①②のどちらかで投与 ①開始30分後→100mL/hr その後30分後→200mL/hr その後→300mL/hr	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水20mL 1A カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水20mL 1A カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水20mL 1A カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用	5ブドウ糖100mL 1瓶 注射液水20mL 1A カイトリル注(80mg/ml) 注射液水は溶解用	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	生食 500mL 1袋 キロサイド注(100mg/ml) Ro.2同時 下ルート	
持続点滴末梢(15分)			持続点滴末梢(24時間)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	
生食100mL 1瓶			生食1000mL 1袋 Ro.15同時 メインルート	必ず治療の指示があれば、 以下の速度可 開始30分→200mL/hr その後→400mL/hr 参照: 重篤な心疾患なし、 血小板35000/μL未満	day22, 23 レナデックス20mg内服 (skipの可能性あり)		生食1000mL 1袋 Ro.15同時 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.15同時 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.15同時 メインルート	生食1000mL 1袋 Ro.15同時 メインルート		
持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(24時間)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	持続点滴末梢(24時間)	
生食 200mL 1袋 ガザイバ注(1000mg/body) 全量200mL			休薬完了 day28					休薬完了 day14	休薬完了 day14	休薬完了 day14		
開始～30分25mL/hr 30分～60分50mL/hr 60～90分75mL/hr 90分～100mL/hr			アプレビタント内服					アプレビタント内服 ベサマイド45mg/ml 分3内服	アプレビタント内服 ベサマイド45mg/ml 分3内服	アプレビタント内服 ベサマイド45mg/ml 分3内服		
day28												





	bk095-01	bk096-01	bk097-01	bk098-01	bk099-01	bk100-01	bk101-01	bk102-01	bk103-01	bk104-01	bk105-01	bk106-01	bk107-01	bk108-01	bk109-01			
	入院	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来			
	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ			
心電図	MA療法	Low dose Ara-C療法(1日1回)	Low dose Ara-C療法(1日2回)	GDP療法	(R)-GDP療法	R-CHP+Pola	CHP+Pola	CHP+Polarit	R-CHP+Polarit	Pola単剤	R+Pola	GDP療法	(R)-GCD療法	Pola-B	Pola-BR			
	day1の12時以降投与分のみを調製室から払い出し、その他は入患者約室計(カート)で払い出し	シリンジ調製 シリンジキャップをつけて払い出し	シリンジ調製 シリンジキャップをつけて払い出し			生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	プレドニゾン注20mg 1A ドキシタキソン注(16mg/body) ポライビー注(40mg/body/生食注 4mL)	プレドニゾン注20mg 1A ドキシタキソン注(16mg/body) ポライビー注(40mg/body/生食注 4mL)	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	day2→4 デキザメタゾン内服 40mg	day2→4 デキザメタゾン内服 40mg	ベンザムステン凍結時、室温で溶解後に調製	ベンザムステン凍結時、室温で溶解後に調製			
	day4	day1~14	day1~14	day1	day1	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	腹腔内注(標準)	腹腔内注(標準)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)		day1	day1	day1			
生食 100mL 1瓶 デキザメタゾン注6.6mg 6V メインルート	別紙	キロサイド注(20mg/1ml) シリンジ調製	キロサイド注(20mg/body) シリンジ調製	アロキシ注ハング 1袋 デキザメタゾン注6.6mg 6V	アロキシ注ハング 1袋 デキザメタゾン注6.6mg 6V	カイトリル注 1袋 ボララミン 5mg 1A	カイトリル注 1袋 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	グラニセロン注ハング 1袋 デキザメタゾン注6.6mg 6V	グラニセロン注ハング 1袋 デキザメタゾン注6.6mg 6V	グラニセロン注ハング 1袋 デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	グラニセロン注ハング 1袋 デキザメタゾン注6.6mg 1.5V			
中心静脈(30分)		皮下注射	皮下注射	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)			
生食 50mL 1瓶 リツキサン(370mg/body) MAX 2mg/body 上ルートより5~6分で投与	休養完了 day21	休養完了 day14	キロサイド注(20mg/body) シリンジ調製 ①投与12時間後に原則投与 ②主治医指示あれば投与時間変更可	生食 100mL 1瓶 ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	カイトリル注 1袋 ボララミン 5mg 1A	カイトリル注 1袋 ボララミン 5mg 1A	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) ゲムシタキソン(1000mg/1ml)		
中心静脈(5分)		皮下注射	皮下注射	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)			
生食 100mL 1瓶 ドキシタキソン(80mg/1ml) 上ルートより5~6分で投与			休養完了 day14	ソルゾムA3A500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq	ソルゾムA3A500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 フルコチーフ100mg 1TV MAX700mg	生食 250mL 1袋 フルコチーフ100mg 1TV MAX700mg	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1A			
中心静脈(24時間)				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)		
				マンニトール 200mL	マンニトール 200mL	生食 100mL 1瓶 ドキシタキソン(80mg/1ml)	生食 500mL 1袋 エンドキサン(700mg/1ml)	生食 100mL 1瓶 ドキシタキソン(80mg/1ml)	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり	休養完了 day1	休養完了 day1			
day11				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day8	day8	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
生食 50mL 1瓶 リツキサン(370mg/body) MAX 2mg/body 上ルートより5~6分で投与				ソルゾムA3A500mL 1袋	ソルゾムA3A500mL 1袋	休養完了 day21	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	休養完了 day1	生食 500mL 1袋 エンドキサン(700mg/1ml)	生食 100mL 1瓶 ドキシタキソン(80mg/1ml)	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	
中心静脈(5分)				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	day2	day2	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
生食 50mL 1瓶 リツキサン(370mg/body) MAX 2mg/body 上ルートより5~6分で投与				ソルゾムA3A500mL 1袋	ソルゾムA3A500mL 1袋	休養完了 day21	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	休養完了 day1	生食 500mL 1袋 エンドキサン(700mg/1ml)	生食 100mL 1瓶 ドキシタキソン(80mg/1ml)	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	
day12-14				day9	day9		前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	休養完了 day21	5mLシリンジで調製 ①MTX50mg1Vあたり生食 4mLで溶解 ②溶解液1.2mLと40μL 2mLを混合 ③混合液で7日間を溶解 ※ケモセーフ経験者が調製	5mLシリンジで調製 ①MTX50mg1Vあたり生食 4mLで溶解 ②溶解液1.2mLと40μL 2mLを混合 ③混合液で7日間を溶解 ※ケモセーフ経験者が調製	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可
生食 50mL 1瓶 デキザメタゾン注6.6mg 6V				生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	生食 50mL 1瓶 フルコチーフ100mg 1TV	<リツキサンの投与速度> 【初回】 開始30分→50mL/hr その後1時間→100mL/hr その後1時間→200mL/hr その後→300mL/hr	ポライビーは過量充填されているため、バイアル余りができるところあり	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	5mLシリンジで調製 ①MTX50mg1Vあたり生食 4mLで溶解 ②溶解液1.2mLと40μL 2mLを混合 ③混合液で7日間を溶解 ※ケモセーフ経験者が調製	5mLシリンジで調製 ①MTX50mg1Vあたり生食 4mLで溶解 ②溶解液1.2mLと40μL 2mLを混合 ③混合液で7日間を溶解 ※ケモセーフ経験者が調製	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	GODはday21まで休養する	生食 100mL 1瓶 ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	休養完了 day21	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可
持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)									持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	
day12-14はカート払い出し				生食 100mL 1瓶 ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1V	【2回目以降、認容性あり】 ①かこのどちらかで投与可 ①開始30分後→100mL/hr その後30分間→200mL/hr その後→300mL/hr	ポライビーは過量充填されているため、バイアル余りができるところあり	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり			生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可
休養完了 day21				休養完了 day21	休養完了 day21	②主治医の指示があれば、以下の速度可 開始30分→200mL/hr その後→400mL/hr 参照 重篤な心疾患なし、採血リンパ球数5000/μL未満	ポライビーは過量充填されているため、バイアル余りができるところあり	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり			生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可
				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)									持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり	
				生食 100mL 1瓶 ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1V	【2回目以降、認容性あり】 ①かこのどちらかで投与可 ①開始30分後→100mL/hr その後30分間→200mL/hr その後→300mL/hr	ポライビーは過量充填されているため、バイアル余りができるところあり	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり			生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可
				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)									持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	前投薬 支持療法 処方あり	前投薬 支持療法 処方あり	
				生食 100mL 1瓶 ゲムシタキソン(1000mg/1ml)	生食 50mL 1瓶 ボララミン 5mg 1V	【2回目以降、認容性あり】 ①かこのどちらかで投与可 ①開始30分後→100mL/hr その後30分間→200mL/hr その後→300mL/hr	ポライビーは過量充填されているため、バイアル余りができるところあり	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり day1~5 PSL内服	前投薬 支持療法 処方あり			生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 50mL 1瓶 ヘンザムステン注(90mg/1ml) デキザメタゾン注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 注射用水20mL 1A リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 リツキサン(370mg/1ml) リツキサン(370mg/1ml) ポライビー(1.8mg/kg/2回) 2回目を以降、認容性 良 90分→30分 短縮可















