

MA療法

休業完了 day21

day-1		day1		day2	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-					
1-		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
2-					
3-					
4-		①ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
5-					
6-					
7-		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
8-					
9-			9-30 アロキシン点滴静注パック		
10-		②ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	20-10 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V	②ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	10-15 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V
11-			生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A カトキセチン (200mg/d) 下ルート、2時間中		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A カトキセチン (200mg/d) 下ルート、2時間中
12-			生食100mL 1袋 メイロン20mL 1A カトキセチン (300mg/d) 下ルート、2時間中		生食100mL 1袋 メイロン20mL 1A カトキセチン (300mg/d) 下ルート、2時間中
13-		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V/30分
14-					
15-					
16-		③ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
17-					
18-					
19-		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20-					
21-			20-22 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V		20-22 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V
22-	④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A ④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 5分で投与
23-			22-25-20 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V		22-25-20 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V

10時までに調製して払い出し

10時までに調製して払い出し

上記の外枠が      のRpのみケモ室から払い出し  
それ以外は注射カードで払い出し

day3		day4		day5	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-					
1-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
2-					
3-					
4-	①ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与	①ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与
5-					
6-					
7-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
8-					
9-					
10-	②ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与	②ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与
11-		10:05-20 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V/30分			
12-		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A カトキセチン (200mg/d) 下ルート、2時間中			
13-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
14-					
15-					
16-	③ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与	③ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与
17-					
18-					
19-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
20-					
21-					
22-	④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与	④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ゾルデムSA500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④中食500mL 1瓶 メイロン20mL 1A 生食500mL 1瓶 5分で投与
23-		22:05-20 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V			22:05-20 生食100mL 1瓶 メイロン20mL 1A ダイオキシン300mg O. 5V

10時までに調製して払い出し

<レボホリナート変更レジメン>  
ロイコポリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり  
**ロイコポリン3mg SA → レボホリナート 7.5mg**