

bn018-01 HD-MTX 投与スケジュール		1クール day7							
day1		day2		day3		day4		day5	
メイン	副管(下ルート)	メイン	副管(下ルート)	メイン	副管(下ルート)	メイン	副管(下ルート)	メイン	副管(下ルート)
0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-30 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg O. 5V	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
1-				1-			1-		
2-				2-			2-		
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
4-				4-			4-		
5-				5-			5-		
6-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
7-				7-			7-		
8-				8-			8-		
9-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
10-		11-30 グラニセトロン 1袋		10-			10-		
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg O. 5V		11-			11-		
12-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A マトレキセト (3500mg/mt) 全量500mLに 下ルート	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
13-				13-			13-		
14-				14-			14-		
15-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
16-				16-			16-		
17-				17-			17-		
18-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
19-				19-			19-		
20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg O. 5V		20-			20-		
21-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
22-				22-			22-		
23-				23-			23-		

day1の12時以降投与のみケモ調製室から払い出し
その他は入院予約注射(カート)で払い出し

<レボホリナート変更レジメン>
ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり
ロイコボリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg