

bn130-01 MPV(レボホリナート代替) 投与スケジュール		1クール day7									
		day1		day2		day3		day4		day5	
		側管(下ルート)		側管(下ルート)		側管(下ルート)		側管(下ルート)		側管(下ルート)	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-30 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O.5V	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
1-			1-			1-			1-		
2-			2-			2-			2-		
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
4-			4-			4-			4-		
5-			5-			5-			5-		
6-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
7-			7-			7-			7-		
8-			8-		30-9 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O.5V	8-			8-		
9-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
10-		11-30 グラニセトロン 1袋	10-			10-			10-		
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O.5V	11-			11-			11-		
12-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/㎡) MAX 2mg/body 下ルート 5~6分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
13-			13-			13-			13-		
14-			14-			14-			14-		
15-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A メトキシドール (3500mg/㎡) 全量500mLに 下ルート	15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
16-			16-			16-			16-		
17-			17-			17-			17-		
18-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
19-			19-			19-			19-		
20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O.5V	20-			20-		
21-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
22-			22-			22-			22-		
23-			23-			23-			23-		

day1の12時以降投与分のみケモ調製室から払い出し
その他は入院予約注射(カート)で払い出し

術数コースのみプロカルバジン(100mg/㎡ 7日間)内服

<レボホリナート変更レジメン>
ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり
ロイコボリン3mg SA → レボホリナート 7.5mg

<レボホリナート代替レジメン ルール>
・レボホリナートは全て病棟で調製する
・交付は注射カートからとする。