

血 ALL202-O 地固めC2

休業完了 day21

day-1, 14		day 1, 15		day 2, 16	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-		0-		0-	
1-		1-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	1-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
2-		2-		2-	
3-		3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
4-		4-		4-	
5-		5-		5-	
6-		6-		6-	
7-		7-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	7-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
8-		8-	8:55-9:25 アロキシ点滴静注 30分 9:25-9:30 オンコピン1.3mg/nf(MAX 2mg) 生食 50mL 9:30-10:00 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg 0.5V	8-	
9-		9-		9-	
10-		10-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	10-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A 10:00- 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg 0.5V 30分
11-		11-		11-	
12-		12-	プレドニン注20mg 1A メトトレキセート(15mg/body) 生食注 4+2mL ※MTX 開始2時間後～終了までに 実施 髄腔内注(腰椎)	12-	
13-		13-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	13-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
14-		14-		14-	
15-		15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
16-		16-		16-	
17-		17-		17-	
18-		18-		18-	
19-		19-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	19-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
20-		20-		20-	
21-		21-		21-	
22-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	22-	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A	22-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A 22:00- ①ロイコボリン注 15mg 生食50mL 1瓶 5分間で 5分で投与
23-		23-		23-	※ロイコボリンに続いて 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg 0.5V 30分

day 3-5, 17-19			
メイン	側管(下ルート)		
0-		0-	
1-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	1-	
2-		2-	
3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3-	10:00- ①ロイコボリン注 15mg 生食50mL 1瓶 5分間で 5分で投与
4-		4-	
5-		5-	
6-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	6-	
7-		7-	
8-		8-	
9-		9-	
10-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	10-	10:00- ②ロイコボリン注 715mg 生食50mL 1瓶 5分間で 5分で投与 ※ロイコボリンに続いて 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg 0.5V 30分
11-		11-	
12-		12-	
13-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	13-	
14-		14-	
15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	15-	16:00- ③ロイコボリン注 15mg 生食50mL 1瓶 5分間で 5分で投与
16-		16-	
17-		17-	
18-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	18-	
19-		19-	
20-		20-	
21-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	21-	22:00- ④ロイコボリン注 15mg 生食50mL 1瓶 5分間で 5分で投与
22-		22-	※ロイコボリンに続いて 生食100mL 1瓶 ダイマックス注500mg 0.5V 30分
23-		23-	

※MTXは9時30分までに調製して払い出し  
※腫注は11時30分までに調整して払い出し

上記の外枠が [ ] のRpのみケモ室から払い出し  
それ以外は注射カートで払い出し

<レボホリナート変更レジメン>  
ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり  
ロイコボリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg

<レボホリナート代替レジメン ルール>  
・レボホリナートは全て病棟で調製する  
・交付は注射カートからとする。