

bn181 Ph(-)B-ALL213 地固めC2・C5, L-ASP [im]

休薬完了 day21

day1, 15		day2, 16		day3, 17		day4-5, 18-19		
メイン	側管 (下ルート)	メイン	側管 (下ルート)	メイン	側管 (下ルート)	メイン	側管 (下ルート)	
0-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0:00-0:30 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V	0-	0:00-0:30 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V	0-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
1-			1-	0:30-3:00 ①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	1-		1-	
2-			2-		2-		2-	
3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
4-			4-		4-		4-	
5-			5-		5-	5:00-5:05 ①ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ	5-	5:00-5:05 ①ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ
6-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	6-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	6-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
7-			7-		7-		7-	
8-			8-		8-		8-	
9-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	9:55-10:25 アロキシン点滴静注パック	9-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	9-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	9-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
10-		10:25-10:30 生食50mL ワコピン注 (1.3mg/㎡) ※MAX 2mg/body 下ルート	10-		10-		10-	
11-		10:30-11 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A ワコピネット (3000mg/㎡) 下ルート、24時間で 全量500mL ※50歳以上: 1500mg/㎡	11-	11-11:30 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 30分	11-	11-11:30 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 30分 11:30-11:35 ②ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ	11-	11-11:30 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 30分 11:30-11:35 ②ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ
12-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		12-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	12-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	12-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
13-		ブレドニン注20mg 1A メソトレキセート (15mg/body) キロサイド注 (40mg/body) 生食注 4mL ※MTX 開始後に実施 髄腔内注 (腰椎)	13-		13-	ロイナゼ注 (10000U/㎡) 5%ブドウ糖20mL 1A ※60歳以上65歳未満: 5000U/㎡ 筋肉内注射	13-	
14-			14-		14-		14-	
15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	15-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
16-			16-		16-		16-	
17-			17-		17-	17:00-17:05 ③ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ	17-	17:00-17:05 ③ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ
18-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		18-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	18-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	18-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
19-			19-		19-		19-	
20-			20-		20-		20-	
21-	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A	21-	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A	21-	④ソルデム500mL 1袋 メイロン20mL 1A
22-			22-	22:30-23 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 30分	22-	22:30-23 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 30分	22-	22:30-23 生食100mL 1瓶 ①イフェキサ注500mg 0.5V 30分
23-			23-	23-23:05 ①ロイナゼ注3mg 16.7A (50mg) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与	23-	23-23:05 ①ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ	23-	23-23:05 ①ロイナゼ注3mg (15mg/㎡) 生食50mL 1瓶 全開で5分で投与 ※ロイナゼ イは3mgの倍数でオダ

ワコピン: 10時までに調製して払い出し
ワコピネット: 10時30分までに調製して払い出し

ロイナゼ: 11時30分までに調製して払い出し

<レボホリナート変更レジメン>

ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替
ロイコボリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg

のRpのみケモ室から払い出し