

コード ナンバリング	ge001-01、ge002-01	ge004-01、ge005-01	ge006-03	ge007-03	ge008-03	ge009-03	ge010-03	ge011-02	ge012-02
入院・外来	1	4	6	7	8	9	10	11	12
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	ハーセプチン weekly	ハーセプチン 3weeks	タキソール	タキソール・ハーセプチン weekly (初回)	タキソール・ハーセプチン weekly	タキソール・ハーセプチン 3weeks (初回)	タキソール・ハーセプチン 3weeks	タキソテール	タキソテール・ハーセプチン 3weeks (初回)
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、4mg/kg 2回目以降は、2mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ (4mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ (2mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ (8mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ (6mg/kg)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ (8mg/kg)
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ5錠服用	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/nf) 調製時ボンピング必要	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了 day7		休薬完了 day7	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)		5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/nf) 調製時ボンピング必要
手技		day8、15は、休薬週		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day8、15は、休薬週	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤		休薬完了 day21		休薬完了 day7	休薬完了 day7			休薬完了 day21	
手技						day8、15	day8、15		day8、15は、休薬週
5 薬剤						カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用		休薬完了 day21
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
6 薬剤						生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 (80mg/nf)		
手技						持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		
7 薬剤						休薬完了 day21	休薬完了 day21		
手技									
8 薬剤									
手技									
9 薬剤		※ツカイザ錠と併用時の初回は、8mg/kg。(前回投与から3週間しか開いていなくても8mg/kg)							
手技									
10 薬剤									
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge013-02	ge015-01	ge016-01	ge017-01	ge018-01	ge019-01	ge026-05	ge027-02	ge034-01	
入院・外来	13	14	15	16	17	18	19	20	23	
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール名	タキソテール・ハーセプチン3weeks	FEC 100	FEC 75	ナベルピン	ナベルピン ハーセプチン3weeks(初回)	ナベルピン ハーセプチン3weeks	IFL	イリノテカン	ナベルピンBiweekly	
投与順序	1 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(8mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(8mg/kg)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (250mg/mf) Rp.2と同時 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食100mL 1瓶 エビルピシ注(100mg/mf)	生食100mL 1瓶 エビルピシ注 (75mg/mf)	/	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	フルオウラシル(500mg/mf) Rp.1投与60分後 上ルートより	/	/	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	day8	持続点滴末梢	持続点滴末梢	静脈注射緩徐に	day8は休業	day8は休業	
4 薬剤	/	ラクテック500mL 1袋 フルオウラシル注 (500mg/mf) エンドキサン注(500mg/mf)	ラクテック500mL 1袋 フルオウラシル注 (500mg/mf) エンドキサン注(500mg/mf)	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	/	/	生食100mL 1瓶 イリノテカン (80mg/body) Rp.3終了後 上ルートより	休業完了day14	休業完了day7	
手技	day8、15は、休業週	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	day8	day8	持続点滴末梢(60分)			
5 薬剤	休業完了day21	/	/	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋			
手技		day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)			
6 薬剤		休業完了day21	休業完了day21	/	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	day1~15 計3回			
手技				day15は、休業週	持続点滴末梢	持続点滴末梢	day22は休業			
7 薬剤				休業完了day21	/	/	休業完了day7			
手技					day15は、休業週	day15は、休業週				
8 薬剤					休業完了day21	休業完了day21				
手技										
9 薬剤										
手技										
10 薬剤										
手技										
11 薬剤										
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	ge039-01	ge044-01	ge045-01	ge046-01、ge047-01	ny049-01	ny050-01	ny051-01.ny052-01	ny056-01
	24	26	27	28	30	31	32	34
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ
プロトコール名	カンプト(A法)weekly	ナベルピン ハーセプチン2weeks	ジェムザール(乳服)	ジェムザール(乳服) ハーセプチン3weeks	CT	アブラキサン	アブラキサン・ ハーセプチン 3weeks	エリブリン
投与順序	1 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ(4mg/kg)			カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 下ルートより	
手技	day1,8,15	持続点滴末梢(90分)	day1,8	day1	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1,8
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/㎡) 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/㎡)	生食100mL (52mg/㎡) アブラキサン注(260mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/㎡)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/㎡) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ポンピング必要	休薬完了 day21	生食100mL (52mg/㎡) アブラキサン注(260mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注(1.4mg/㎡) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(約60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢
4 薬剤				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/㎡)	生食 50mL 1瓶		休薬完了 day21	
手技	day22は休薬	day8は休薬	day15は休薬	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)			day15は休薬
5 薬剤	休薬完了 day28	休薬完了 day14	休薬完了 day21					休薬完了 day21
手技				day8	day8,15は休薬			
6 薬剤				カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了 day21			
手技				持続点滴末梢(30分)				
7 薬剤				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/㎡)				
手技				持続点滴末梢(30分)				
8 薬剤								
手技				day15は休薬				
9 薬剤				休薬完了 day21				
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny057-01	ny058-01.ny059-01	ny060-01	ny061-01	ny063-01	ny064-01	ny069-01	ny070-01
入院・外来	35	36	38	39	41	42	43	44
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	イリノテカン・ハーセプチン	CT・ハーセプチン	エリブリン・ハーセプチン	weeklyタキソール・アバステン	weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン(8mg/kg)	weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン(6mg/kg)	エリブリン・ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・エリブリン・ハーセプチン(初回)
投与順序	1 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)
手技	day1,8,15	持続点滴末梢	day1,8	day1,15	day1,15	day1,15	day1	day1
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 <b>4mg/kg</b> (30分) day8 なし day15 <b>6mg/kg</b> (30分)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 <b>6mg/kg</b> (30分) day8 なし	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	トラスツズマブ <b>8mg/kg</b> (90分)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>840mg/body</b> (60分)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 ( <b>600mg/rf</b> )	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/rf</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/rf</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/rf</b> )	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>8mg/kg</b> (90分)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン ( <b>100mg/rf</b> )	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/rf</b> ) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 観劇時ポンピング必要	生食 50m 1瓶 エリブリン静注( <b>1.4mg/rf</b> ) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 100mL 1瓶 アバステン ( <b>10mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン ( <b>10mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン ( <b>10mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 ( <b>1.4mg/rf</b> ) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤		生食 50mL 1瓶						生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 ( <b>1.4mg/rf</b> ) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ
手技	day22,29は休業	持続点滴末梢(15分)	day15は休業	day8	day8	day8	day8	持続点滴末梢
6 薬剤	休業完了day35		休業完了day21	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ( <b>8mg/kg</b> )	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ( <b>6mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技		day8,15は休業		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	day8
7 薬剤		休業完了day21		生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/rf</b> )	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 ( <b>1.4mg/rf</b> ) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技				持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤					生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/rf</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/rf</b> )		生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 ( <b>1.4mg/rf</b> ) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ
手技				day22は休業	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day15は休業	持続点滴末梢
9 薬剤				休業完了day28			休業完了day21	
手技					day21は休業	day21は休業		day15は休業
10 薬剤					休業完了day28	休業完了day28	休業完了day21	
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny071-01 45	ny072-01 46	ny073-01 47	ny074-01 48	ny075 49	ny076-01 50	ny077-01 51	ny078-01 52
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名	パージェタ(初回)・エリブリン・ ハーセプチン	パージェタ・エリブリン・ハーセプ チン	パージェタ(初回)・ハーセプチン (初回) 3weeks	パージェタ(初回)・ハーセプチン 3weeks	パージェタ・ハーセプチン 3weeks	パージェタ(初回)・アブラキサン・ ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・アブラキサン・ ハーセプチン	パージェタ・アブラキサン・ ハーセプチン
投与順 序	1 薬剤		生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body 下ルートより	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body 下ルートより	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮 可 下ルートより
手技	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body (60分)	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body (60分) 認容性 良:60分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg (90分) 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg (90分) 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V				生食100mL (52mg/ml) アブラキサン注(260mg/ml) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食100mL (52mg/ml) アブラキサン注(260mg/ml) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食100mL (52mg/ml) アブラキサン注(260mg/ml) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 (1.4mg/ml) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 (1.4mg/ml) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢						
6 薬剤								
手技	day8	day8						
7 薬剤	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V						
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)						
8 薬剤	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 (1.4mg/ml) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 50mL 1瓶 エリブリン静注 (1.4mg/ml) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ						
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢						
9 薬剤								
手技	day15は休業	day15は休業						
10 薬剤	休業完了day21	休業完了day21						
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny079-01 53	ny080-01 54	ny081-01 55	ny082-01 56	ny083-01 57	ny084-01 58	ny085-01 59	ny086-01 60
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ バージェタ(初回)・タキソール・ ハーセプチン(初回)	ケモセーフ バージェタ(初回)・タキソール・ ハーセプチン	ケモセーフ バージェタ・タキソール・ハーセプ チン	ケモセーフ バージェタ(初回)・weeklyタキソ ール・アバステン・ハーセプチン(初 回)	ケモセーフ バージェタ(初回)・weeklyタキソ ール・アバステン・ハーセプチン	ケモセーフ バージェタ・weeklyタキソール・ア バステン・ハーセプチン	ケモセーフ バージェタ(初回)・タキソール・ ハーセプチン3weeks(初回)	ケモセーフ バージェタ(初回)・タキソール・ ハーセプチン3weeks
投与順 序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮 可	バージェタ(初回)・weeklyタキソ ール・アバステン・ハーセプチン(初 回)	バージェタ(初回)・weeklyタキソ ール・アバステン・ハーセプチン	バージェタ・weeklyタキソール・ア バステン・ハーセプチン	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1,15	day1,15	day1,15	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.3と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.3と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.3と同時にレスタシノー75錠服用	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短 縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短 縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短 縮可	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/rf) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/rf) 調製時ボンピング必要
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤								
手技	day8	day8	day8	day8	day8	day8	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週
6 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮 可	休業完了day21	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
7 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可		
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		
8 薬剤				カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用		
手技	day15	day15	day15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
9 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		
10 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rf)					
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day21は休業	day21は休業	day21は休業		
11 薬剤	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day28	休業完了day28	休業完了day28		
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny087-01 61	ny088-01 62	ny089-01 63	ny090-01 64	ny091-01 65	ny092-01 66	ny093-01 67	ny094-01 68
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 バージェタ 420mg/body 認容性 良:60分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 420mg/body 認容性 良:60分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 420mg/body 認容性 良:60分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	day1	day1	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:60分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分-30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分-30分 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 調製時ボンピング必要	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/ml)
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(45分)
5 薬剤					生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要
手技	day8、15は、休業週	day8	day8	day8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(約60分)
6 薬剤	休業完了day21	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で				生食 50mL 1瓶
手技		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	day8	day8	day8	持続点滴末梢(15分)
7 薬剤		生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技		持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8、15は休業
8 薬剤					生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	休業完了day21
手技		day15は、休業週	day15は、休業週	day15は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤		休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21				
手技					day15は休業	day15は休業	day15は休業	
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny095-01 69	ny096-01 70	ny100-01 71	ny101-01, ny102-01 72	ny103-01 74	ny116-01 75	ny119-01 76	ny126-01 77
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
バージェタ(初回)・CT・ハーセプチン	バージェタ・CT・ハーセプチン	バージェタ・CT・ハーセプチン	カドサイラ	TCbH(初回)、TCbH	TCb	EC(2weeks)療法	EC(3weeks)療法	キイトルーダ(3週毎)
1 薬剤	生食 250mL 1袋 バージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 バージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 注射用水20mL 1A 蒸留水は溶解用 カドサイラ <b>3.6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降、 <b>6mg/kg</b> (30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注( <b>200mg/body</b> )
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>8mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>8mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注 ( <b>75mg/ml</b> ) 調製時ボンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注 ( <b>75mg/ml</b> ) 調製時ボンピング必要	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 ( <b>AUC8</b> ) <b>MAX900mg</b>	生食100mL 1瓶 エビルピシン注 ( <b>90mg/ml</b> ) 全開で	生食100mL 1瓶 エビルピシン注 ( <b>90mg/ml</b> ) 全開で	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	
4 薬剤	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 ( <b>600mg/ml</b> )	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 ( <b>600mg/ml</b> )	休業完了 day21	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 ( <b>AUC8</b> ) <b>MAX900mg</b>		生食100mL 1瓶 エンドキサン注 ( <b>600mg/ml</b> )	生食100mL 1瓶 エンドキサン注 ( <b>600mg/ml</b> )	
手技	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/ml</b> ) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/ml</b> ) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要			休業完了 day21	休業完了 day14	休業完了 day21	
手技	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢(約60分)		day8,15は、休業週				
6 薬剤	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶		休業完了 day21				
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)						
7 薬剤								
手技	day8,15は休業	day8,15は休業						
8 薬剤	休業完了 day21	休業完了 day21						
手技								
9 薬剤								
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny132-01 78	ny133-01 79	ny134-01 80	ny136-01 81	ny138-01 82	ny139-01 83	ny140-01 84	ny144-01 85
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	テセントリク+アブラキサン	CMF療法	エンハーツ	キイトルーダ(6週毎)	TCbHP(P初・H初)	TCbHP(P初・H)	TCbHP(P・H)	キイトルーダ(3週毎)+パクリタキセル
投与順序	1 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 バージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)
手技	day1,15	day1,8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食250mL 1袋 テセントリク (840mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート全開で	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスミノー75錠服用
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 フィルターなし	生食50mL 1瓶 メントレキセート注(40mg/㎡)全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶 エンハーツ注(5.4mg/kg) 注射用水20mL 1A 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可 滅光必要	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(600mg/㎡)全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	休薬完了day7
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
5 薬剤		休薬完了day28	休薬完了day21	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	キイトルーダ(3週毎)と パクリタキセル(3投1休)のレジメン 乳腺126、144、145を組み合わせて使用
手技	day8			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	エンドキサン錠 100mg/㎡ 14日間	エンハーツ調製後は点滴バッグを滅光する					乳腺144: day1,43,64(1,7,10週目) 乳腺145: day8,15,29,36,57,71 (2,3,5,6,9,11週目) 乳腺126: day22(4週目)
手技	持続点滴末梢(30分)			day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	
7 薬剤	生食100mL (20mL/㎡) アブラキサン注(100mg/㎡) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄		調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝えること		休薬完了day21	休薬完了day21	休薬完了day21	
手技	day22は、休薬週							
8 薬剤	休薬完了day28		エンハーツ400mgを超えると 注射用水2A必要になるので 処方修正してもらうこと					
手技								
9 薬剤								
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny145-01	ny146-01	ny147-01	ny148-01	ny149-01	ny150-01	ny151-01	ny153-01
入院・外来	86	87	88	89	90	91	92	93
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	パクリタキセル(90mg/m <sup>2</sup> )	キイトルーダ(6週毎)+パクリタキセル	キイトルーダ(3週毎)+アブラキサン	アブラキサン(100mg/m <sup>2</sup> )	キイトルーダ(6週毎)+アブラキサン	キイトルーダ(3週毎)+GEM+CBDDCA	キイトルーダ(6週毎)+GEM+CBDDCA	ピラルビシン(週1回法)
投与順序	1 薬剤 カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)			
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day1,8,15
2 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/m <sup>2</sup> )	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了 day7	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/m <sup>2</sup> )	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	休薬完了 day7	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ピノルビン注(25mg/m <sup>2</sup> ) 生食5mL/Vで溶解 全開で
手技		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)
4 薬剤	3投1休で投与	休薬完了 day7	休薬完了 day7		休薬完了 day7	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )	
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day22,29は休薬
5 薬剤	乳腺144、乳腺146の一部	キイトルーダ(6週毎)と パクリタキセル(3投1休)のレジメン 乳腺145、146を組み合わせ使用				生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	休薬完了 day35
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤								
手技						day8	day8、22、29	
7 薬剤						カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤						生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )	
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤						生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
10 薬剤						休薬完了 day21	休薬完了 day42	
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ny154-01 94	ny155-01 95	ny156-01 96	ny158-01 97	ny159-01 98	ny160-01 99	ny161-01 100	ny162-01 101
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	イリノテカン+ハーセプチン(初回)	イリノテカン+ハーセプチン	ddPTX療法	キイトルーダ+EC(3weeks)	キイトルーダ+wPTX+CBDDCA	キイトルーダ+wPTX+CBDDCA	トロデルビ(サシズマフ)コビテカン【初回】	トロデルビ(サシズマフ)コビテカン【2コース目以降】
1 薬剤			カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)				
手技	day1,8,15	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day1	day1, 8
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回、4mg/kg 2回目以降、2mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/rf)	アロキン注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	アロキン注バッグ 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75T、アセ7 ミノン500mg内服	アロキン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了day14	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシコ-75T内服	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシコ-75T内服	生食 250mL 1袋 トロデルビ注(10 mg/kg) ※遮光必要 ※体重85kgより多い場合、生食 500mL に溶解	生食 250mL 1袋 トロデルビ注(10 mg/kg) ※遮光必要 ※体重85kgより多い場合、生食 500mL に溶解
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/rf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/rf)		生食100mL 1瓶 エビルピシン注(90mg/rf) 全開で	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)		
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day8	
5 薬剤				生食100mL 1瓶 エンドキサン注(600mg/rf)	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC1.5) MAX225mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC5) MAX750mg	アロキン注バッグ 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にアセ7ミノン500mg内 服	
手技	day22	day22		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可		休業完了day21			生食 250mL 1袋 トロデルビ注(10 mg/kg) ※遮光必要 ※体重85kgより多い場合、生食 500mL に溶解	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)			day8,15	day8,15	持続点滴末梢(120分)	
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用			カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75T内服	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75T内服		
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
8 薬剤	休業完了day28	休業完了day28			生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)	生食 250mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/rf)		
手技					持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
9 薬剤					生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC1.5) MAX225mg	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21
手技					持続点滴末梢(30分)			
10 薬剤					休業完了day21			
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード	ny163-01	
ナンバリング	102	
ルート	入院 ・ 外来	
プロトコール名	ケモセーフ	
投与順序	1 薬剤	アロキン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコー75T、アセ7 ミフェン500mg1T内服
	手技	持続点滴末梢(30分)
	2 薬剤	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート 全開で
	手技	持続点滴末梢(5分)
	3 薬剤	5%ブドウ糖100mL 1瓶 ダトロウエイ注(6mg/kg) 注射用水20mL 1A 認容性 良→2回目以降30分へ 短縮可 ※遮光必要
	手技	持続点滴末梢(90分)
	4 薬剤	5%ブドウ糖100mL 1瓶
	手技	持続点滴末梢(15分)
	5 薬剤	
	手技	
	6 薬剤	休業完了day21
	手技	
	7 薬剤	ダトロウエイ調製後は点滴バッグを遮光する
	手技	
	8 薬剤	調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝える こと
	手技	
	9 薬剤	ダトロウエイ400mgを超えると 注射用水2A必要になるので 処方修正してもらうこと
	手技	
	10 薬剤	
	手技	
	11 薬剤	
	手技	
	12 薬剤	
	手技	
	13 薬剤	
	手技	
	14 薬剤	
	手技	