

コード ナンバリング	fg001-01	fg002-01	fg003-01	fg004-01
	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	レミケード	DAV Feron	タキソール	オブジーボ+ヤーボイ(マラノマ)
投与順序	1 薬剤 生食注 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1瓶	ダカルバジンは消灯して調製	カイトリル注3mg 1袋 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(80mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食注 250mL 1袋 インフィキシマブ(5mg/kg) 開始1hr → 50mL/hr その後 → 200mL/hr	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート Rp.2と同時	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/mf)	生食 100mL 1瓶
手技	持続点滴側管	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食注 250mL 1袋 1回目 指示確認 2回目以降 1hr	グラニセトロン注ハック 1袋 Nsは投与開始時ケモ調製室に 連絡→調製開始 Rp.1と同時 上ルート	休薬完了day7	生食 100mL 1瓶 ヤーボイ注(3mg/kg)
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	休薬完了day14	生食 100mL 1瓶 ダカルバジン(140mg/mf) MAX 200mg/body ルート刺入部まで遮光後投与 ベッドサイドの消灯 下ルート	3投1休が標準 (day1.8.15 4weekごと)	生食 50mL 1瓶
手技		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(5分)
5 薬剤		生食 50mL 1瓶 注射用水 1A ニドラン (80mg/mf) MAX 150mg/body Rp.3終了後 全量50mL 蒸留水は溶解用 下ルート		休薬完了day21
手技		持続点滴末梢(5分)		
6 薬剤		生食 20mL 1A オンコピン (1mg/body) 下ルート		4回投与後、オブジーボ単剤へ
手技		静脈注射緩徐に		
7 薬剤		day2~5		
手技		day2~5		
8 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート Rp.2と同時		
手技		持続点滴末梢(120分)		
9 薬剤		グラニセトロン注ハック 1袋 Nsは投与開始時ケモ調製室に 連絡→調製開始 Rp.1と同時 上ルート		
手技		持続点滴末梢(30分)		
10 薬剤		生食 100mL 1瓶 ダカルバジン(140mg/mf) MAX 200mg/body ルート刺入部まで遮光後投与 ベッドサイドの消灯 下ルート		
手技		持続点滴末梢(30分)		
11 薬剤		休薬完了day28		
手技				
12 薬剤		フエロン day1-5 投与		
手技				