

コード ナンバリング	hk006-01	hk007-01	hk008-01	hk009-01	hk010-01	hk011-02	hk012-01		hk013-01		
入院	1	2	3	4	5	6	7		8		
ルート	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ		
プロトコール 名	M-VAC	VIP	GC	TG	タキソテール・ブレドニゾン	BEP療法		EP	タキソテール・デキサメサゾン		
投与順序	1 薬剤	別紙	別紙	別紙	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	化学療法中 ブレドニゾン錠1mg 10T分2			化学療法中 デカドロン錠0.5mg 2T分2		
手技					持続点滴末梢(2h)	day1	day1	day2~5	day1	day2~5	day1
2 薬剤	メトレキセート(30mg/mf) シスプラチン (70mg/mf) ドキシルビジン(30mg/mf) エクザール(3mg/mf)	イホマイド (1.2g/mf) MAX 1.5g/mf シスプラチン (20mg/mf) MAX 20mg/mf エトボシド (75mg/mf) MAX 120mg/mf	ゲムシタピン (1000mg/mf) シスプラチン (70mg/mf)	生食 50mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/mf) MAX 1000mg/mf Rp.1開始60分後より 下ルートより	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/mf) 上ルートより 調製時ポンピング必要	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート フィルターなし	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート フィルターなし	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート フィルターなし	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート フィルターなし	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(75mg/mf) 上ルートより 調製時ポンピング必要	
3 薬剤	全て下ルート		day1、2は全て下ルート day8、15は上ルート	生食 50mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2終了後全開で Rp.3と同時にレスチン5錠服用 下ルートより	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注キット 1袋 アロカリス 1V デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	カイトリル注キット 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	カイトリル注キット 1袋 アロカリス 1V デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	カイトリル注キット 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	
4 薬剤			アプレピタント内服	ブドウ糖 5%500mL 1袋 パクリタキセル(175mg/mf) MAX 210mg/mf Rp.1終了後 下ルートより	休業完了 day21	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 上ルートより	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 上ルートより	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 上ルートより	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 上ルートより	休業完了 day21	
5 薬剤				生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf) 下ルートより		生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (20mg/mf) 下ルートより		
6 薬剤				ソルデム1 500mL 1袋 メインルート		生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A メインルート	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A メインルート	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A		
7 薬剤				生食 50mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/mf) MAX 1000mg/mf Rp.1開始60分後より 下ルートより		生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより	生食 500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルート		
8 薬剤				休業完了 day21		生食 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート		
9 薬剤						ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート			休業完了 day21		
10 薬剤						生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 上ルートより	day8、15				
11 薬剤						生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	持続点滴末梢				
12 薬剤						休業完了 day21					
13 薬剤											
14 薬剤	2		5	3	2	1	7	5	5	1	
15 薬剤							産婦18と共通	(2023)day11にアロカリス追加 day2-5DXA1.5V→1Vへ			

hk014-01	hk016-01	hk017-01	hk018-01	hk019-01	hk020-01	hk021-01	hk022-01	hk023-01	hk024-01	hk025-01	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
シリンジ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
ODDP動注連日	トーリセル	アドリアシン単剤	ハラヴェン	オプジーボ(2週毎)	ジェブタナ	バラブラチン・ゲムシタピン	バラブラチン・Monthlyタキソール	GC(ショートハイドレーション)	キイトルーダ(3週毎)	オプジーボ+ヤーボイ	
	化学療法前投与 レスチニュー7錠 5錠 服用			生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(240mg/body)	フレドニゾン錠 10mg/日併用	アプレピタント内服	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg IA デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にレスチニュー7錠 服用		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(240mg/body)	
day1~5	day1	day1~3	day1,8	持続点滴末梢(30分)		day1	持続点滴末梢(30分)		day1	持続点滴末梢(30分)	
ラクテック 500mL 1袋	生食 250mL 1袋 トーリセル (25mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V ボラミン注5mg 1A	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	アロキシ注ハッグ 1袋 アロカリス注 1V デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶	
持続点滴末梢(1.5h)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
ラクテック 500mL 1袋	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 ドキシソルピシン (30mg/body)	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/㎡) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	休業完了 day14	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (175mg/㎡)	生食 50mL 1瓶	休業完了 day21	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注 (1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	
持続点滴末梢(1.5h)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)	
カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2投与60分後から	休業完了 day7	休業完了 day21		day15は休業	生食 250mL 1袋 ジェブタナ (25mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)		生食 50mL 1瓶	
持続点滴末梢(30分)					持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(5分)	
シスプラチン(20mg/㎡)			休業完了 day21					ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		休業完了 day21	
動注					day3	day8	day8.15は、休業週	持続点滴末梢(60分)			
ラクテック 500mL 1袋					ジーラスタ皮下注3.6mg 1 筒	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了 day21	マンニトール 200mL		4回投与後、オプジーボ単剤へ	
持続点滴末梢(90分)					皮下投与	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)			
休業完了 day21					休業完了 day21	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)	カルボプラチンはAUC6に減 量されていても開い合わせ不 要	生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/㎡) 全量を500mLに			
						持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)			
						day15は、休業週		ソルデム3A 500mL 1袋			
								day8, 15			
								生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V			
								持続点滴末梢(30分)			
								生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)			
								持続点滴末梢(30分)			
								day22は、休業週			
								休業完了 day28			
5	1	3	2	1	1	2	1			1	
					呼吸37,耳鼻5,外科120 血液128と共通					呼吸39,耳鼻16,乳腺126,産婦 38と共通	
										適応追加等でヤーボイが4回投 与後終了以外の用法になった 時は要注意。 メモのコメント消すこと。	

hk037-01	hk038-01	hk039-01	hk040-01	hk041-01	hk042-01	hk043-01		
入院・外来 31	入院・外来 32	入院・外来 33	入院 34	入院・外来 35	入院・外来 36	入院・外来 37		
ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ		
ddM-VAO(ショットドレージョン)	パラプラチン・ラステット	アドリアシン療法	【限定】dd-MVACarbo	パドセブ+キイトルーダ療法	イミフィンジ+GC(ショットドレージョン)	イミフィンジ+GC(CCr ≥40/<60)(ショットドレージョン)		
	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V アロカリス注 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 デキサート注6.6mg 1.5V						
day1	day1	day1	day1	day1	day8	day1		
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)		
ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 2A メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/rl)	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピジン(80mg/rl)	生食 100mL 1瓶 メソトレキセート注(15mg/rl)	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) ※体重30kg以下の場合、 20mg/kg	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) ※体重30kg以下の場合、 20mg/kg	カイトリル注バッグ 1袋 アロカリス注 1V デキサート注6.6mg 1V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取
持続点滴末梢(2hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
生食 100mL 1瓶 メソトレキセート(30mg/rl) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより	休業完了 day21	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 パドセブ注(1.25mg/kg) 注射液20mL 1A 注射用水は溶解用 MAX 125mg	生食 50mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/rl)	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
				生食 50mL 1瓶 ※パドセブ 忍容性OK→2回目 以降、15分で投与可	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1V デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取	カイトリル注バッグ 1袋 アロカリス注 1V デキサート注6.6mg 1V 投与中に経口補水液(OS1)1L 摂取		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/rl)
day2	day2,3		day2	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V フィルターなし		アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 50mL 1瓶	休業完了 day21	生食 50mL 1瓶	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)
生食 50mL 1瓶 エクザール(3mg/rl)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/rl)		生食 50mL 1瓶 エクザール(3mg/rl)		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/rl)	※1コース:21~28日 ※4コースまで ※術後は、イミフィンジ維持(呼吸器51)最大8コース	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/rl)	マンニトール 200mL
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
生食 50mL 1瓶 ドキシソルピジン(30mg/rl)			生食 50mL 1瓶 ドキシソルピジン(30mg/rl)		ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 500mL 1袋 シスプラチン(35mg/rl)
持続点滴末梢(15分)	day8,15は、休業週		持続点滴末梢(15分)	day8	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 1A	休業完了 day21		生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC=5) MAX750mg	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	マンニトール 200mL		マンニトール 200mL	ソルデム3A 500mL 1袋
持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
マンニトールS 200mL	※入院 アロカリス注→アプレピタントを内服			生食 50mL 1瓶 パドセブ注(1.25mg/kg) 注射液20mL 1A 注射用水は溶解用 MAX 125mg	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/rl) 全量を500mLに		生食 500mL 1袋 シスプラチン(35mg/rl)	
持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	
生食500mL 1袋 シスプラチン(70mg/rl) 全量を500mL			休業完了 day14		ソルデム3A 500mL 1袋		ソルデム3A 500mL 1袋	休業完了 day21
持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	
生食250mL 1袋			臨床試験用レジメン	休業完了 day21				※1コース:21~28日 ※4コースまで ※術後は、イミフィンジ維持(呼吸器51)最大8コース
持続点滴末梢(30分)								
休業完了 day14								