



コード ナンバリング	sf013-02	sf014-01	sf015-01	sf016-01	sf017-01	sf018-01	
	13	14	15	16	17	18	
入院	入院	入院	入院・外来	入院	入院	入院	
ルート	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	カテーテルシリンジチップ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール名	IAP	トボテカン	CDDP腹腔内	タキソテール	EMA/CO	BEP療法	
投与順序	1 薬剤	アプレピタント内服	グラニセト注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	ラクテック500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ロイホリン錠15mg 12時間ごと に4回 ロイホリン投与開始後24時間より服用開始	
手技	Day1~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	Day1	Day8	day1
2 薬剤	ラクテック500mL 1袋 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ハイカムテン(1.5mg/ml)	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/ml) 調製時ポンピング必要	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V ブクダ開始60分前から メインルート	day1~5まで計5コース	生食250mL 150mL シスプラチン注(50mg/ml)		蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 250mL 1袋 エンドキサン注(600mg/ml)	グラニセト注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 下ルートより Rp.1と同時
手技	持続点滴末梢(30分)		腹腔内投与	day8, 15は、休業	静脈注射	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)
4 薬剤	ドキシソリン注 (40mg/ml) イホマイドへ継ぎ換え時 下ルートより Day4のみ	休業完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 ラシックス注20mg 0.5A	休業完了 day21	生食 500mL 1袋 エトポシド注(100mg/ml) 上ルートより	生食 20mL 1A オンコピン注 (0.8mg/ml) 下ルートより ◆シリンジで調製 MAX 2mg/body 主治医が%	ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトポシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後
手技	持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)	静脈注射	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/ml) ロシタキサン1回目と同時に 上ルートより		ラクテック500mL 1袋 KCL注 1キット		生食 500mL 1袋 マトレキセート(300mg/ml) 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/ml) (イホマイドの20%相当) 下ルートより イホマイドと同時に		ソルデム3A 500mL 1袋		生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより	休業完了 day14	生食 500mL 1袋 シスプラチン(20mg/ml) 下ルートより Rp.3終了後
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン注 (20mg/ml) 上ルートより		ラクテック 500mL 1袋		アプレピタント内服	Day2	生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより Rp.3終了後
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)			Day2	持続点滴末梢(60分)
8 薬剤	マンニトールS 300mL 1瓶 ロシタキサン2回目と同時に 上ルートより	休業完了 day7			グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(5時間)
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/ml) (イホマイドの20%相当) マンニトールと同時に 下ルートより	調製方法 別紙参照			蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製		ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート
手技	持続点滴末梢(30分)				静脈注射	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(4時間45分)
10 薬剤	ラクテック 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A グラニセト注と同時に メインルート		カテーテルシリンジ 期限-在庫確認		生食 500mL 1袋 エトポシド注 (100mg/ml) 上ルートより		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート
手技	持続点滴末梢(3hr)				持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(4時間45分)
11 薬剤	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 Rp.9と同時に 下ルートより				生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより	静脈注射緩徐に	エトポシドはフィルターなし! 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)					静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(60分)
12 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A ウロミテキサンと同時に メインルート						アプレピタント内服
手技	持続点滴末梢(3hr)						生食 50mL 1瓶 ルートキープ用
13 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/ml) (イホマイドの20%相当) Rp.11と同時に 下ルートより						休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)						持続点滴末梢
14 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A メインルート						
手技	持続点滴末梢(2hr)						
15 薬剤	休業完了 day21						
手技							

コード ナンバリング	sf019-01	sf020-01	sf021-01	sf022-02	sf023-03	sf024-04	sf025-01	sf026-01	sf027-01	
入院	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール 名	FP療法	アドリアシン療法	カンプト	GP+アバステン	アバステン(15mg/kg)	ジェムザール	DC+アバステン	CPT-11(単剤)	AI療法	
投与順序	1 薬剤 ラクテック 500mL 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 デキサート注6.6mg 1.5V	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にニクシコー75T内服	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にベナ5T内服	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し クワテキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し クワテキサンは薬剤師が調製	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	day1,2	day3,4,5
2 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/mf) Rp.1投与60分後	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピジン(60mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(60mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 500mL 1袋 ドセタキセル注(70mg/mf) 調製時ポンピング必要	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	ラクテック 500mL 1袋	休薬完了 day21	day1～15まで計3コース	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC8) MAX750mg	休薬完了 day21	day1～day15の計3回	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC8) MAX750mg	生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/mf)	クワンチド注キホ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	クワンチド注キホ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより
手技	持続点滴末梢(90分)		day22は、休薬	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ラクテック 500mL 1袋	休薬完了 day7		生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはペバシズマブ		生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) 認容性 良→60分→30分へ短縮可		生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(90分)		day22は休薬	持続点滴末梢(90分)	day22は休薬	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V			休薬完了 day21		休薬完了 day7	休薬完了 day21	休薬完了 day28	生食 500mL 1袋 イホマイド(2g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド(2g/mf) Rp.3と同時に 上ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)								持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)
6 薬剤	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/mf) 全量を500mLに			子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはペバシズマブ			子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはペバシズマブ	生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) メインルートより	生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) メインルートより	生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)							持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 ランシックス注20mg 1A 全開で							生食 500mL 1袋 ドキシソルピジン注(30mg/mf) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより
手技	持続点滴末梢(5分)							持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
8 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) メインルートより	生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							生食 100mL 1瓶 クワテキサン注(400mg/mf) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(5時間)
10 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(5時間)
11 薬剤	ラクテック 500mL 1袋							ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより
手技	持続点滴末梢(60分)							持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)
12 薬剤								ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休薬完了 day21	休薬完了 day21
手技	day2～4							持続点滴末梢(4時間30分)		
13 薬剤	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/mf)							8時間開始レジメン クワテキサン・イホマイドは11時間開始	8時間開始レジメン クワテキサン・イホマイドは11時間開始	8時間開始レジメン クワテキサン・イホマイドは11時間開始
手技	持続点滴末梢(24hr)									
14 薬剤	休薬完了 day21				産婦人科は、『AUC=6、Jelliffe式、CRE+0.2補正あり』が基本(25/3/3 頻)		産婦人科は、『AUC=6、Jelliffe式、CRE+0.2補正あり』が基本(25/3/3 頻)		day1～3アプレビタント内服	
手技										
15 薬剤	アプレビタント内服									
手技										

コード ナンバリング	sf028-01 28	sf030-01 29	sf031-01 30	sf032-01 31	sf033-01 32	sf034-01 33	sf035-01 34	sf036-01 35		
入院・外来	入院・外来	入院		入院		入院	入院・外来	入院・外来		
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	シリンジ	シリンジ
プロトコール 名	パラプラチン・ ジェムザール	ゲムシタピン+アバステン	AI療法(限定)(杉本正子)		EP/EMA療法		FA	MEA療法	5-dayメソトレキセート	5-day Act-D療法
投与順序	1 薬剤		Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ワルチキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ワルチキサンは薬剤師が調製		ロコホリン錠15mg 12時間ごと に4回 ワルチキサン投与開始後24時間 より服用開始		ロコホリン錠15mg 12時間ごと に3回 ワルチキサン投与開始後24時間よ り服用開始	蒸留水は溶解用 2mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の2.5mL シリンジに調製	蒸留水は溶解用 1.1mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の2.5mL シリンジに調製
手技	day1	day1	day1,2,3	day4,5	Day1	Day8	day1~5	day1	day1~5	day1~5
2 薬剤	カイトリル注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 メインルートより フィルターなし	グラニセロン注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	グラニセロン注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし	メソトレキセート (0.4mg/kg) 蒸留水 20mL 1A 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 ◆シリンジで調製	カイトリル注ハグ3mg 1袋	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)	グラニセロン注キト3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより	グラニセロン注キト3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 エトポシド注 (100mg/㎡) 上ルートより	生食 500mL 1V フルオロウラシル (1500mg/body) 上ルートより	蒸留水 6mL メソトレキセート (150mg/body) 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 下ルートより ◆シリンジで調製	休業完了 day14	蒸留水20mL 1mA コスメゲン (0.01mg/kg) 下ルートより ◆シリンジで調製
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(9hr)	静脈注射		静脈注射
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 4) MAX800mg	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ワルチキサン注 (300mg/㎡) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ワルチキサン注 (300mg/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	アロキシ注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1.5B メインルートより	生食 500mL 1袋 メソトレキセート (300mg/㎡) 下ルートより	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	生食 500mL 1袋 メソトレキセート (300mg/body) 下ルートより	生食 50mL 1瓶 全開で	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)	静脈注射	持続点滴末梢(4時間)		持続点滴末梢(5分)
5 薬剤			生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/㎡) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 エトポシド注 (150mg/㎡) 上ルートより	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	休業完了 day14	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製		休業完了 day14
手技	day8	day8, 15	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(60分)	静脈注射	静脈注射	静脈注射		静脈注射
6 薬剤	カイトリル注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ワルチキサン注 (300mg/㎡) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ワルチキサン注 (300mg/㎡) メインルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (75mg/㎡) 全量を300mLに 下ルートより 蒸留水100gは濃縮 点滴	休業完了 day14	生食 500mL 1袋 ラステット注 (100mg/body) 上ルートより			アプレビタント内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)		持続点滴末梢(60分)			
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/㎡)	生食 500mL 1袋 ドキシリジン注 (20mg/㎡) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 ランソックス 1A メインルートより					
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)			day2~5		
8 薬剤			マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 ワルチキサン注 (300mg/㎡) メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより			グラニセロン注ハグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1B メインルートより フィルターなし		
手技	day15は、休業済	day22は、休業済	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)		
9 薬剤	休業完了 day21	休業完了 day28	生食 100mL 1瓶 ワルチキサン注 (300mg/㎡) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	アプレビタント内服			蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製		
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)				静脈注射		
10 薬剤		子宮頸がんはアバステン 卵巣がんはペバシズマブ	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより				生食 500mL 1袋 ラステット注 (100mg/body) 上ルートより		
手技			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)				持続点滴末梢(60分)		
11 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより				休業完了 day14		
手技			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)						
12 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休業完了 day21				アプレビタント内服		
手技			持続点滴末梢(4時間30分)							
13 薬剤			9時開始レジメン ワルチキサン+イホマイドは11時開始	9時開始レジメン ワルチキサン+イホマイドは11時開始						
手技										
14 薬剤			day1~3アプレビタント内服							
手技										
15 薬剤										
手技										

コード ナンバリング	sf037-01	sf038-02	sf039-01	sf040-01	sf041-01	sf042-01	sf043-01	sf044-01	sf045-01	sf046-01
入院・外来	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
ルート	入院・外来 ケモセーフ (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール 名	5-day ETP療法	キイトルーダ(3週毎)	キイトルーダ(6週毎)	DG療法	Bev+ドキシル (BSA1.5㎡未満)	Bev+ドキシル (BSA1.5㎡以上)	Bev+PTX	キイトルーダ+PTX+CBDOCA	キイトルーダ+PTX+CBDOCA+Bev	weekly TC
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (400mg/body)	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可 下ルートより		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注 (200mg/body)	
手技	day1~5	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15
2 薬剤	グラニセトロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 ペバシズマブ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にリスダシノー75T内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 2.5V Rp.2と同時にリスダシノー75T内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 1V Rp.1 と同時にリスダシノー75T内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド注 (60mg/m <sup>2</sup> )	休業完了day21	休業完了day42	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (900mg/m <sup>2</sup> )	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドキシル注 (40mg/m <sup>2</sup> )	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドキシル注 (40mg/m <sup>2</sup> )	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 1V Rp.2 と同時にリスダシノー75T内服	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (175mg/m <sup>2</sup> )	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (175mg/m <sup>2</sup> )	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (60mg/m <sup>2</sup> )
手技	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	休業完了day14			5%ブドウ糖 100mL 1瓶 Rp.3と同じ速度で	5%ブドウ糖 100mL 1瓶 Rp.3と同じ速度で	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/m <sup>2</sup> )	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC8) MAX750mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC8) MAX750mg	生食 500mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC2) MAX300mg	
手技				day8	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤				カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V				休業完了day21	生食 100mL 1瓶 アバスチン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	休業完了day21
手技				持続点滴末梢(30分)	day15	day15	day8,22		持続点滴末梢(90分)	
6 薬剤				生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチジン注20mg 1A デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にリスダシノー75T内服			休業完了day21	
手技				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)			
7 薬剤				生食 250mL 1袋 ドセタキセル注 (70mg/m <sup>2</sup> ) 開錠時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/m <sup>2</sup> )			
手技				持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)			
8 薬剤				休業完了day21	初回のみday1から ビドキサール錠10mg 6T分3 56日間投与	初回のみday1から ビドキサール錠10mg 6T分3 56日間投与	休業完了day28			
手技										
9 薬剤					各クール プレドニゾン錠 (1mg)投与 day1から16T朝昼 4日分、 day5から8T朝昼 1日分、day6 から4T朝1日分	各クール プレドニゾン錠 (1mg)投与 day1から16T朝昼 4日分、 day5から8T朝昼 1日分、day6 から4T朝1日分	子宮頸がんはアバスチン 肺がんはペバシズマブ			
手技										
10 薬剤					休業完了day28	休業完了day28				
手技										
11 薬剤					体表面積注意！	体表面積注意！				
手技										
12 薬剤										
手技										
13 薬剤										
手技										
14 薬剤								産婦人科は、『AUC=6、Jelliffe 式、GRE+0.2補正あり』が基本 (25/3/3 欄)	産婦人科は、『AUC=6、Jelliffe 式、GRE+0.2補正あり』が基本 (25/3/3 欄)	
手技										
15 薬剤										
手技										

コード	sf047-01	
ナンバリング	入院 ・ 外来	46
ルート	ケモセーフ	
プロトコール名	リプタヨ(3週毎)	
投与順序	1 薬剤	生食 100mL 1瓶 リプタヨ注(350mg/body)
	手技	持続点滴末梢(30分)
	2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
	手技	持続点滴末梢(5分)
	3 薬剤	休薬完了day21
	手技	
	4 薬剤	
	手技	
	5 薬剤	
	手技	
	6 薬剤	
	手技	
	7 薬剤	
	手技	
	8 薬剤	
	手技	
	9 薬剤	
	手技	
	10 薬剤	
	手技	
	11 薬剤	
	手技	
	12 薬剤	
	手技	
	13 薬剤	
	手技	
	14 薬剤	
	手技	
	15 薬剤	
	手技	