

コード ナンバリング	sk001-01	sk002-01	sk003-07	sk004-01	sk005-01	sk006-01	sk007-01	sk008-08.ge024
	入院・外来 1	入院・外来 2	入院 3	入院・外来 4	入院 5	入院 6	入院・外来 7	入院 8
プロトコール名	ケモセーフ ジェムザール	ケモセーフ TS-1・CPT-11	ケモセーフ TS-1・CDDP day8(60mg/㎡)	ケモセーフ TS-1・CDDP weekly(20mg/㎡)	ケモセーフ(下ルート) FP(700-70)	ケモセーフ(下ルート) FP (low dose)	ケモセーフ CDDP腹腔・5-FU	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI
投与順序	1 薬剤 カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	★TS-1 day1から3週間投与	★TS-1 day1の7日前より3週間投与	★TS-1 day1から3週間投与	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 フルオロウラシル(500mg/body) Rp.2と同時 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL 持続点滴末梢(60分)	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1.15	day1	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	ラクテック500mL 1袋	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(200mg/㎡) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 20mL 2A ランダ(MAX 20mg/body) Rp.1と同時	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.3と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	腹腔投与(volus)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	day1～day15の計3回	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎡)	ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1投与60分後	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	休薬完了day7	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/㎡) Rp.2と同時 上ルートより
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(120分)
4 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/㎡)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	ランダはシリンジ3本に分ける 生食とランダ1:1で調製 生食とランダそれぞれ吸い、3 方活栓使用して1本にまとめる	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/㎡) 全開で
手技	day22は休薬	day8.22.29は休薬	持続点滴末梢(100分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)		静脈注射緩徐に
5 薬剤	休薬完了day7	休薬完了day35	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V Rp.3投与開始70分後より	ラクテック500mL 1袋	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 500mL 1袋 ランダ (4mg/㎡) Rp.3終了後 上ルートより	①30mL (生食・ランダ 15mLずつ) (50mLシリンジ)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/㎡)
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(46hr)
6 薬剤			生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/㎡) 全 量を500mLに 上ルートより	休薬完了day7	生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/㎡) 全 量を500mLに 上ルートより	生食 20mL 1A ランクス注20mg 1A 上ルートより	②30mL (生食・ランダ 15mLずつ) (50mLシリンジ)	休薬完了day14
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	静脈注射		
7 薬剤			生食 20mL 1A ランクス注20mg 1A 下ルートより	3投2休が標準 (day1.8.15 5weekごと)	生食 20mL 1A ランクス注20mg 1A 上ルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルート	③20mL (生食・ランダ 10mLずつ) (30mLシリンジ)	
手技			静脈注射		静脈注射	持続点滴末梢(90分)		
8 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)		
9 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート		
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)		
10 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 10%塩化Naシリンジ 1筒 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート	グラニセト注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート		
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)		
11 薬剤			ソルデム3A 500mL 1袋 下ルートより		ラクテック500mL 1袋 メインルート			
手技			持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	day2～5		
12 薬剤						生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(200mg/㎡) 下ルートより		
手技		day8.15.22は休薬			day2～5	持続点滴末梢(24hr)		
13 薬剤			休薬完了day7		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(700mg/㎡) 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (4mg/㎡) 上ルートより		
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)		
14 薬剤					休薬完了day21	休薬完了day7		
手技								
15 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	sk009-05	sk011-01	sk012-01	sk016-01	sk017-01	sk019-01	sk020-01	sk021-01	sk022-01
	9	11	12	14	15	16	17	18	19
	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール 名	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤								
	2 薬剤								
	3 薬剤								
	4 薬剤								
	5 薬剤								
	6 薬剤								
	7 薬剤								
	8 薬剤								
	9 薬剤								
	10 薬剤								
	11 薬剤								
	12 薬剤								
	13 薬剤								
	14 薬剤								
	15 薬剤								
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠 内服	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ランダ (10mg~20mg/body) 全量100mLに 上ルートより メインはフラッシュ用生食50mL 動脈注射 (15分)	ラクテック500mL 1袋 メインルート	アービタックス ・イリノテカンweekly (初回)	アービタックス ・イリノテカンweekly	アービタックス・イリノテカン Biweekly (初回)	アービタックス・イリノテカン Biweekly
手技	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	動脈注射 (15分)	持続点滴末梢 (90分)	day1.8.15.22	day1.8.15.22	day1.15.23	day1.15.23
2 薬剤	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/ mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (25mg/mf) 始め10分は速度半分 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロラシル (500~1000mg/body) 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル (400mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用
手技	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (60分)	動注 (3hr)	持続点滴末梢 (24hr)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (100mg/mf) Rp.4と同時に 下ルートより	休薬完了 day7	休薬完了 day7	休薬完了 day7	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食500mL 1袋 アービタックス (400mg/mf) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス (400mg/mf) を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに
手技	持続点滴末梢 (120分)				持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (60分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) Rp.3と同時に 上ルートより	3投1休が標準 (day1.8.15 4weekごと)			アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢 (120分)				持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)
5 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/mf) 全開で				生食 500mL 1袋 ランダ (40mg/mf) 全 量を500mLに Rp.4終了後 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)
手技	静脈注射緩徐に (15分)				持続点滴末梢 (120分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)	持続点滴末梢 (90分)
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf)				生食 20mL 1A ランックス注20mg 1A 上ルートより				
手技	持続点滴末梢 (22hr)				静脈注射	day29.36	day29.36	day8.22.36.43	day8.22.36.43
7 薬剤					ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用
手技	day2				持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)	持続点滴末梢 (30分)
8 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V				ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/mf) 全量を250mLに
手技	持続点滴末梢 (30分)				持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)
9 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (100mg/mf)				ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢 (120分)				持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)	持続点滴末梢 (60分)
10 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/mf) 全開で					休薬完了 day42	休薬完了 day42	休薬完了 day49	休薬完了 day49
手技	静脈注射緩徐に (15分)				day2~5				
11 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/mf)				生食 500mL 1袋 フルオロラシル (400mg/mf) 下ルートより				
手技	持続点滴末梢 (22hr)				持続点滴末梢 (24hr)				
12 薬剤	休薬完了 day14				計5コース				
手技									
13 薬剤					休薬完了 day7				
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sk024-08	sk025-08	sk026-01	sk027-01	sk028-05	sk029-01	sk030-01	sk031-04	sk032-04
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	入院	入院	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール 名	ケモセーフ(LVIは、シール) FOLFIRI・アービタックス(初回)	ケモセーフ(LVIは、シール) FOLFIRI・アービタックス	ケモセーフ レミケード	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(LVIは、シール) アバステン・mFOLFOX6 (インフューザー用)	ケモセーフ SOX/XELOX・アバステン	ケモセーフ SOX/XELOX	ケモセーフ(LVIは、シール) FOLFIRI(インフューザー用)	ケモセーフ(LVIは、シール) FOLFIRI・ アバステン(インフューザー用)
投与順序	1 薬剤								
	アービタックスは2回目以降 250mg/m ² (60分) 全量250mL		生食 100mL 1瓶 ソル・コーデフ100mg 1V		生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン (7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可
手技	day1	day1	持続点滴末梢(30分)	day1-5,8-12	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ5錠服用	グラニセロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ5錠服用	生食250mL 1袋 レミケード (5mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル(500mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	休業完了day14	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋			5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより	day1から2週間TS-1またはゼ ローダ内服		生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(120分)		day8、15は、休業週	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより			生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/m ²) 全開で		休業完了day21	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	生食 50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開で
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			静脈注射緩徐に	day8、15は、休業週		持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に
6 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより			生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	休業完了day21			生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(46hr)			day8は、休業週	持続点滴末梢(46hr)
7 薬剤	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/m ²) 全開で	生食50mL 1瓶 フルオロウラシル (400mg/m ²) 全開で						休業完了day14	
手技	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に			day8は、休業週				day8は、休業週
8 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/m ²)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラシル(2400mg/m ²)			休業完了day14				休業完了day14
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)							
9 薬剤									
手技	day8	day8							
10 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコウ5錠服用							
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)							
11 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに							
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)							
12 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋							
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)							
13 薬剤	休業完了day14	休業完了day14							
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sk033-04 入院・外来 29	sk034-04 入院・外来 30	sk035-02 入院・外来 31	sk036-02 入院・外来 32	sk037-02 入院 33	sk038-02 入院 34	sk039-01 入院・外来 35	sk040-02 入院 36	sk041-02 入院・外来 37
プロトコール 名	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI・アービタックス(初回) (インフューザー用)	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI・アービタックス (インフューザー用)	ケモセーフ(LVは、シール) mFOLFOX6・アービタックス(初回) (インフューザー用)	ケモセーフ(LVは、シール) mFOLFOX6・アービタックス(イン フューザー用)	ケモセーフ(LVは、シール) ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール) ケモセーフ(LVは、シール)	従来通り(シール) ベクティビックス	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI・ベクティビックス	ケモセーフ(LVは、シール) FOLFIRI・ベクティビックス (インフューザー用)
投与順序	1 薬剤 アービタックスは2回目を以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL		アービタックスは2回目を以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL		アービタックスは2回目を以降 250mg/㎡(60分) 全量250mL		生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)	グラネセロ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	day1 持続点滴末梢(60分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	グラネセロ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	グラネセロ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 250mL 1袋	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/㎡) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	休業完了day14	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋		5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/㎡) Rp.5と同時 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/㎡) Rp.4と同時 上ルートより	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル (400mg/㎡) 全開で
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に
7 薬剤	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル (400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/㎡) 全開で	生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/㎡) 全開で	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラル (2400mg/㎡) 全開で	生食 100mL フルオロウラル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節
手技	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)
8 薬剤	生食 100mL フルオロウラル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 100mL フルオロウラル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 100mL フルオロウラル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	生食 100mL フルオロウラル(2400mg/㎡) 全量100mL 生食で調節	ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラル (2400mg/㎡)	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラル(2400mg/㎡)		休業完了day14	休業完了day14
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)			
9 薬剤									
手技	day8	day8	day8	day8	day8	day8			
10 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠 服用		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
11 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/㎡) 全量を250mLに		
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
12 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋		
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		
13 薬剤	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14	休業完了day14		
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sk042-02 38	sk043-02 39	sk044-01.sk045-01 40	sk046-01 42	sk047-01 43	sk049-01 44	sk050-01 45	sk051-01 46	
入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院	入院	入院・外来	入院・外来	
ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール 名	mFOLFOX6+ベクテビックス	mFOLFOX6+ベクテビックス (インフューザー用)	ハーセプチン・XP	TS-1・タキソテール	DCF	CDDP・CPT-11(Biweekly)	タキソテール	シスプラチン・ラステット	
投与順序	1 薬剤 グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ハーセプチンは2回目を降 6mg/kg(30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		グラネトロン注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	day2・3	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (6mg/kg)	生食100mL 1瓶 ベクテビックス (6mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フアモチジン注20mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/100mL) 調製時ポンピング必要	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/100mL) 調製時ポンピング必要	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/100mL) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/100mL)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
3 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.3と同時に 下ルートより		生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/100mL) Rp.1と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/100mL) 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	day8、15は、休業週	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	day8、15は、休業週	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/100mL) Rp.5と同時に 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/100mL) Rp.5と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、 6mg/kg Rp.2と同時に、上ルートより	休業完了day21	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (30mg/100mL) 全量を500mL	休業完了day21	マンニトールS300mL 200mL
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/100mL) Rp.4と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/100mL) Rp.4と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 下ルートより		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 ランダ (30mg/100mL) ランシックス注20mg 1A	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/100mL) 全量を500mL 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤	生食 50m mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/100mL) 全開で	生食 50m mL 1瓶 フルオロラシル (400mg/100mL) 全開で	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/100mL) Rp.4と同時に 全量を500mLに 上ルートより		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/100mL) Rp.4終了後 上ルートより 調製時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	
7 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロラシル (2400mg/100mL)	生食 100mL フルオロラシル (2400mg/100mL) 全量100mL 生食で調節	ソルデム3A500mL 1袋		生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/100mL) 全量を500mLに 上ルートより		休業完了day14		
手技	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(46hr)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	day4・5	day4・5	day2・3	day2・3	
8 薬剤	休業完了day14	休業完了day14	生食 500mL 1袋		ラクテック500mL 1袋 ランダ終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 フルオロラシル (800mg/100mL) 下ルートより	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		
手技			持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
9 薬剤			マンニトール300mL 1瓶		ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/100mL)		
手技			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)		
10 薬剤			生食 50m mL 1瓶 ランシックス20mg 1A		マンニトール300mL 1瓶 メインルートより				
手技			持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	day15	day15	day8、15は、休業週		
11 薬剤					カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		休業完了day21		
手技			day2~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)			
12 薬剤			生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		生食 250mL 1袋 ドセタキセル (30mg/100mL) 調製時ポンピング必要			イメド内服	
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)				
13 薬剤			ソルデム1 500mL 1袋			休業完了day28			
手技			持続点滴末梢(90分)						
14 薬剤			生食 500mL 1袋						
手技			持続点滴末梢(120分)						
15 薬剤			休業完了day21						
手技									

コード ナンバリング	sk052-01	sk053-01	sk055-01	sk056-01	sk057-01	sk058-01	sk059-01	sk060-01	sk061-01
	入院・外来 47	入院・外来 48	入院・外来 49	入院・外来 50	入院 51	入院 52	入院 53	入院・外来 54	入院 55
プロトコール名	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)
	GEM+CDDP	TS-1+CPT-11(術前CRT)	タキソール+サイラムザ	サイラムザ(単剤)	FP(700-70)+RT	術前FP(800-80)	FP(800-80)	CDDP+5-FU肝動注	NDP+5-FU+RT
投与順序	1 薬剤	★TS-1 day1~day5 day8~day12 day22~day26 day29~day33		生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) Rp.1と同時にレスチンコーワ5錠 内服	イメド内服	ラクテック500mL 1袋 メインルート	ラクテック500mL 1袋 メインルート	投与速度注意！ 入院と外来で速度が違う	ラクテック500mL 1袋 メインルート
手技	day1, 3	day1, 8, 22, 29	day1, 15	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day1~5	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	生食1000mL 1袋 メイプル Rp.2と同時に	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコーワ5錠内服	生食 50mL 1瓶 全開で	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メイプル 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ランダ (10mg~20mg/body) 全量100mLに メインはフラッシュ用生食50mL 経口補水液(OS1)1L/Day摂取	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) Rp.1投与60分後 下ルートより
手技	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	動脈注射(外来:30分、入院:60)	持続点滴末梢(24hr)
3 薬剤	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時に	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg)		ラクテック500mL 1袋 硫酸Mg補正液 8mEq メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル	5%ブドウ糖500mL 1袋 フルオロウラシル (250~500mg/body)	ラクテック500mL 1袋 メイプル
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8は、休薬週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	動注(外来:3hr、入院:5hr)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 ランダ注 (25mg/mf) 下ルートより		生食 50mL 1瓶 全開で	休薬完了day14	マンニトール 200mL メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル	休薬完了day7	ラクテック500mL 1袋 メイプル
手技	持続点滴末梢(60分)	day15は休薬	持続点滴末梢		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)
5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/mf) 下ルートより	休薬完了day35	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/mf)		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/mf) Rp.5と同時 下ルートより	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メイプル	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メイプル		アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メイプル
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
6 薬剤	生食 50mL 1瓶 ランックス注20mg 1A 下ルートより				生食 500mL 1袋 シスプラチン (70mg/mf) 全量を500mLに Rp.4と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mLに Rp.5終了後 下ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mLに Rp.5終了後 下ルートより		生食 500mL 1袋 アクブラ (90mg/mf) Rp.5終了後 上ルートより
手技	持続点滴末梢(10分)		day8		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(90分)
7 薬剤	生食500mL 1袋 下ルートより		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 フアモチン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコーワ5錠内服		ラクテック500mL 1袋 メイプル	生食 20mL 1A ランックス注20mg 1A 上ルートより	生食 20mL 1A ランックス注20mg 1A 上ルートより		生食 20mL 1A ランックス注20mg 1A 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	静脈注射	静脈注射		静脈注射
8 薬剤			生食 250mL 1袋 バクリタキセル注 (80mg/mf)			ラクテック500mL 1袋 メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル		ラクテック500mL 1袋 メイプル
手技	day15は休薬		持続点滴末梢(60分)		day2~4	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)
9 薬剤	休薬完了day21		休薬完了day28		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル		ラクテック500mL 1袋 メイプル
手技					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(90分)
10 薬剤					生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (700mg/mf) 下ルートより	ラクテック500mL 1袋 メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル		
手技					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		day2~5
11 薬剤					休薬完了day28	ラクテック500mL 1袋 メイプル	ラクテック500mL 1袋 メイプル		生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メイプル
手技						持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)
12 薬剤									生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) 下ルートより
手技						day2~5	day2~5		持続点滴末梢(24hr)
13 薬剤						生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メイプル	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メイプル		休薬完了day28
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
14 薬剤						生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (800mg/mf) 下ルートより		
手技						持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)		
15 薬剤						休薬完了day21	休薬完了day28		
手技									

コード ナンバリング	sk062-01.sk063-01 56
	入院 ・ 外来
	ケモセーフ
プロトコール 名	ハーセブチン・XP(ショートハイドレ ジョン)
投与順序	1 薬剤 ハーセブチンは2回目以降 6mg/kg(30分)
	手技 day1
	2 薬剤 アロキン注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V ファモチジン注20mg 1V 投与中に経口補水液(OS)1L 摂取
	手技 持続点滴末梢(30分)
	3 薬剤 生食 250mL 1袋 ハーセブチン 初回は、 8mg/kg 2回目以降は、 6mg/kg 上ルートより
	手技 持続点滴末梢(90分)
	4 薬剤 ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq
	手技 持続点滴末梢(60分)
	5 薬剤 マンニトール 200mL
	手技 持続点滴末梢(30分)
	6 薬剤 生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/ml) 全量を500mLに 上ルートより
	手技 持続点滴末梢(120分)
	7 薬剤 生食 250mL 1袋
	手技 持続点滴末梢(30分)
	8 薬剤 休薬完了day21
	手技
	9 薬剤 イメンド内服
	手技
	10 薬剤
	手技
	11 薬剤
	手技
	12 薬剤
	手技
	13 薬剤
	手技
	14 薬剤
	手技
	15 薬剤
	手技

コード ナンバリング	sk064-01	sk065-01	sk066-01	sk067-01	sk068-01	sk069-01	sk070-01	sk071-01	
	入院・外来 57	入院・外来 58	入院 59	入院・外来 60	入院・外来 61	入院・外来 62	入院・外来 63	入院・外来 64	
プロトコール名	ケモセーフ パラプラチン・ Monthlyタキソール	ケモセーフ 5-FU+MMC+RT	ケモセーフ(下ルート) 術前DCF療法	ケモセーフ GCS	ケモセーフ ザノサー単剤Daily	ケモセーフ ザノサー単剤Weekly	ケモセーフ ザノサー+5-FU	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルタなし)	
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 フアモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスタシコウ5錠服用		イメンド内服	イメンド内服 デキサート注6.6mg/日内服 (Day2~4)		生食 500mL 1袋		カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day2-3	day1	day1~5	持続点滴末梢(90分)	day1~3	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注3mg 1袋	ラクテック500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋	グラニセロ注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 500mL 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/rl)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/rl)	グラニセロ注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/rl) Rp.1と同時に 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/rl) 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/rl)	グラニセロ注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 ザノサー(1000mg/rl)	グラニセロ注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶 マドマイシン(10mg/rl) 上ルートより	生食 500mL 1袋 硫酸Mg補正液 1A メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/rl)	生食 250mL 1袋	生食 100mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/rl)	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	day2,3
5 薬剤		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/rl) 下ルートより	アロキシ注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	マンニトールS 200mL	生食 250mL 1袋	休業完了day7	生食 100mL 1瓶 ザノサー(500mg/rl)	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤	休業完了day21		生食 250mL 1袋 ドセタキセル(70mg/rl) Rp.4終了後 上ルートより 腫瘍時ポンピング必要	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ(25mg/rl)	休業完了day42		生食 250mL 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/rl)
手技		day2~4	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
7 薬剤	カルボプラチンはAUC6に減量 されていても問い合わせ不要	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート	生食 500mL 1袋 ランダ(70mg/rl) 全量を500mLに 下ルートより		ソルデム3A500mL 1袋		休業完了day42		
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	day4-5	持続点滴末梢(60分)				day8,15は、休業週
8 薬剤		生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(800mg/rl) 下ルートより	ラクテック500mL 1袋 ランダ終了後 メインルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(750mg/rl) 下ルートより	休業完了day14				休業完了day21
手技		持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)					
9 薬剤		休業完了day28	ソルデム3A500mL 1袋 メインルートより	ラクテック500mL 1袋 メインルートより	day1から1週間 TS-1(80mg/m ²)内服				
手技			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					
10 薬剤		通常2クールで終了	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	休業完了day21					
手技			持続点滴末梢(60分)						
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sk072-01 65	sk073-01 66	ge022-05 3	ge023-05 4	ge024-08 5	ge025-08 6	ge027-02 8	ge028-01 9	ge035-01 11
入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ポンプ・シリンジ	ポンプ・シリンジ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	LFP変法(限定3)	LFP動注療法	FOLFOX6	FOLFOX6・ アバステン	FOLFIRI	FOLFIRI・ アバステン	イリノテカン(80mg/m ²)	ジェムザール	アービタックス(初回)
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤	8 薬剤	9 薬剤
1 薬剤	インフューザーポンプ SFS-1005D(P)	インフューザーポンプ SFS-1005D(P)	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アバステン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用
手技	day1	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1瓶 フルオロウラル(1250mg/body) 全量60mL 生食で調節	生食100mL 1瓶 フルオロウラル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/ml) Rp.3と同時に 下ルートより	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/ml) Rp.3と同時に 下ルートより	グラニセロン注ハッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ジェムザール(1000mg/ml)	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/ml) 全量を500mLに
手技	動注(120時間)	動注(5日間)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリアチン注(85mg/ml) Rp.2と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/ml) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/ml) Rp.2 と同時に 上ルートより	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/ml) Rp.4と同時に 下ルートより	day1~day15の計3回	生食 250mL 1袋	
手技	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8は休薬	持続点滴末梢(60分)	
4 薬剤			生食50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/ml) 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリアチン注(85mg/ml) Rp.3と同時に 上ルートより	生食50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/ml) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/ml) Rp.3同時に 上ルートより	休薬完了day14	休薬完了day7	
手技	day3	day2~5	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(120分)	day22は休薬		
5 薬剤	シスプラチン(5mg/body)	シスプラチン(10mg/body)	ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラル(2400mg/ml)	生食50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/ml) 全開で	ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラル(2400mg/ml)	生食50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/ml) 全開で	休薬完了day7		
手技	動注(30分)	動注(30分)	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(46hr)	静脈注射緩徐に			
6 薬剤	休薬完了day7			ソルデム3A 500mL 1袋 フルオロウラル(2400mg/ml)		ソルデム3A500mL 1袋 フルオロウラル(2400mg/ml)			
手技	day8,15,22	day8は、休薬週	day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)	day8は、休薬週	持続点滴末梢(46hr)			
7 薬剤	生食100mL 1瓶 フルオロウラル(1250mg/body) 全量70mL 生食で調節	休薬完了day14			休薬完了day14				
手技	動注(5日間)	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週	day8は、休薬週			
8 薬剤		シスプラチン(5mg/body)		休薬完了day14		休薬完了day14			
手技		動注(30分)							
9 薬剤									
手技		day10,17,24							
10 薬剤		シスプラチン(5mg/body)							
手技		動注(30分)							
11 薬剤		休薬完了day28							
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge036-01	ge039-01	ge040-04	ge48-01	ge053-01	ge054-01	ge065-01	ge066-01	ge067-01
	入院・外来 12	入院・外来 15	入院・外来 16	入院・外来 17	入院・外来 18	入院・外来 19	入院・外来 21	入院・外来 22	入院・外来 23
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	従来通り(シール)	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
	アービタックス	CPT-11(単剤)	mFOLFOX6(インフューザー用)	アバスチン(7.5mg/kg)・ゼロダ	ネダプラチン	5-FU(500mg/m ²)・LV(RPMI)	イリノテカン(150mg/m ²)	SOX/XELOX・アバスチン	SOX/XELOX
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスチンコウ5錠服用		カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アバスチン (7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 アバスチン (7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)
2 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.3と同時 下ルートより	休薬完了day21	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (100mg/m ²)	ソルデム3A 500mL 1袋 レボホリナートNa注 (250mg/m ²) 下ルート 開始60分後よりRp.3投与	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²)	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/m ²)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより	day1から2週間ゼロダ内服	ラクテック500mL 1袋	生食 50m 1袋 フルオロウラシル(500mg/m ²) 上ルート Rp.2開始60分後より 全開で	3回投与後、3週間休薬、 day49で1クール (2回投与後、3週間休薬、 day35で1クールの場合もあり)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	day1から2週間TS-1またはゼ ロダ内服
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴側管(120分)		持続点滴末梢(90分)	静脈注射緩徐に	day8は休薬	持続点滴末梢(120分)	
4 薬剤	休薬完了day7		生食50mL 1瓶 フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開で		ラクテック500mL 1袋	day1~36まで計6コース	休薬完了day14	day1から2週間TS-1またはゼ ロダ内服	
手技		day22は休薬	側注(5分)		持続点滴末梢(90分)	day43,50は休薬			day8,15は、休薬週
5 薬剤		休薬完了day28	生食 100mL フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節		休薬完了day28	休薬完了day7			休薬完了day21
手技			持続点滴末梢(46hr)					day8,15は、休薬週	
6 薬剤								休薬完了day21	
手技			day8は、休薬週						
7 薬剤			休薬完了day14						
手技									
8 薬剤									
手技									
9 薬剤									
手技									
10 薬剤									
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge068-01	ge099-01	ge104-01	ge105-01	ge106-01	ge107-01	ge108-01	ge109-01, ge110-01	ge111-01
	入院・外来 24	入院・外来 25	入院・外来 26	入院・外来 27	入院・外来 28	入院・外来 29	入院・外来 30	入院・外来 31	入院・外来 32
プロトコール名	従来通り(シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
	アバスチン(5mg/kg)・TS-1/ロザーフ	DOC+GEM (限定)	CPT-11+ベクティビックス	ジェムザール+アブラキサソ	FOLFIRINOX	IRIS+ベクティビックス	SOX(100mg/m ²)	XELOX+ハーセプチン(初回) XELOX+ハーセプチン	アバスチン+IRIS
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 アバスチン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート		アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 100mL 1瓶 アバスチン (7.5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	休薬完了 day14	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス (8mg/kg) 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(85mg/m ²) 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(100mg/m ²)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	TS-1 day1~42までで1コース day1から4週間投与	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m ²)	生食 250mL 1袋 メインルート	生食100mL (25mL/m ²) アブラキサソ注(125mg/m ²) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリサート (200mg/m ²) レボホリサート開始30分後からイリノテカン投与 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ベクティビックス (6mg/kg) 上ルートより	day1から2週間TS-1内服	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²)
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	ロザーフ(35mg/m ²) day1~28までで1コース day1-5 day8-12		生食 250mL 1袋 イリノテカン (150mg/m ²) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²) 下ルートより	生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) レボホリサート開始30分後から投与 上ルートより	生食 250mL 1袋 メインルート		day1から2週間ゼロダ内服	day1から2週間TS-1内服
手技			持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	day8,15は、休薬週		
5 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了 day14		生食50mL 1瓶 フルオロウラル (400mg/m ²) 全開で	生食 250mL 1袋 イリノテカン (100mg/m ²) 上ルートより	休薬完了 day21		休薬完了 day21
手技		持続点滴末梢(30分)		day22は、休薬週	静脈注射緩徐に	持続点滴末梢(90分)	day8,15は、休薬週		
6 薬剤		5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (70mg/m ²) 調製時ポンピング必要	休薬完了 day28		生食 100mL (入院ではフルオロウラル3A500mLもあり) フルオロウラル (2400mg/m ²) 全量10.0mL、生食で調製	day1から2週間TS-1内服	休薬完了 day21		
手技		持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(46hr)	day8,22は、休薬週			
7 薬剤		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(900mg/m ²)				休薬完了 day28	※ 1段階減量 75mg/m ²		
手技		持続点滴末梢(30分)			day8は、休薬週				
8 薬剤		休薬完了 day21			休薬完了 day14				
手技									
9 薬剤					イメド内服				
手技									
10 薬剤									
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge112-01 33	ge113-01 34	ge114-01 35	ge115-01 36	ge117-01 37	ge118-01 38	ge120-01 39	ge121-01 40	ge122-01 41
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(LVは、シール)	ケモセーフ
プロトコール名	SOX+アービタックス(初回)	SOX+アービタックス	ヨンデリス	FOLFIRI+サイラムザ	患者限定5-FU動注(Weekly)	5-FU肝動注(Weekly)	オブジーボ	FOLFIRI+ザルトラップ (インフューザー用)	XELIRI+アバスチン療法
投与順序	1 薬剤								
手技									
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アービタックス 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食100mL 1瓶	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg)	5%ブドウ糖250mL 1B 5-FU (500mg/m ²) Rp.2と同時 上ルートより 右のリザーバーから投薬	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 ザルトラップ (4mg/kg)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	中心静脈(30分)	持続点滴末梢(60分)	動脈注射(5時間)	動脈注射	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食500mL 1袋 アービタックス (400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量を250mLに	生食 500mL 1袋 ヨンデリス (1.2mg/m ²)	生食 50mL 1瓶 全開で	生食 50mL 1B ルートキープ用 左のリザーバー	休業完了day7	休業完了day14	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート(200mg/m ²) Rp.4と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (200mg/m ²)
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	中心静脈(24時間)	持続点滴末梢	動脈注射			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	休業完了day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 レボホリナート (200mg/m ²) Rp.5と同時 下ルートより	生食 50mL 1B ルートキープ用 右のリザーバー			生食 250mL 1袋 イリノテカン(180mg/m ²) Rp.3と同時 上ルートより	day1から2週間ゼローダ内服 (800mg/m ²)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)	動脈注射			持続点滴末梢(120分)	
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注(130mg/m ²)		生食 250mL 1袋 イリノテカン (180mg/m ²) Rp.4と同時 上ルートより	休業完了day7			生食 50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/m ²) 全開で	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)				静脈注射緩徐に	
6 薬剤				生食50mL 1瓶 フルオロウラル(400mg/m ²) 全開で				生食 100mL フルオロウラル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節	
手技	day8,15	day8,15		静脈注射緩徐に				持続点滴末梢(46hr)	
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用		生食 100mL フルオロウラル(2400mg/m ²) 全量100mL 生食で調節					
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(46hr)				day8は、休業週	
8 薬剤	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量を250mLに	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m ²) 全量を250mLに						休業完了day14	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		day8は、休業週					
9 薬剤	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋		休業完了day14					
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)							
10 薬剤	day1から2週間ゼローダ内服	day1から2週間TS-1内服							
手技									
11 薬剤	休業完了day21	休業完了day21							
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge123-01 42	ge124-01 43	ge125-01 44	ge127-01 45	ge128-01,ge129-01 46	ge130-01,ge131-01 47
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ(LVIは、シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール 名	アブラキサン+サイラムザ	FOLFOXIRI	FOLFOXIRI+Bev	アバスチン+イリノテカン	Her+S-1+CDDP療法	SOX+ハーセプチン
投与順序	1 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	ハーセプチンは2回目以降 6mg/kg(30分)	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg
手技	day1,15 持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	day1 持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし Rp.1と同時にレスタミン-75錠服用	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (185mg/mf) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 アバスチン (5mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg 投与中に経口補水液1L摂取 上ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)
3 薬剤	生食250mL 1袋 サイラムザ (8mg/kg) 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 イリノテカン (185mg/mf) 上ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (150mg/mf)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (130mg/mf)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	生食 50mL 1瓶 全開で	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (200mg/mf) オキサリプラチンと同時に投与開始 下ルートより	休業完了day14	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq メインルート	day1から2週間TS-1内服
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		
5 薬剤	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/mf) 全量230mL、生食で調製	5%ブドウ糖250mL 1袋 オキサリプラチン注 (85mg/mf) レボホリナートと同時に投与開始 上ルートより		マンニトール 200mL メインルート	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(48hr)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業適	
6 薬剤			生食 250mL (入院ではソルデム3A500mLもあり) フルオロウラシル(3200mg/mf) 全量230mL、生食で調製		生食 500mL 1袋 ランダ (60mg/mf) 全量を500mLに 上ルートより	休業完了day21
手技	day8	day8は、休業適	持続点滴末梢(48hr)	持続点滴末梢(120分)		
7 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	休業完了day14			生食 500mL 1袋 メインルート	
手技	持続点滴末梢(30分)		day8は、休業適		持続点滴末梢(60分)	
8 薬剤	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄	使用するインフューザーポンプは「LV5」	休業完了day14		休業完了day21	
手技	day22は、休業適					
9 薬剤	休業完了day28	イメンド内服	使用するインフューザーポンプは「LV5」		イメンド内服	
手技						
10 薬剤			イメンド内服		day1から2週間TS-1内服	
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						
15 薬剤						
手技						