

コード ナンバリング	sf001-03	sf002-06	sf004-06	sf005-05	sf006-03	sf007-02	sf009-01	sf010-01	sf011-03
入院・外来	1	2	4	5	6	7	9	10	11
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ
プロトコール名	TJ weekly	TJ	DJ	CAP	CPT-11・CDDP	weeklyCDDP-RT	ドキシル(BSA1.5ml未満)	ドキシル(BSA1.5ml以上)	AP
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
投与順序	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤	2 薬剤
投与順序	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤	3 薬剤
投与順序	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤	4 薬剤
投与順序	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤	5 薬剤
投与順序	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤	6 薬剤
投与順序	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤	7 薬剤
投与順序	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤	8 薬剤
投与順序	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤	9 薬剤
投与順序	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤	10 薬剤
投与順序	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤	11 薬剤
投与順序	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤	12 薬剤
投与順序	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤	13 薬剤
投与順序	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤	14 薬剤
投与順序	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤
投与順序	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤	15 薬剤

コード ナンバリング	sf012-01	sf013-02	sf014-01	sf015-01	sf016-01	sf017-01
	入院 12	入院 13	入院 14	入院 15	入院・外来 16	入院 17
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)	ケモセーフ	カテーテルシリンジチップ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	CPT-11・NDP	IAP	トボテカン	CDDP腹腔内	タキソテール	EMA/CO
投与順序	1 薬剤 グラネセロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	イメンド内服	グラネセロン注バッグ 1袋 デキササート注6.6mg 0.5V	ラクテック500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	ロコホリン錠15mg 12時間ごと に4回 イトリキセート投与開始後24時 間より服用開始
手技	持続点滴末梢(30分)	Day1~4	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	Day1 Day8
2 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (50mg/㎡)	ラクテック500mL 1袋 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ハイカムテン(1.5mg/㎡)	グラネセロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食500mL 1袋 ドセタキセル (70mg/㎡) 調製時ポンピング必要	グラネセロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 アクブラ注 (80mg/㎡)	グラネセロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V ラテック開始60分前から メインルート	day1~5まで計5コース	生食250mL 150mL ランダ注 (50mg/㎡)		蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)		腹腔内投与	day8_15は、休薬週	生食 250mL 1袋 エンドキサン注(800mg/㎡)
4 薬剤	ラクテック500mL 1袋 ランックス注20mg 0.25A	ドキシソリン注 (40mg/㎡) イホマイドへ置き換え時 下ルートより Day4のみ	休薬完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 ランックス注20mg 0.5A	休薬完了 day21	生食 20mL 1A オンコピン注 (0.8mg/㎡) 下ルートより ◆シリンジで調製 MAX.2mg/body...主治医がiv
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(120分)		生食 500mL 1袋 エトポシド注(100mg/㎡) 上ルートより
5 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL注 1キット	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/㎡) ウロミテキサン1回目と同時に 上ルートより		ラクテック500mL 1袋 KCL注 1キット		生食 50mL 1瓶 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(12時間)
6 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/㎡) (イホマイドの20%相当) イホマイドと同時に 下ルートより		ソルデム3A 500mL 1袋		生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより
手技	day8、day15	持続点滴側管(30分)		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(60分)
7 薬剤	グラネセロン注キット3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 シスプラチン注 (20mg/㎡) 上ルートより		ラクテック 500mL 1袋		イメンド内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)		Day2
8 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (50mg/㎡)	マンニトールS 300mL 1瓶 ウロミテキサン2回目と同時に 上ルートより		休薬完了 day7		グラネセロン注バッグ3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルートより フィルタースなし
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(30分)
9 薬剤	休薬完了 day28	生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/㎡) (イホマイドの20%相当) マンニトールと同時に 下ルートより		調製方法 別紙参照		蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製
手技		持続点滴側管(30分)				生食 500mL 1袋 エトポシド注 (100mg/㎡) 上ルートより
10 薬剤		ラクテック 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A グラネセロンと同時に メインルート				生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより
手技		持続点滴末梢(3hr)				持続点滴末梢(60分)
11 薬剤		グラネセロン注バッグ3mg 1袋 Rp.9と同時に 下ルートより				生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより
手技		持続点滴側管(30分)				持続点滴末梢(60分)
12 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A ウロミテキサンと同時に メインルート				生食 50mL 1瓶 全開で メインルートより
手技		持続点滴末梢(3hr)				持続点滴末梢(60分)
13 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロミテキサン注 (300mg/㎡) (イホマイドの20%相当) Rp.11と同時に 下ルートより				
手技		持続点滴側管(30分)				
14 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メイロン7%20mL 1A メインルート				
手技		持続点滴末梢(2hr)				
15 薬剤		休薬完了 day21				
手技						

コード	sf018-01	sf019-01	sf020-01	sf021-01	sf022-02	sf023-03	sf024-04	sf025-01
ナンバリング	18	19	20	21	22	23	24	25
入院	入院	入院	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	従来通り(シール)	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	BEP療法		FP療法	アドリアン療法	カンプト	GP+アバステン	ジェムザール	DC+アバステン
投与順序	1 薬剤		ラクテック 500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にシムスコウ75T内 縮可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にベオ5T内服
手技	day1	day2~3	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 フルオロウラル (700mg/㎡) Rp.1投与60分後	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピシン (60mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/㎡)	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 (175mg/㎡)	休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 ドセタキセル注 (70mg/㎡) 調製時ポンピング必要
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(180分)
3 薬剤	グラセロニ注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより	ラクテック 500mL 1袋	休薬完了 day21	day1~15まで計3コース	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC5) MAX750mg	day1~day15の計3回	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注 (AUC5) MAX750mg
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)		day22は、休薬週	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ブドウ糖5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/㎡) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後	ブドウ糖5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/㎡) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後	ラクテック 500mL 1袋		休薬完了 day7	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可		生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)			持続点滴末梢(90分)	day22は休薬	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V		イメンド内服	休薬完了 day21	休薬完了 day7	休薬完了 day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)					
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/㎡) 下ルートより Rp.3終了後	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/㎡) 下ルートより Rp.3終了後	生食 500mL 1袋 ランダ (70mg/㎡) 全量を500mLに			イメンド内服		イメンド内服
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 20mL 1A ラシックス注20mg 1A					
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5時間)	静脈注射					
8 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ラクテック 500mL 1袋					
手技	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(60分)					
9 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート	ラクテック 500mL 1袋					
手技	持続点滴末梢(5時間)	持続点滴末梢(4時間45分)	持続点滴末梢(60分)					
10 薬剤	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート		ラクテック 500mL 1袋					
手技	持続点滴末梢(4時間45分)	day8,15	持続点滴末梢(60分)					
11 薬剤	エトボシドはフィルターなし!	生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより	ラクテック 500mL 1袋					
手技		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)					
12 薬剤	day1~3 イメンド内服	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用						
手技		持続点滴末梢	day2~4					
13 薬剤		休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 フルオロウラル (700mg/㎡)					
手技			持続点滴末梢(24hr)					
14 薬剤			休薬完了 day21					
手技								
15 薬剤			イメンド内服					
手技								

コード	sf026-01	sf027-01	sf028-01	sf030-01	sf031-01	sf032-01			
ナンバリング	26	27	28	29	30	31			
ルート	入院・外来	入院	入院・外来	入院・外来	入院	入院			
プロトコール名	ケモセーフ CPT-11(単剤)	ケモセーフ(下ルート) AI療法	ケモセーフ パラブラチン・ジェムザール	ケモセーフ ゲムシタピン+アバステン	ケモセーフ(下ルート) AI療法(限定)(杉本正子)	ケモセーフ(下ルート) EP/EMA療法			
投与順序	1 薬剤	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製	イメンド内服	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製	Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロチキサンは薬剤師が調製	ロコボリン錠15mg 12時間ごと に4回 メトトレキデート投与開始後24時間より服用開始		
手技	day1,8,15	day1,2	day3,4,5	day1	day1,2,3	day4,5	Day1 Day8		
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 メインルートより フィルターなし	クワンチロ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルターなし
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/m <sup>2</sup> )	クワンチロ注キト3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	クワンチロ注キト3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/m <sup>2</sup> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/m <sup>2</sup> )	クワンチロ注キト3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	クワンチロ注キト3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 エトボシド注 (100mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (400mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (400mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時に 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 4) MAX800mg	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (300mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時に 下ルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (300mg/m <sup>2</sup> ) Rp.4と同時に 下ルートより	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5B メインルートより	生食 500mL 1袋 メトトレキデート (300mg/m <sup>2</sup> ) 下ルートより
手技	day22は休業	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)
5 薬剤	休業完了day28	生食 500mL 1袋 イホマイド (2g/m <sup>2</sup> ) Rp.3と同時に 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド (2g/m <sup>2</sup> ) Rp.3と同時に 上ルートより			生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	生食 500mL 1袋 イホマイド (1.5g/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	生食 500mL 1袋 ラステット注 (150mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ※シリンドジで調製
手技		持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)	day8	day8, 15	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(240分)	持続点滴末梢(60分)	静脈注射
6 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (400mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (400mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (300mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (300mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (75mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 下ルートより 点滴バッグは減光	休業完了day14
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(12時間)	
7 薬剤		生食 500mL 1袋 ドキシソビシン注 (30mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/m <sup>2</sup> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/m <sup>2</sup> )	生食 500mL 1袋 ドキシソビシン注 (20mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	ラクテック 500mL 1袋 ラシックス 1A メインルートより	
手技		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	
8 薬剤		マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (400mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより			マンニトール300mL 1瓶 メインルートより	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (300mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	day15は、休業週	day22は、休業週	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	
9 薬剤		生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (400mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休業完了day21	休業完了day28	生食 100mL 1瓶 ウロチキサン注 (300mg/m <sup>2</sup> ) メインルートより	ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより		
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5時間)		
10 薬剤		ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			ソルデム3AG 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより		
手技		持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間)		
11 薬剤		ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより		
手技		持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)			持続点滴末梢(4時間30分)	持続点滴末梢(5時間30分)		
12 薬剤		ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休業完了day21			ソルデム1 500mL 1袋 メイロン 20mL 1A メインルートより	休業完了day21		
手技		持続点滴末梢(4時間30分)				持続点滴末梢(4時間30分)			
13 薬剤		9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始	9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始			9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始	9時開始レジメン ウロチキサン・イホマイドは11時開始		
手技									
14 薬剤		day1~3イメンド内服				day1~3イメンド内服			
手技									
15 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	sf033-01	32	sf034-01	32
ルート	ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール 名	FA		MEA療法	
投与順序	1 薬剤		ロイホリン錠15mg 12時間ごとに3回 マイトキサート投与開始後24時間より服用開始	
手技		day1~5		day1
2 薬剤	グラニセロン注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより		グラニセロン注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより フィルタートレ	
手技		持続点滴末箱(30分)		持続点滴末箱(30分)
3 薬剤	生食 500mL 1V フルオロウラル(1500mg/body) 上ルートより		蒸留水 6mL メントレキセート(150mg/body) 1Vあたり蒸留水2mLで溶解 下ルートより ◆シリンジで調製	
手技		持続点滴末箱(8hr)		静脈注射
4 薬剤	蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製		生食 500mL 1袋 メントレキセート(300mg/body) 下ルートより	
手技				持続点滴末箱(4時間)
5 薬剤	休業完了day14		蒸留水 1.1mL コスメゲン (0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	
手技				静脈注射
6 薬剤			生食 500mL 1袋 ラステット注(100mg/body) 上ルートより	
手技				持続点滴末箱(60分)
7 薬剤				
手技				day2~5
8 薬剤			グラニセロン注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1B メインルートより フィルタートレ	
手技				持続点滴末箱(30分)
9 薬剤			蒸留水 1.1mL コスメゲン(0.5mg/body) 下ルートより ◆シリンジで調製	
手技				静脈注射
10 薬剤			生食 500mL 1袋 ラステット注(100mg/body) 上ルートより	
手技				持続点滴末箱(60分)
11 薬剤			休業完了day14	
手技				
12 薬剤			イメンド内服	
手技				
13 薬剤				
手技				
14 薬剤				
手技				
15 薬剤				
手技				