

コード	kk001-06	kk002-05	kk003-05	kk004-06	kk005-06	kk006-06	kk007-03
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	シスプラチン・ ジェムザール	シスプラチン・ ナベルピン	シスプラチン・ TS-1	シスプラチン・ カンプト	シスプラチン・ タキソテル	シスプラチン・ ラスト	パラプラチン・ Monthlyタキソール
投与順序 1 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	★TS-1開始時がday1	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/mf) 全開で	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/mf) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボンド (100mg/mf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全 量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全 量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全 量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全 量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全 量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全 量を500mL 下ルートより	day8.15は、休業週
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
7 薬剤							カルボプラチンはAUC5Iに減量さ れていても問い合わせ不要
手技	day8	day8	day15,22,29は、休業週	day8,15	day8.15は、休業週	day2,3	
8 薬剤	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/mf) 全開で	休業完了day35	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	イメンド内服	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	イメンド内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボンド(100mg/mf)	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)	
10 薬剤							
手技	day15は、休業週	day15は、休業週		day22は、休業週		day8.15は、休業週	
11 薬剤	休業完了day21	休業完了day21		休業完了day28		休業完了day21	
手技							
12 薬剤	イメンド内服	イメンド内服		イメンド内服		イメンド内服	
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk008-03	kk009-04	kk010-03	kk011-03	kk012-03	kk013-03	kk014-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
薬名	生食 100mL 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	カイトリル注ハッグ3mg 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(60mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(40mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 4) MAX600mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン(40mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	day8	day2,3	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週
5 薬剤		休業完了 day7	休業完了 day21	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	day1~15まで計3コース	休業完了 day21
手技	day8,15			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day22は、休業週	
6 薬剤	生食 100mL 1瓶 ザンタック注50mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用	day1~36まで計6コース		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド(100mg/mf)	休業完了 day28	
手技	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		
7 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋						
手技	持続点滴末梢(30分)			day15は、休業週	day8,15は、休業週		
8 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(60mg/mf)			休業完了 day21	休業完了 day21		
手技	持続点滴末梢(120分)						
9 薬剤							
手技	day22は、休業週						
10 薬剤	休業完了 day28						
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk016-03	kk017-03	kk018-03	kk019-03	kk020-05	kk022-04	kk023-03	kk024-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	タキソール	Triweeklyタキソテール	Biweeklyタキソテール	ジェムザール	ナベルピン	カンプト	カルセド	ハイカムテン
1 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V
手技	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	day1,8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 1V Ro.1と同時にリスズンコート5錠服	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/mf) 調製時ポンピング必要	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 ハイカムテン (1.0mg/mf)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋			生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	day1~15まで計3コース	生食 100mL 1瓶 カルセド (40mg/mf) 全開で Rp.1終了後	day1~5まで計5コース
手技	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週	day8は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管	day22は、休業週	持続点滴側管(約10分)	
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注 (60mg/mf)	休業完了 day21		day1~15まで計3コース	day1~8まで計2コース	休業完了 day7	day1~3	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(120分)		day15	day22は、休業週	day15は、休業週			
5 薬剤	day1~15まで計3コース		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了 day28	休業完了 day21		休業完了 day21	
手技	day22は、休業週		持続点滴末梢(30分)					
6 薬剤	休業完了 day28		5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/mf)					
手技			持続点滴末梢(90分)					
7 薬剤								
手技			day22は、休業週					
8 薬剤			休業完了 day28					
手技								
9 薬剤								
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
17 薬剤								
手技								

コード	kk025-04	kk026-03	kk027-03	kk028-02	kk029-03	kk030-02	kk031-02
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 従来通り(シール)	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	シスプラチン・アリムタ	Biweekly ジェムザール	Biweekly パラプラチン・カンプト	アリムタ	パラプラチン・タキソール・アバステン	アバステン	パラプラチン・アリムタ
投与順序 1 薬剤	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注1mg筋注	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタミンコー75錠服用	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注
手技	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1
2 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン (40mg/㎡)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋	休薬完了day21	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	休薬完了day14	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(200mg/㎡)		生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(10分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(10分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq			休薬完了day21	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg
手技	持続点滴末梢(60分)		day8は、休薬週		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	マンニトールS 200mL		休薬完了day14		生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可		
手技	持続点滴末梢(30分)				持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休薬週
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (75mg/㎡) 全量を500mL				休薬完了day21		休薬完了day21
手技	持続点滴末梢(120分)						
7 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋						
手技	持続点滴末梢(60分)						
8 薬剤							
手技	day8,15は、休薬週						
9 薬剤	休薬完了day21						
手技							
10 薬剤	イメンド内服						
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk032-01	kk033-01	kk034-01	kk035-06	kk036-01	kk037-01	kk038-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名	アリムタ・アバステン	パラプラチン・アリムタ・アバステン	アクブラ・タキソテール	シスプラチン・タキソテール (放射線併用)	ドセタキセル+サイラムザ	オブジーボ	カルボプラチン+アブラキサン
投与順序	1 薬剤 1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスミンコ-75T内服	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注 (240mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1,8,29,36 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ポンピング必要	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V 投与中に水分1L摂取	生食250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注 (500mg/mf)	生食 500mL 1袋 アクブラ (100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了 day14	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注 (100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ラクテック500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1B 硫酸Mg 8mEq	生食塩液250mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ポンピング必要		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	休業完了 day21	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	ラクテック500mL 1袋	マンニトールS 200mL	休業完了 day21		day8,15
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)			day8,15
6 薬剤		休業完了 day21	休業完了 day21	生食 500mL 1袋 ランダ (40mg/mf) 全量を500mL			カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技		day8,15は、休業週		持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)
7 薬剤		休業完了 day21		ソルデム3A500mL 1袋			生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注 (100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技				持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(30分)
8 薬剤							休業完了 day21
手技				day15,22,43は、休業週			
9 薬剤				休業完了 day49			
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk039-01	kk040-01	kk041-01	kk042-01	kk043-01	kk044-01	kk045-01
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	キイトルーダ	テセントリク	イミフィンジ	キイトルーダ・パラプラチン・アリムタ	キイトルーダ・パラプラチン・Monthlyタキソール	キイトルーダ・シスプラチン・アリムタ	キイトルーダ・アリムタ
投与順序 1 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可	生食 100mL 1瓶 イミフィンジ注(10mg/kg)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋 注	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋 注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋 注
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	day1
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Ro.1と同時にレスタシノー2.5錠服	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了 day21	休薬完了 day21	休薬完了 day14	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ3mg 1袋	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤			12か月(1年間)で終了	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)
手技				持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)
5 薬剤				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	休薬完了 day21
手技				持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	
6 薬剤						マンニトールS 200mL	
手技				day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(30分)	
7 薬剤				休薬完了 day21	休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 ランダ (75mg/mf) 全量を500mL	
手技						持続点滴末梢(120分)	
8 薬剤					カルボプラチンはAUC5に減量 されていても問い合わせ不要	ソルデム3A500mL 1袋	
手技						持続点滴末梢(60分)	
9 薬剤							
手技						day8,15は、休薬週	
10 薬剤						休薬完了 day21	
手技							
11 薬剤						イメンド内服	
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk046-01	kk047-01	kk048-01	kk049-01	kk050-01	
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	
プロトコール名	テセントリク・パラプラチン・タキソール・アバステン	テセントリク・アバステン	キイトルーダ・カルボプラチン・アブラキサシ	ADOC療法(患者限定)	テセントリク・パラプラチン・ラステツ療法	
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	イメンド内服	イメンド内服	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	day1	day1	day3 持続点滴末梢(60分)	
2 薬剤	生食 100mL 1袋 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body) 下ルートより	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.1と同時にレスタスコ75錠服	生食 100mL 1瓶 アバステン (15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピシン注 (40mg/mf)	生食 50mL 1瓶 オンコピン (0.8mg/mf) 全開で	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボンD(100mg/mf)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	アロキシ注バッグ3mg 1袋	休薬完了day21	生食100mL (20mL/mf) アブラキサシ注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	day4 持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 バクリタキセル注(200mg/mf)		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	マンニトール 200mL	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	
手技	持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day2,3
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg		day8,15	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mLに	ラクテック500mL 1袋 メイロン 20mL 1A	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(120分)		day8,15	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤	休薬完了day21		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	ソルデム3A 500mL 1袋	生食 100mL 1瓶 エンドキサシ注(700mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボンD(100mg/mf)
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
8 薬剤			生食100mL (20mL/mf) アブラキサシ注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	day2	休薬完了day21	
手技			持続点滴末梢(30分)	day2	day8,15は、休薬週	
9 薬剤			休薬完了day21	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)		休薬完了day21
手技						
10 薬剤						
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						
15 薬剤						
手技						
16 薬剤						
手技						
17 薬剤						
手技						