

コード ナンパリング	hk006-01	hk007-01	hk008-01	hk009-01	hk010-01
ルート	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院 ケモセーフ(下ルート)	入外兼用 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート)	外来 ケモセーフ
プロトコール 名	M-VAC	VIP bolus	GC	TG	タキソテール・プレドニゾン
投与順序	1 薬剤	別紙	別紙	ソルデム1 500mL 1袋 インルート	化学療法中 プレドニゾン錠1mg 10T分2
手技				持続点滴末梢(2h)	day1
2 薬剤	メソトレキセート(30mg/m <sup>2</sup> ) シスプラチン (70mg/m <sup>2</sup> ) ドキシソルピシン(30mg/m <sup>2</sup> ) エクザール(3mg/m <sup>2</sup> )	イホマイド (1.2g/m <sup>2</sup> ) MAX 1.5g/m <sup>2</sup> シスプラチン (120mg/m <sup>2</sup> ) MAX 120mg/m <sup>2</sup> エトポシド (100mg/m <sup>2</sup> ) MAX 120mg/m <sup>2</sup>	ゲムシタビン (1000mg/m <sup>2</sup> ) シスプラチン (70mg/m <sup>2</sup> )	生食 50mL 1瓶 ゲムシタビン (1000mg/m <sup>2</sup> ) MAX 1000mg/m <sup>2</sup> Rp.1開始60分後より 下ルートより	生食 250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/m <sup>2</sup> ) 上ルートより 調製時ボンピング必要
手技				持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	全て下ルート	全て下ルート (エトポシド(ラスデット)はフィル ターなし!)	day1、2は全て下ルート day8、15は上ルート	生食 50mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.2終了後全開で 下ルートより	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用
手技				持続点滴側管(全開)	持続点滴末梢
4 薬剤				ブドウ糖 5%500mL 1袋 タキソール (175mg/m <sup>2</sup> ) MAX 210mg/m <sup>2</sup> Rp.1終了後 下ルートより	休薬完了 day21
手技				持続点滴末梢(4h)	
5 薬剤					
手技					day8
6 薬剤				ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	
手技				持続点滴末梢(2h)	
7 薬剤				生食 50mL 1瓶 ゲムシタビン (1000mg/m <sup>2</sup> ) MAX 1000mg/m <sup>2</sup> Rp.1開始60分後より 下ルートより	
手技				持続点滴側管(30分)	
8 薬剤				休薬完了 day21	
手技					
9 薬剤					
手技					
10 薬剤					
手技					
11 薬剤					
手技					
12 薬剤					
手技					
13 薬剤					
手技					

hk011-02	hk012-01	hk013-01	hk014-01	hk016-01	hk017-01	hk018-01	
入院 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート)	外来 ケモセーフ	外来 シリンジ	入院・外来 従来通り(シール)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	
BEP療法	EP	タキソテール・デキサメサゾン	ODDP動注連日	トーリセル	アドリアシン単剤	ハラヴェン	
		化学療法中 デカドロン錠0.5mg 2T分2		化学療法前投与 レスタノール錠 5錠 服用			
day1	day2~5	day1~5	day1	day1~5	day1	day1~3	
ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時 持続点滴末梢(120分)	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート Rp.2と同時 持続点滴末梢(120分)	ソルデム3A500mL 1袋 KCL注 1キット メインルート Rp.2と同時 持続点滴末梢(2時間)	生食 250mL 1袋 ドセタキセル(75mg/mf) 上ルートより 調製時ポンピング必要 持続点滴末梢(90分)	ラクテック 500mL 1袋 持続点滴末梢(1.5h)	生食 250mL 1袋 トーリセル (25mg/body) 持続点滴末梢(60分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)
グラニセロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 下ルートより Rp.1と同時 持続点滴末梢(15分)	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 下ルートより Rp.1と同時 持続点滴末梢(30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 下ルートより Rp.1と同時 持続点滴末梢(15分)	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用 持続点滴末梢	ラクテック 500mL 1袋 持続点滴末梢(1.5h)	休薬完了 day7	生食 50mL 1瓶 ドキシソルピシン(30mg/body) 持続点滴末梢(5分)	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ 持続点滴末梢
ブドウ糖 5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後 持続点滴末梢(120分)	ブドウ糖5%500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後 持続点滴末梢(120分)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトボシド (100mg/mf) 下ルート(フィルターなし)より Rp.2終了後 持続点滴末梢(120分)	休薬完了 day21	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2投与60分後から 持続点滴末梢(30分)	休薬完了 day21		day15は休薬
生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート 持続点滴末梢(120分)	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート 持続点滴末梢(120分)	生食500mL 1袋 KCL注 1キット メインルート 持続点滴末梢(2時間)		ランダ注 (20mg/mf) 動注			休薬完了 day21
生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後 持続点滴末梢(120分)	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後 持続点滴末梢(120分)	生食 500mL 1袋 ランダ (20mg/mf) 下ルートより Rp.3終了後 持続点滴末梢(120分)		ラクテック 500mL 1袋 持続点滴末梢(90分)			
生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより 持続点滴末梢(60分)	生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート 持続点滴末梢(5時間)	生食500mL 1袋 KCL注 1キット メインルート 持続点滴末梢(5時間)		休薬完了 day21			
生食 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート 持続点滴末梢(5時間)	ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート 持続点滴末梢(5時間)	ソルデム3A500mL 1袋 KCL注 1キット メインルート 持続点滴末梢(5時間)					
ソルデム3A 500mL 1袋 KCL 1キット メインルート 持続点滴末梢(5時間)	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート 持続点滴末梢(4時間45分)	ソルデム3A500mL 1袋 メインルート 持続点滴末梢(5時間45分)					
ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート 持続点滴末梢(4時間45分)		休薬完了 day21					
エトボシドはフィルターなし!	生食 100mL 1瓶 プレオ (30mg/body) 下ルートより 持続点滴末梢(60分)						
	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用 持続点滴末梢						
	休薬完了 day21						

hk019-01	hk020-01	hk021-01	hk022-01	hk023-01	hk024-01	hk025-01	hk026-01
入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ シリンジ
オブジーボ	ジェブタナ	パラプラチン・ゲムシタピン	パラプラチン・ Monthlyタキソール	GC(ショートハイドレーション)	キイトルダ	オブジーボ+ヤーボイ	エビルピシン勝注
生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body) 持続点滴末梢(30分)	プレドニゾン錠 10mg/日併用 day1		生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2V Rp.1と同時にレスメチン75錠 持続点滴末梢(30分)	イメンド内服 day1	生食 100mL 1瓶 キイトルダ注(200mg/body) 持続点滴末梢(30分)	生食 50mL 1瓶 ボラミン注 1A 持続点滴末梢(15分)	エビルピシン注(30mg/body) 生食50mL 1瓶 生食は溶解用 膀胱内注入
生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で 持続点滴末梢(5分)	生食100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V ボラミン注5mg 1A 持続点滴末梢(30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 持続点滴末梢(30分)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に経口補水液(OSI)1L 摂取 持続点滴末梢(30分)	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で 持続点滴末梢(5分)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body) 持続点滴末梢(30分)	休薬完了 day7
休薬完了 day14	生食100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V ボラミン注5mg 1A 持続点滴末梢(30分)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) 持続点滴末梢(30分)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡) 持続点滴末梢(120分)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) 持続点滴末梢(30分)	休薬完了 day21	生食 100mL 1瓶 持続点滴末梢(30分)	三方活栓を用い、生食で volume upする
	生食 250mL 1袋 ジェブタナ(25mg/㎡) 持続点滴末梢(60分)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg 持続点滴末梢(120分)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 6) MAX800mg 持続点滴末梢(120分)	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq 持続点滴末梢(60分)		生食 100mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製 持続点滴末梢(30分)	生食24mL追加して、全量 36mLとし、50mLケモセーフ シリンジに調製する
				マンニトール 200mL 持続点滴末梢(30分)		休薬完了 day21	
	ジーラスタ皮下注3.6mg 1筒 皮下投与	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)	休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 シスプラチン(70mg/㎡) 全量を500mLに 持続点滴末梢(120分)		4回投与後、オブジーボ単剤へ	
	休薬完了 day21	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) 持続点滴末梢(30分)	カルボプラチンはAUC5に減 量されていても問合わせ不 要	ソルデム3A 500mL 1袋 持続点滴末梢(60分)			
			day15は、休薬週				
		休薬完了 day21		生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V 持続点滴末梢(30分)			
				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡) 持続点滴末梢(30分)			
					day22は、休薬週		
				休薬完了 day28			

hk027-01	hk028-01
入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ
パベンチオ+インライタ療法	ジェムザール+RT
生食 50mL 1瓶 ボラミン注 1A	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 0.5V
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)
アセリオ静注用 650mg	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(27mg/ml)
持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)
生食 100mL 1瓶 パベンチオ注(10mg/kg)	day1.4.8.11.15.18.22.25の計8回
持続点滴末梢(60分)	
休薬完了 day14	休薬完了 day28
インライタ1回5mg 1日2回	